PLUKENETII

OPERA:

VOLUMINIBUS QUATUOR.

Plukenetius (L.)

K

34. e 24

LEONARDI PLUKENETII

PHYTOGRAPHIA,

SIVE

Stirpium Illuſtriorum & minus cognitarum

ICONES,

TABULIS ÆNEIS,

Summâ diligentiâ elaboratœ;

Quarum unaquæque Titulis deſcriptoriis ex Notis Suis propriis, & Characteriſticis deſumptis, inſignita, ab aliis ejuſdem Sortis facile diſcriminatur.

MEMINISSE JUVABIT.

LONDINI: MDCXCI.
SUMPTIBUS AUTORIS.
Secundò Excuſum, Ediderunt T. Davies, T. Payne, L. Davis, & C. Reymers, D. Wilſon, & Geo. Nicholls. M.DCC.LXIX.

GR III
BRITISH MUSEUM

CONTENTA VOLUMINUM.

VOL. I.

PHYTOGRAPHIÆ Pars Prior; viz. Effig. Authoris. Ded. ad H. Compton. Lectori Benevolo; & Tab. 1. ad 72. Pars Altera; Ded. ad Com. de Portland, & Tab. 73 ad 113. Appendix; Tab. 114 ad 120. Pars Tertia; Ded. ad Gul. III. Ad Studiosos Botan. & Tab. 121 ad 250. Pars Quarta; Tab. 251 ad 328. Abreviata. Index.

VOL. II.

ALMAGESTUM BOTANICUM.

VOL. III.

MANTISSA; cum Tab. 329 ad 350.

VOL. IV.

AMALTHEUM BOTANICUM; cum Tab. 351 ad 454.

LECTORI.

PLUKENETII probatiſſimæ illæ tabulæ dudum in bibliopoliis deſiderantur; nec tamen eo minor earum perpetuus eſt uſus in quærendis auctorum ſynonymis; repetitionem ergo utiliſſimi libri inſtituimus, eoque ſtudiis veſtris officium præſtituros eſſe nobis blandimur.

Primum quod cavere voluimus hoc fuit, ne mutatis paginarum dimenſione & numeris omnes in libris botaniſtarum ad primam editionem factæ citationes lectoribus imponerent: ſed ulterius animadvertimus, quod ipſi vos noſtis, in poſtrema parte, quæ Almageſtum inſcribitur, quam obſcuræ ſint revocationes a tabula ad deſcriptionem, quin figuram plantæ deſcriptæ reperire vix poſſibile, cum nullæ adſint citationes. Inſuper conſultum duximus plantas in prima editione omiſſas loco proprio interpolare, quas

quas tamen confuſionis vitandæ cauſa aſteriſco notabimus. Meminiſſe hujus ſigni oportet ubi plantam in tabulis evolvere velitis; tum enim numerus poſticus reſpondet numero plantæ in qua libet tabula, ſuperne numerando. Hanc præter nulla omnino facta eſt mutatio impreſſionis, nam in utraque editione pagina paginæ, & linea lineæ reſpondent; tabulæ etiam omnes eadem.

Lond. Jan. 1, 1769.

Cottins sculp.
LEONARDI PLUKENETT. D.M.
EFFIGIES Ætat: suæ 48 Año Dom: 1690

LEONARDI PLUKENETII.

PHYTOGRAPHIA,

Sive

Stirpium Illustriorum, & minùs cognitarum

ICONES,

TABULIS ÆNEIS,

Summâ diligentiâ elaboratæ;

Quarum unaquæq; Titulis descriptoriis,
ex Notis Suis propriis, & Characteristicis
desumptis, insignita; ab alijs ejusdem
Sortis facile discriminatur.

PARS PRIOR.

MEMINISSE IUVABIT.

I Collins fec:

Ἐμπειρον εἶναι συμβάλλω πᾶσόν τι διοντε
πάντων φυτων. Gal. de Antid. ot. lib. 1. cap. 15.

LONDINI. MDCXCI.
SUMPTIBUS AUTORIS.

HONORATISSIMO

et.

ÆTERNVM REVERENDO

PRÆSULI ac DOMINO.

DOMINO

HENRICO COMPTON

LONDINENSI EPISCOPO. &c. &c. &c.

Omnium Botanophilorum MECÆNATI summè colendo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

Has suas TABULAS PHYTOGRAPHICAS *in priori Parte comprehensas.*

Quòd

HUJUS FAVORE ut plurimùm Illustrantur, submissâ cum observantiâ, in devoti animi tesseram, gratæq; mentis symbolum, VOTIVAS reddit, jure meritoq.

Offert Dicat Consecrat.

LECTORI BENEVOLO.

Natura parens sui studiosa, conservatrix, artis & philchritudinis suæ, sibi conscia perditura fructum sui, si amplum hunc terrarum Orbem solitudini ostenderet, ut desiderium contemplandi fertilissimum stirpium apparatum, quem in ipsâ superficie subministrat nobilissima hæc quam pedibus calcamus Terra; in nobis excitaret, & conservaret, Novitate animos nostros ad se allicit, dum indies e varijs Asiæ Provincijs, & à Primoribus prorsùs incognitas in apricum producit plantas: Quamplurimi etiàm Europæ loci à Majoribus nostris non ritè examinati, Novas formas, Novas species, quotidie nobis suppeditant. Africa quoq; his nostris temporibus, monstra sua gignere non desijt: sed Novi aliquid ex Plantarum genere, semper ab extremis parturientis Africæ oris, ad nos adportatur. Nec hìc Natura subsistit, sed continuè Novas ex alieno Orbe, in lucem profert plantas. Novæq; virtutes à filijs Artis, in salutem humani generis inveniuntur: Vigilant enim Sæculi nostri Botanici, qui (ut Cl. Raij verbis utar) nec Majorum inventis contenti, ad ulteriora tendunt, nec alios sibi inquisitionum terminos, & columnas figunt, quam quas Natura terris fixit, Universum Orbem curis suis complexi. Illi scilicet stimulo mihi fuere, ut nulli sudori, operæ, ac sumptui parcerem, quin tam indigenas, quam exoticas stirpes inquirerem, atq; colligerem, quarum investigatio ab ipsâ Adolescentiâ, nobis amœnissimâ varietate se commendarit; fateor equidèm Botanica in omni ævo, melioris luti Quamplurimis excoli; et in Arte medendi vèl antiquissima est ratio, per simplices Herbas, morbos abigendi; Hujus enim Cognitionem ad Principes, etiàm & Magnates, pertinere, Salomonis (regum omnium quos Sol unquàm aspexit Sapientissimi) Alexandri magni, Mithridatis, Diocletiani, & aliorum docuêre exempla; Imperatores & Reges non pauci Heroesq; Inclyti, Indagationem & peritiam hujus Naturalis Philosophiæ partis se dignissimam judicarunt, rati se Herbariæ rei colendo studium, optimè de humano genere mereri, nec minùs solidam, veramq; laudem indè, quàm ex Triumphis, ad omnem Posteritatem, nomini suo libare posse; Hanc tanti fecerunt Ethnici, ut ejus Inventionem, Dijs dignam æstimarint, & licèt dubitare videantur, de primo eorum Inventore, consentiunt, tamèn tandèm, Apollinem illâ prærogativâ maximè præeminere, his Poetæ verbis.

Inventum Medicina meum est, Opiferq; per Orbem
Dicor, et Herbarum subjecta potentia Nobis.

et semper fuit adeò incredibilis apud Antiquos ecistimationis Herbarum Scientia, ut æqualis censebatur gloria, Herbam invenisse & Vitam juvasse. Quicquid enim hujus Sæculi sentiunt alij, nobis satis persuasum, Studium hoc Botanicum necessariam esse Physicæ & Medicinæ partem, multis jucunditatis, & Delectationum condimentis gratiosam, & toti generi humano, utilitate quam maximè commendabilem: Visum igitur fuit, ut Nobilissimæ Botanices Scientiæ, ulterius inserviam, Plantarum aliquot Icones non alibi expressæ per ièrgâ manu, et emodulatâ ad Plantarum ipsarum dimensiones naturales, proportione: quadam, effigiare, & adumbrare. et earum plures, compendij gratiâ, in unam Tabellam conjeci; Opus non minùs varium, quàm ipsa est Natura, ubi Orientis & Occidentis Indiæ Montium, Sylvarum, Vallium, litorum & camporũ, Stirpes nativæ, & alumnæ à nullo Classico Autore antèa celebratæ, sed prorsùs Novæ & hactenùs inauditæ, oculis vestris obversantur; singulis etiàm hujusmodi Novis plantis, nomenclaturam, propriis & genuinis Symbolis insignitam accommodavimus. ut quæ rem ipsam aptissimè notat, & clarior foret omnis earum Cognitio simul & Cognatio, quam insuper dissimilitudinis collationis & similitudinis ope, inter Congeneres, & similimas, ideratæ inspectioni, & ex Plantis ipsis expansioni, adaptavimus. Nam hæc omnia ex αὐτοψία didicerimus, non ut Nicander Colophonius, qui ab agro remotissimus, rustica aggredi, non veritus: neq; ut Pamphilus, quem Galenus reprehendit, quòd cum non conspexerit; nè dùm per Somnium viderit, de his tamèn scripserit: Has nobis vidisse contigit omnes, & etiamnùm præ manibus sunt, quas in Herbario nostro vivo, impræsentiarum conspicere licet, aliasq; permultas, & inditas habeo, quas tamèn in præsenti non exhibeo, quia Chartæ penuria, & typorum immodica deterrent impensa; neq; enim potest quis sullam certam cognitionem sibi arrogare Vegetabilium quæ nunquàm aspexit. Benevolus interim Lector has Tabulas Phytographicas, æquo suscipiet animo, donec Herbarij vivi Catalogus, Plantarum circiter Octo millium comprehendens consequatur, nec dubito quin candidi Rei Herbariæ cultores, non solùm admiraturi sint, sed grati recolent quòd tot incognitas. (octingenti ferè numerantur) in his Tabulis nostris duas in partes distributis, luci nunc damus, & si quid, vèl etiàm Viris eruditioribus, unquàm Novitate suâ, se commendarit; Tabulæ nostræ Phytographicæ, Novi Orbis, Novis (i e) novissimè detectis, & hucusq; inedilis stirpibus, sunt refertissimæ, quibus amplum Exscriptoribus campum damus, in quo plantas legere possunt, easq; generali Plantarum Indici, seu Pinaci inserè, quæ in nostro Orbe jamdudùm innaturerunt; ex quibus omnibus non desperarem, nos Botanophilis perplacuisse, & plurimas ab ijs gratias promeruisse, tùm ob ea, quæ jàm præstitimus in hoc opere nunc edito, tùm ob ea, quæ præstituri sumus in Catalogo nostro, brevi edendo, ut hac ratione, vobis meis amplissimè satisfactum iri arbitrarer. Utaris ergò Lector amice his nostris laboribus, quos tamèno huic operi impendimus, ac stirpes hasce peregrinas rarissimas, & hactenùs inauditas, quæ nunc exactis Imaginibus Orbi panduntur, adspicias & in omnibus in ex haustam Sapientiæ profunditatem, & Majestatem divinam in ipsis Condendis, comperies; His nobiscum ad Dei gloriam, tuamq; ac cæterorum utilitatem, & oblectamentum paratis, fruere pro otio, & incolumis age; Vale.

Tab. I.
fig. 1. *Abies Pinum referens foliis ex omni parte prorumpentib. Abies foliis prælong. Pinum simulans. Ray. Hist. an Picea minor C B P.? Pinus maritima minor ejusd Cat. H. Ac. Lugd?*
2 *Absinth. minus odoratu Gangeticum, floribus Chamæmeli solitarijs, e foliorum alis.*
3. *Absinth. tenuifol. elegans ex Hispania; D.ris Turneforty.*
4. *Acacia ō Spinosa Wagæ. Malabar. Similis è Maderaspatan. lit. a fol. ad justā magnitudinem denotat.*
5. *Acaciæ similis ō Spinosa ramulis alternis Maderaspatana. an Nili camaram. H.M. pro hujus Synonymo Canna Indica arborea Zanon. ponitur à Breyn. Prod. i. cum Nellikam ejusd huic magis convenire videatur.*
6 *Acaciæ quodammodo accedens. J. Ceratiæ & Acaciæ medēa Iamaicensis spinosa bigeminatis foliis, floscul is stamin. atronitente fructu, Siliquis parum intortis. lit. a flosculos. b. Siliquā et fructum indigitant. Unguis Cati Arbor Americana spinosa siliquosa Par. Batav. Prodr.*

TAB. II.



Tab II

f. 1. Acacia Maderaspat. spinosa latisiæ accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. a. folium ad natural. dimensionē exprimit.

2. Acacia gloriosa Leutisci fol: spinos. flore spicato luteo. Siliquâ magnâ muricatâ. Arbor exot. spinos fol. Lentisci C.B.P. Inimboy Bras. Marcgr. Bonduch Zanon. Caretti H.M. lit. a. folium ad verā magnitud. cum aculeo sursùm spectante. lit. b. lobum spinis crebrioribꝰ armatū indicat.

3. Acacia ō spinosa minor è Quaracoa &. Curaſsavica fl. alb. globoso. fortè Tehoaxin Mexicens. Hernand.

4. Acer virginianum folio majore subtùs argenteo, suprà viridi splendente. Acer floreso. Virginiana Vulgō. Arborē hanc magnitudine & proceritate eximiam in Hort. D. Ioh. Tradescanti Lambethæ ad Austrū jam olī enutritam sæpe conspeximus, sed cam ibi unquām floruiſse a nomine memoratum audijmus.

TAB . III .



Tab. III

1. Acer Benghalense Laurin. foliis fructu tergemino. totidem membranulis extantibus; alato.
2. Adianth. alb. floridu. s. Filicula petræa crispa Ray Hist. Adianth. album crispu Alpinu Schwenckfeld. I B.
3. Adianth. foliis minutim in oblongum sciſsis. pediculo viridi. C B. P. Ad. alb. tenuif. Rutæ murariæ accedens I. B.
4. Adianth. album florid. Licutariæ folio Virginianu nostrum. D. Ray Hist. app.
5. Adiant. radicos. humisparsu. s. Filicula pellucid. nostras Coriandri foliolis mollicellis globuliferum Adiant. petræum perpusillum Anglicu foliis bifid. vel trifid. Newtoni Ray. Hist. forte Filicula saxatilis fol. Coriandri. Mentz. pugil.
6. Adianth. radicos. erectius foliolis imis bisectis, cæteris verò integris tenuissimè crenatis. forte Filicula saxatil. Coriandri foliis rotund. leviter serratis Mentzel. pugil Rarior. Pl.



Tab. IV.

1. *Adianth. nigrum Chinens. tenuiter divisum, pinnulis minimis, obtusis, plerumq; bifidis.* Ray. Hist. app. an *Filix saxatilis crispa* Park.? *lita. ramulum ad justam magnitudinem denotat.*

2. *Adianth. nigri s. Dryopteris Chinensis lanuginosa* Ray. Hist. app. an *Lonchitis Maranthæ Coterach ramosum Quorund* Lob. Ic. *s. Polypodium Iluens. Hist. Lugd. quæ secundùm utrosq; Bauhinos sunt unū & idem.*

3. *Adianth. Chinense perelegans ramos. folio flabelliformi cum rubedine perfuso. Adianthum foliis Coriandri ramosum* Ray. Hist. app. *has tres Adianthorum species habuit Cl. Rajus ab. egregio Botanico & Pharmacopæo Londinensi Dno Iacobo Petiver qui postea ad Icones exsculpendas, nobis libenter concessit.*

4. *Æschynomene mitis s. Mimosa* De Tunquin *pinnulis amplioribus Chamæfilicis marinæ æmulis. Sub* Ovali *titulo recepimus, foliorum formâ Tsjampangam* H. M. *haud multùm abludit.*

TAB. V.



Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Tab. V.

1. *Æsch. mitis Americ. foliolis Acaciæ brevioribus*; Br. Cent. *Mimosa Americ. supina veluti spinulis exasperata, pinnis Acaciæ latioribus & brevioribus* ejusd. Prodr. 2.

2. *Æschyn. mitis 5. Mimosa angustiori siliquâ foliis perexiguis Maderas-patana Æsch. foliis minimis nostra.* Ray. Hist. app.

3. *Alcea Indica frutesc. foliis ad marginem exasperatis Bryoniæ albæ divisuris. è Sinu* Bengalens. *allata est nobis.*

4. *Alcea spinos. Maderaspatana fol. profundè lacinatis, Cannabis in modum penta-phyllea. saporis acidi. an Acetosa Indica* Bonti. *Hujus meminit Cl. vir & sedulus exoticar. Pl. explorator D.r* Herman in Cat. HAc. Lugd. pag. 27.



Tab. VI.

f1. *Alcea Cretica flore immaculati candoris peramplo. in Hort. Medic. D. Morgan Londini Suburbano, jàm olim exculta fuit.*

2. *Alcea acetosa Indica mitis foliis superioribus Gossipij in modum tripartitò divisis Althæa Indica Gossipij folio Acetosæ sapore CHAL.*

3. *Alcea Indic. Ulmi folio prægrandi subtùs incana flore amplo purpureo, Althæ magna 5pp. capsularis foliis integris subtùs albicantibus, floribus magn.* Banist. Cat. Virgin. apud. Ray Histor. *inferiora enim hujus folia sunt prorsùs integra, superiora tamen in lacinias ternas leviter incisa, & aversâ parte albicantia.*

4. *Alcea f. Bamia American: parvo flore, petalis rotundioribus.*

5. *Anchusa lutea minor C. B. P.* I B. Park. *item Symphytum angusti fol. Apulum* ejusd. Park. *Anchus. echioid. lutea Cerinthes flore, montana.* Col. ecphr.

TAB. VII.



Tab. VII.

f. 1. Alcea Ind. fol. hastato, fl. parvo, purpur. longo petiola insidente, pericarp. compacto, duro in 5 vel. cellulas, totidem semina includentes dispertito.

2. Althæa frutesc. Ind. Orient. Populi albæ minoris fol. tenuiter dentato molli. an Althæa Americ. frutesc. Populi alb. foliis Par. Bat.

3. Alsine Caryophylloid. tenui fol. fl. albo punctato. an Als. Caryophylloid. tenuifol. montana Lini flore Ray Hist. fortè etiam Polygonum Caryophylli Holostei flore Cat. H.R. Bles. Betonica. s. Tunicæ minimæ similis Planta I. B.

4. Alsin. palustr. Ericæ folia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. Saxifraga palustr. Anglica Goodyeri Park. item Alsin. nodosa Germanic. ejusd. Park. Alsine nodosa Germanic. alias Arenaria. C.B.P. Arenaria I.B.

5. Alsine formis paludosa tricarpos flosculis albis inapertis. Alsine palustris Portulacæ aquatic. similis. Ray. Hist. Alsin. palustr. minima flosculis albis, fructu Coriandri exiguo Mentz. pugil. Portulaca exigua. s. arvensis Camerarij I.B.

6. Alsin. spuria pusilla repens foliis Saxifragæ aureæ Ray. cat. Pl. Angl. Hujus notitiam Doctiss. nostro Raio debemus, proinde miratus sum quo casu in Caleberrum. Autoris Histor. Universal. hæc plantula omissa fuit.

TAB. VIII.



Fig. 1. Fig. 3. Fig. 2.

Tab. VIII.

Fig. 1. *Althæa frutesc. folio acuto virente molli, flore speciosо. an Althæa frutesc. folio acuto flore magno* Schol. Botan. *Althæa profundè serrato. s. dentato folio* I. B. *Althæa flore majore* C. B. P. *et fortasse eadem cum Althæa arborea Olbiæ Provincialis Advers. Lob.* & *Icon. Malva sylvestr. perennis folio profundè laciniato* & *dentato* Moris. Hist.

2. *Althæa frutesc. Bryoniæ folio incana flore minore Althæa species quibusdam arborea altera, vel Bryoniæ folio* I. B. *Alth. semperirens Bryoniæ fol.* Park. *Alth. frutesc. Bryoniæ folio; item Alth. frutesc. folio acuto parvo flore* C. B. P. *Malva frutesc. folio acuto auriculato Hederæ instar Moris. Hist. Althæa Olbiæ vulgò putata.*

3. *Althæa fruticans Hispanic Aceris Monspesulan. incanis foliis grandiflora saponis odore. Alth. frutesc. folio rotundiore incano* C. B. P. *Alth. arborescI.* B. *Alcea frutesc. folio rotundiore incano* Moris. Hist. *item Malva Hispan. foliis mollib; undulatis in margine superiùs micis sulphureis adsolem lucentibus donatis ejusd* Moris. Hist. *quoād descriptionem; at in Tabul. huic Titulo alterius Icon substituitur, Althæa Provincialis Penæ Advers. ex sententia* D. Rаj. Hist. 603.

TAB. IX.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

a.

b.

Tab. IX.

f. 1. *Alsines facie myosotis Bisnagarica frutescens flosculis pallidè flavescentibus cujus folia sunt ad caulem alterno positu, (non per intervalla geminata) incana, hirsuta; flosculi quidem ut Anagallidis, non tamen carulei, alioquin haud admodum diversi minis in caule, est enim revera Convolvuli minimis species Bisnagarica.*

2. *Althæa Indica latiori folio cordiformi, ad summum sinuato. Malva Indica frutescens folio cordato P. B. P.*

3. *Althæa rostrata Cormandeliens. Pimpinellæ major. fol. subrotundo.*

4. *Althæa fruticosa minor Gangetica foliis exiguis margine spinosis.*

5. *Althæa Ind. flosculis parvis folliculatim (fortè fasciculatim) ramulis adsitis.* Breyn. Prodr. 1. *Malva Americana Carpini folio, floribus aureis fasciculatis parvis P. B. P. è Maderaspatan nobis allata est.*

6. *Althæa Virginian. bidens Pimpinellæ maj. acutiore folio, flosculis minimis luteis. fortè Alcea Mori folio Virginian. min.* Sch. Bot.

TAB X

I. Collins. de: & fe.

Tab. X.

f. 1. *Amaranth; albus Gangeticus Salviæ angustis foliis paniculâ conglomeratâ. an Amarant. Alopecuroid. Indicus frutesc. lanuginos; foliis Salviæ angustioribus & longioribus;* Br. Prod. 2ª. *Salvia Amaranthoides Mich. Nutij Fasc. Herbar.*

2. *Amarant. Ind. min. lanuginos. Sampsuchi foliis, spicâ albâ ad foliorum exortum gemellâ. an Amarant. Alopec. Ind: frutesc. lanuginos; foliis Salviæ latioribus & brevioribus;* Br. Prod. 2ª

3. *Amarant. verticillat; min. Bengalens. Serpill. foliis incanis.*

4. *Amarant. spicat; Dictamni Creticæ folio Maderaspatensis.*

5. *Ambrosia maxima inodora Marrubij aquatic. foliis tenuiter laciniatis Virginiana.*

6. *Ambrosia (forsàn) è Chinâ Anguriæ foliis accidens. à D.no Petiver recepi.*

TAB. XI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Yeates fe.

Tab XI.

fig. 1. Ammi majus exoticum foliis per ambitum elegantèr incisis. an Ammi alterum semine Apij C.B.P. Ammi odore Origani I.B. nostra folia à Dauco Cretico Zanon. haud multùm abludunt.

2. Amomum Virgin. Evonymo Virgin. simile, floribus & fructu sparsim erumpentibus; Amomum Virginianum Corniseminæ facie Ray Hist.

3. Amygdalus Indica nana. Cat. H.R. Paris. Amygdalus pumila Cat. H.R. Bles.

4. Amigdalo-persica nana flore carneo pleno Africana. Persica. Malus Africana nana flore incarnato pleno Cat. H. Ac. Lugd. hujus ramulum. a. floribus onustum denotat. munere Nobilissimi Domini Henrici Baronis de Colrane hanc primùm accepimus.

TAB. XII.



Tab. XII.

1. Angolam forte H. M. Arbor Indica baccifera fructu umbilicato, rotundo, Cerasi magnitudine, dicocco. Ray Hist. è sinu Gangetico nobis advenit.
2. Anisum Africanum fruticescens folio, & caule, rore cæruleo tinctis. Ferula fruticosa sempervirens foliis Anisi Galbanifera, ex quâ Galbanum Officinarum P. B. P.
3. Anthyllis s. Alsine maritima lignosior Anthylloides, foliis tomentosis Bisnagarica.
4. Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuissimis, sursum inflexis, floribus sparsis, calyce spinulis asperato.

TAB. XIII.



Fig. 1. Apocynum Canadense maximum flore minimo herbaceo Cat. H.R.Bles. item Apocyn. Virgin. flore herbaceo, siliquâ longissimâ, & tenuissimâ Morison. Prælud. Botan.

Fig. 2. Arbor Aristolochiæ foliis Maderaspatana fructu parvo Medicæ adinstar involuto. an Gummi Elemi fundens Arbor Orientalis?

Fig. 3. Arbor baccifera Orientalis, folio rhomboide, fructu calyculato. Cassia Cinamomea s. Canella de mato. Linschot. part. 4. Ind. Orient.

Fig. 4. Arbor è Cormandèl vasculifera foliis amplis Mijrsinites rigidioribus nostra Raÿ. Hist.

TÁB. XIV.



Tab. XIV.

1. Arbuscula Bengalensis, Aceris minore folio incano alternatim posito.
2. Arbuscula è Maderaspatán folijs Aceris alternâ vice lucidè virentibus.
3. Arbuscula Zeylanica Aceris folio baccifera, folijs è directo, magis angulosis.
4. Arbuscula Bisnagarica Aceris folio parvo aculeata, folijs è regione binis
5. Arbor aromatica è Cormandèl Laurinis folijs binis ternisve nostra D. Ray Hist.
6. Arbor Prunifera. sphærulas saponarias ferens tetraphylla, ex Ind. Orient. an Saponaria Arbor Zeylanic—
trifolia semine Luzuni: Conchas Zeylanensib; P. B P.
7. Aster Americanus frutescens Satureiæ folijs scabris floribus amplis, saturatè Violaceis.

TAB. XV.



Artemisia Chinensis cujus mollugo Moxa dicitur, fortè Ytzecuinpatli Mexic. Hernând. an Artemisia Virginiana Park:
Aristolochia Violæ frutices. foliis virginiana, cujus radix Serpentaria dicitur.
Asarum è Terrâ Mariana Violæ luteæ vel Asarinæ foliis, Serpentaria nigra Nostratib; dicta.
Asparagus aculeatus minor sarmentosus è Maderaspatan.
Asparagus (fortè) aculeatus major spinas plurimas ab eodem exortu pro foliis ferens. an Asparag; aculeatus Siculus Raij Hist.? an Spina umbellâ foliis viduâ C B P? Drypis Theophrasti Anguillaræ I B?
Aster exoticus Hyoseridis folio minore noster D. Raij Hist. app.
Aster Africanus Stæchadis inodoræ foliis incanis flore albicante. Aster Afric. Stæchad. folio noster Raij H. app
Aster Bonaalensis omnium minimus, summo caule bifloros.



Tab XVI

1. Aster luteus latifol. glaber foliis rigidis, & minutissimè crenatis. an Aster luteus folio glabro & crenato CBP.^{2} ubi Synonyma huic Plantæ à Casp. Bauhin. male sunt appropriata.

2. Aster peregrinus Cisti folio non crenato, flore magno luteo. an Aster odoratus flore luteo stellato exoticus Cat. Pat. à Turre forte. Aster Conyzoides luteus perennis Icon Roberti.

3. Aster luteus fœtidus Crithmi Chrysanthemi folio, floribus umbellatis. Iacobæa Crithmi litorei foliis Catal. H.R.Bl. Iacobæa fœtida Crithmi Chrysanth. facie Brunjeri. Cat. H. Iong. Iacob. Rosmar. fol. Quorund.

4. Atriplex maritima Mauritanica frutescens, Polygoni foliis argenteis racemosa. Atrip. marit. Mauritan. fol. Polygon. argent. semine amplo fusco vasculis rotundioribus; nostra D. Ray Hist. append.

TAB XVII



1. Bellis montana incana & crenata, foliis & crenis obtusis. an Bellis montana folio obtuso crenato. CB Pin & in Prodr.? Bellis sylvestris folio crasso & villoso. Sch. Bot.? ubi ponitur pro nondùm descripto.
2. Bellis Americana procerior serotina ramosa flore amplissimo Cat. H. Ic. Lugd. an Bellis radice repente, foliis latioribus; serratis. Cat. H.R. Bles. fortè Nally-yetl. Nov. Hispan. Hernand.? Bellis Indica maxima C.H. Ac. Pat. Turn.
3. Bellis montana foliis Coronopi lacinijs s. denticulis rarioribus & magis extantib; an Bellis Alpina foliis profundè dissectis Sch. Bot.? Bellis leucanthemia (s. Anthemis) frutescens foliis profundè laciniatis Breyn. Prodr. 2. Bellis montana foliis Chrysanthemi D.ris Magnol ejusd. Breyn. ibid. Bellis chrysanthemi segetū folio D.ris Hans Sloan. Ray Hist.
4. Bellis pumila crenata Agerati æmula, crenis bicornibus asperiuscaulis. Bellis maritima foliis Agerati C.B.P. & in Pr.
5. Bellis montana Tanaceti foliis caule singulari annua. Chamæmelo affine Buphthalmum Italicum segetum altissimum I.B.
6. Bellis Alpina Parthenij foliis elatior.



Tab. XVIII.

f.1 *Biti Malabaricæ accedens Arbuscula Maderaspatana flore peculiari.*

2 *Blitum Africanū Calthæ palustris folio caule nudo cubitali spicam pedalem & ampliùs sustinente. Petasites Africanus Calthæ palustris folio Cat. H. Ac. Lugd. Petasitidis folio Bliti fructu D. Ray Hist append.*

3 *Bugula cærulea Alpina Park. Consolida media cærulea Alpina C B P. & I B. item Consolida media Genevensis ejusd I B. Histor. Universal*

TAB. XIX.



Fig. 1.

Tab XIX

f. 1. *Carduus Andelusiacus spinosissim; echino grandi aculeis rigidis armato noster* D. Ray. *Hist. append. è Regno Andelusiæ, Cubi & ipse collegit) hanc elegantissimam Cardui speciem mittebat ad nos Ornatissimus Vir & nobis amicissim;* D. Ioh. Fishwick.

TAB XX.



TAB XX.

Christophoriana arbor aculeata Virginiensis. Angelica arborescens spinosa s. Arbor Indica Fraxini foliis cortice spinoso Ray Hist. Arbor spinosa Fraxini foliis Virginiana. D. Edward. Morgan. Angelica arbor vulgò lit. a. folium hujus, naturali magnitudine dimidio minus. b. seminum Umbellas indicant.

TAB. XXI.

Tab. XXI.

Fig. 1. Chrysanthemum Americanū Doronici fol. fl. Persici coloris. umbone magno prominente, ex atro-purpureo, viridi, & aureo, fulgente. an Bellis Canadensis purpurea Ciasi Fascic. Herbar. Mich. Nutij p. 22.

2. Chrysanthem. Canadens. latifol. humilius. Moris. Prælud. Bot. Chrysanth. Canadens. humilius. Bocconi de Pl. Sicul. Aster virgineus luteus alter minor. Park.

3. Chrysanth. African. Asteris facie, ino flore non folioso, capitulis duris.

4. Chrysanth. Bengalense augusti-foliū pusillum. summo caule ramosum.

5. Chrysanth. segetum nostras folio glauco multisciso. majs fl. minore.

6. Chrysanth. tenuifol. flore luteo subtus purpurascente. Buphthalmū. tenuifolium folio Millefolij fere C B. Buphth. caule & folio purpurascente C B P. Buphth. flore purpurasc. Park.

7. Chrysanth. Smirnæum Colulæ folio. flore amplo nudo seminibus hispidis. ad capitula in orbium spiras circumvolutis. an Chrysanth. Valentinum, Clus (ie) Buphthalmum lanuginosum folijs Millefolij. C B P. Elegans hæc planta cujus folia aliquandō lanugine obducta invenimus ex semine in Cabis è Corbulis quibus Ficus & Uvæ passæ è Smirnā ad nos transportantur, disperso & indè collecto, enata; Angliæ primō & nostræ demum notitiæ accessit.

TAB. XXII.



Tab. XXII

Fig. 1. Chrysanth. Stœchadis folijs Americanum.

2. Chrysanth. Cannabinum Virginian. hirsutum, disco nigro, petalis aureis radiato. Chrysanth. Flos solis laciniatus annuus, umbone nigricante D. Bobart in Eupatorium Cannabinum Americanum flore aureo Cat. Hort. Reg. Bles. lit. a a. summum ramulum suis floribus ornatum denotant.

3. Chrysanthemum Peruvianum flore albo Cat. Hort. Lips. olim. edit.

4. Chrysanth. Chinense folijs pluriſariam diviſis. Halicacabi peregrini æmulis; Chrys. fol. multifidis Cicutæ nonnihil ſimilibus Virginianum Cat. Hort. Lugd. Chrys. Cannabinum American. frutesc. Virginianum Sambuci laciniatæ folijs & facie Breyn. Prodr. 2. è China ad D. Peiver allata est hæc elegans planta, & ab illo nobis amiciſſimè communicata.

TAB. XXIII.



Campanula Cymbalariæ folio Park. Camp. Cymbalar. fol. vel folio hederaceo CBP. Campanul. folio hederac; species Cantabricâ Anguillarae. IB.

Cicer Astragaloides (fortè) virginianum, hirsutie pubescens florib. amplis, subrubentibus. an Cicer montan. lanuginos. erectum CBP. D Banister Cat. Stirp. Virgin.

Cistus American. Chamæcerij folijs lucentibus ex Hort. D. Morgan. an Tzatzoqua Mex cicens. Hernand.

Cistus Chamærhododendros folijs confertis, ferrugine rubigine nitentibus; marque pilosis.

Cistus Helianthemos argenteus folio latiore, flore saturatè luteo. Helianthem. Alpin. folio Piloselle minoris Fuchsij IB. ex sententiâ D. Ra et fortè Cistus helianth. folio Polij montan. ejusd. item Cistus pusillus folio candido, flore luteo, ejusd IB. ex mente ipsius Ray. Hist.

Cistus humilis Alpinus durior. Polij nostratis folio candicante. Chamæcistus montan; Polij folio noster D. Ray. Synops Stirp. Brit. an Chamæcist, folijs Myrti Tarentin. canis & cinereis IB.

Cisti Helianthemi folijs, planta Maderaspatana, floribus ex alis. an vilis Idæa Cisti helianthemi folijs Maderaspatana.

TAB. XXIV.



LXXIV.

Fig. *Clinopodium virginianum angustifoliū. fl. amplis luteis, punctis purpureis. Clinopod. Virgin. angustif. flore luteo Cat. Hort. Ac. Lugd. Origanum floribus amplis luteis purpuro-maculatis, cujus caulis sub quovis verticillo decem vel duodecem. foliolis rubentibus est circumcinctus. D. Banist. Cat. Stirp. Virgin.*

Conferva reticulata crispa. D. Doodij Raÿ Hist. app.

Convolvulus angustissimo folio nostras cum auriculis. an Convolv. arvensis minim; D. Dent Raÿ Synops. stirp. Brit.

Convolvulus maritim. s. Soldanella è Maderaspatan; folio in summitate sinuato. an Convolv. marit. Zeylanic; folio crasso cordiformi Cat. H Ac. Lugd. Bintamburù Zeylan.

Convol. maritim; majore folio Chinensis. an Sarsa litoralis. s. Convol. maxim; Brasiliēs. Pison:

Convolvuli instar Volubilis è Coromandel umbilicatis foliis crassis acuminatis, villosa. an Pada-Valli, s. Pada Kelengi sive Muschega-Pada H M P.?? fortè ad Brijoniæ genus, potiori jure relegenda.

TAB. XXV.



Tab. XX.

1. *Convolvulus American; sub Ialapiæ nomine receptus. an Convolvul; Colubrinus Pison? Caapèba s. Convolvul; Brasilian; flore octapetalo monococcos* Ray. *Histor?*

2. *Convolvul; s. Volubilis Americ. Bryoniæ nigræ nervosis fol. basculis seminiferis, triquetris. Helxine fruticescus. Bryoniæ nigræ foliis, capsulis triquetris amplis, pergamenis. D.* Banist. Cat. stirp. Virgin. *an Capreolata Bryoniæ nigræ folio Brasiliens. tricocca* Marcgrav.

3. *Convolvulo similis Bryoniæ albæ foliis villosis, ex India Orientali. an Nelnoemeka* H. M. P8. *Tab 19? Hæc dutem pro synonymo Bryoniæ Zeylan. foliis profundè laciniatis* Cat. Hac. Lugd. à Cl. Comelino *ponitur. Annot. in loc.*

4. *Convolvulo similis villosa, foliis crassis, subrotundis, è Maderaspatan.*

TAB. XXVI.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.
Collins sculp

Fig. 7.



Fig. 5.



Fig. 6.

Tab. XVI.

1. Coralloina latifolia &c Opuntia marina Cortus. Fucus folio rotundo C.B.P. Sertolaria Imperati, Scutellaria. s. Opuntia marina I.B.
2. Corallina fistulosa fragilis, internodijs prælongis, lævibus, albis. Farciminum modo catenatis, Corallina fistulosa fragilis I.B.
3. Cornus Virginiana flosculis plurimis albidis ex involucro tetrapetalo rubro erumpentibus, D. Banist. Cat. Stirp. Virg. apud D. Ray. His.
4. Cucumis Bryonoides Bisnagarica fructu parvo, florum calyce muricato. an Mucca Peri. H.M.P. 8.
5. Cuscuta ramis Arborum innascens Caroliniana filamentis lanugine tectis, Musæi Courtenidn.
6. Cuscuta lendiginosa tenuissimis cirrhis è Terrâ Mariandicâ. Cuscuta Americana super arbores se diffundens. Ray Hist. app.
7. Cytisus Americanus flore luteo spicato; foliis suprà virentibus, glabris, subtùs lanugine argentatis.

TAB. XXVII.



Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 4.

a.



Fig. 3.



Fig. 5.

Tab. XXVII.

Fig. 1. Achryso affinis Peruviana frutesc. Cat. H. Ac. Lugd. App. Agerato affinis Perijana frutescens Parad. Bat. Prod. Quinquina s. Arbor amara & Febrifuga quibusd. falsò & fastuosè muncupata.

Fig. 2. Achryso affinis virginiana frutescens foliis Chenopodij glaucis. Senecio frutescens virginiana Atriplicis folio Raij Hist. & app.

Fig. 3. Ephemerū Bengalense serpens folio subrotundo brevi phalangoides. an Ephemerum Africanū annuum flore dipetalo Cat. H. Ac. Lugd. Dipetalos virginiana foliis Gentianæ, aut Plantaginis Marcgr. Raÿ Hist? fortè etiam Gentianella Indica. Bontÿ. p. 154.

Fig. 4. Ephemerū Phalangoides Maderaspatens. minimum foliis perangustis persolialum, fortè Acacax àn. s. Potamogeiton Mexicanū. 2. Hernand. Planta palustris & lenta, quæ statim comprimentib; cedat digitis, huc etiam pertinet Tali-pullu. H. M. P. 9. T. 63. p. 123.

Fig. 5. Cirsia lutea latifolia palustris. Raÿ Hist. an Cristæ Galli affinis planta Romana, s. Crista Galli major Italica J. B. quærit & ipse Eruditiss. Rajus ubi. suprà.

TAB. XXVIII.



Tab. XXVIII.

1. Euphrasia. s. Crateogonum foliis brevibus obtusis Vestmorlandicum Ray Hist.
2. Euphrasia pratensis minor purpurea Park. Euphr. purp. min. C B. Prodr. Euphr. 3.o non scripta. Fab. Col. eephr.
3. Ericæ facie Polygonoides summitas cum floribus.
4. Ericæ facie Polygonoides Africana pentapetalos, viticulis in creberrima capillamenta squammulis conflata diffusis, Limonium feruloceo folio, Grisley Virid. Lusit. ut humanissime nos monuit D. Gulielm; Sherard. Collegij S.ti Johannis in Academ. Oxoniens. socius, & Phytognostes peritissimus, cujus munere summitatem accepi, ramulum autem à D. Iohanne Fishwick. ad maritimas Africæ oras à seipso collectum & ad nos transmissum, obtinui.
5. Evonymus virginian; rotundi fol. capsulis coccineis eleganter bullatis Banist. Cat. Stirp. Virg. hîtaa. semina ad natural. magnitud. demonstrant.
6. Evonym. Jujubinis foliis Caroliniensis, fructu parvo ferè umbellato. b.b. semina ad æqualem dimensionem significant. à foliorum similitudine cum Rhamno Catharctico (ni fallor) hæc planta, Spina Cervina Barbadensibus nostratibus nominatur.

TAB. XXIX.



Tab. XXIX.

Ficoides s. Melocactos mamillaris glabra, sulcis carens, fructum suum undiq; fundens. àn Echino-melocactos minor lactescens absq; tomento, cylindris laxioribus Parad. Bat. Prodr.?

Ficoid. 5. Melocactos minim. lanuginos, spinis mitioribus fructu sparsim egrediente. àn Echino-melocactos tuberosus, s. globularis min. Cat H.R.P.

Ficoid. Americanu. s. Cereus erectus cristatus foliis triangularib; profunde canaliculatis. Cereus spinis crebrioribus horridus Ray. Hist. Jamacaru prima Pison. Hist. Lusitan. Cardon. àn Planta pinnata arundinacea Park. Theatr.

Equisetum s. Hippuris lacustris, foliis mansu arenosis Gesnero Ray. Hist. Hippuris coralloides Ger. emac.

Frutex Cormandeliensis baccifer Mali Granatæ foliis amplioribus, nostr Ray. Hist. 1801.

Frutex Gangetic, Alterni folio spinosus. Frutex alulentus Orientalis Ilicis folio noster Ray. Hist.

Frutex Bismagaricus spinosus, Coryli foliis densis, spinis brevioribus crassis.

TAB. XXX.



Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

1. Filix amplissima lobis foliorum lacinialis Cambrica. Polypodium Cambrobritannicum pinnulis, ad margines lacinialis Ray. Hist.
2. Filicis è China genus molle, auriculâ ad pinnulæ basim supernè productâ, summo folio longiùs mucronato.
3. Filix 3. Polypodium Indiamum foliis profundè sinuosis Marrubij aquatic. æmulis. an Filix Indica Osmundæ facie Bod. à Stâpel. in Theophrasti Sim. Paul. Quadripart. Botan. 302.
4. Filicifolia, Lonchitis aspera maxima Indorum.

TAB. XXXI.



Tab. XXXI

1. Frutex baccifer è Cormandel Rorismar. obtusis & veluti punctat. fol. plurimis, ex uno tuberculo provenientib, vid. Ray Hist. p. 1801. an bibis = Idææ spec. Indiæ Orientalis.

2. Frutex baccifer foliis Lini, vel Cassiæ Poeticæ Maderaspatensis noster. Ray Hist.

3. Genista hinctoria Maderasp. Rorismar. foliis ad caulem radiatis. an Legumen cujus siliquula à D. Terentio ex Indiâ missa, & titulo herbæ Anil inscripta fuit. CBP. Glasto affinis ejusd. CBP. Anil. s. Nil, Indorum color. IB. Anil herba foliis Mungiriquæ simili Garziæ. Anil s. Indigo, Gali, s. Nil, Herba Rorismarini facie, Linschot. part. 4. Ind. Orient. Genistæ Fluensi Lusd (h. e.) Genist. radiatæ, vel stellari IB. (i.e.) sparto triphyllo CBP. baldè sinulis, si non eadem. Huic etiam proxima est Cytisus, acuminatis foliis CBP. quoād D. Turnefortii monente D. Sherard (i.e. nostrâ sententia) Cytisus Indicus flore luteo hirsutus Cat. Patav. à Turre. Cytisus foliis argenteis flore luteo vulgo. Nostræ caulis angularis est proindè eam ad Genistarum genera majis propriè disponendā. arbitramur; Quam ut audio præparant prò cærulei coloris tinctura in Regno Bisnegar, aliisq, in locis Indiæ Orientalis.

4. Geranii pusilli supin. marit. Alth. aut Betonic. folio nostras Ray Hist. Geran. minim. procumbens foliis Betonic. Moris. Hist. 2.

5. Gnaphal. Lusitan. comis argenteis an Chrysocome Syriaca candidiss. floribus, Breyn. Pr. i. fortè etiam Gnaph. maj; angust. oblongo folio alterum CBP. Filago Germanic. altera secundum folia florida. Lob. Icon.

6. Gnaph. maj. lato oblongo fol. CBP. Gn. 2us Plateau. Clus. Hist. Gnaph. ad stœchadem citrin. accedens IB. Elichrysum silvestre latifol. capitulis congestis CB. Phyt.

7. Gnaph. impium. s. Filago dicta Cap. Bon. spei. Gnaphalio Plateau 2° simile genus, sed diversum.

TAB. XXXII.



Fig. 1. Gramen Arundinaceum Halepense, Tragopogonis fol. paniculâ miliaceâ. hujus exemplar eximij Botanici D. Iac. Bobart Hort. Academiæ Oxon. Præfect. communicatione in Herbario nostro vivo servatur.

Fig. 2. Gram. paniculat. fallo-provinciale Aquileiæ semine. Schol. Botan. a D. Gulielmo Sherard accipiebam.

Fig. 3. Gr. junceum aquat. paniculis cum fol. capillaribus; simul orbis proliferum. an Gr. junc. capsulis triangul. caulicul. tenuib; foliis ad nodos, & paniculorum divaricationes prælongis, Rāy Hist.

Fig. 6. Gr. Alopecuroid, spica max. Ind. Orient. Gr. Alopecuroid Indic. max. Rāy Hist. est panici genus.

Fig. 5. Gr. parvum repens. δυσάχνοφόρον. Jamaicense spicâ longiori compressa.

Fig. 4. Gr. Μηλοκόφορον ὀξύφυλλον. Carolinianum, s. Gr. altissu panic. maximâ speciosa, & spicis majoribus; compressiusculis utrinq; pinnatis. Blattam molendinariam, quodammodo referentibus, composita; foliis convolutis, mucrone pungentibus; an Gr. marit. max. Curassanic. paniculis divisis P. B. P. hujus ad exsculpend. nobile specimen nobis dedit Insignis & in omni Naturali scientiâ vir magnâ judicij solidilate, si quis alius præcellens D. Gulielmi Courténe, olim condiscipulus, & semper mei amicissimus.

Fig. 7. Gr. exile durisculii marit. foliolis circumvolutis deluti junceis brevibus. Gr. pumilum Loliaceo simile, Rāy Synop. Stirp. Brit.

TAB. XXXIII.



spica. Briza minus. C B P. I B. Park.
aderum à maritimis pumilum. Gr. secalinum palustre, & maritim. Ray Hist. an Gr. Hordeo disticho simile C B P.
tinum marit. spicatum C B P. Gr. canmar. spicat. Monspeliens. Park. Gr. can. marit. spicat. Casparo Bauhino I B.
rit. spica lobata, fol. punctatis; nostras an Gr. spartum spicat. fol. mucronatis, vel spica Secalina C B P. Spartum spicatum pungens Oceanicum I B.
a loid. spica brevi, ramosâ ex utriculis prodeunte, an Gr. Phalaroid Lusitanic. Ray Hist.
. Alopecur. p. accedens ex culmi geniculis, spicas cum petiolis longiusculis promens. Gr. serotinum arvense spicâ laxâ pyramidali. Ray Hist.
nt. hirsut. foliis, spicâ leucophaeâ dirupta. Gr. pumilum hirsut. spicâ purpuro-argentea molli nostras Ray Hist. His duab, novissimè memoratis
minum species multo similis nos docuit ex propria collectione amicissimus vir D. Samuel Doody. Pharmaceutices & Rei -
rbaricæ callentissimus.
inum marit. minus Ray Hist. an Gr. typhin. Danicum minus Park. quærit & ipse Clarissi. Rajus.
reum præcox spicâ laxâ canescente Ray Cat. Pl. Angl.
nicul. bromoid. minus, paniculis aristat. unam partem, spectantib; Ray Hist.

TAB. XXXIV.



Tab. xxxiii.

1. Gr. aveñaceum parvum procumb. paniculis non aristatis Rāy Hist. Pl. univers.
2. Gr. capillaceum locustellis pennatis non aristatis Rāy Hist. Gr. juncēum Dalecham. pij. Hist. Lugd. Gr. foliolis junceis brevibus radice nigrâ & albâ C.B. pin & prodr.
3. Gr. cyperoid. angustif. spicis parvis sessilib; in foliorum alis Rāy Hist.
4. Gr. cyp. elegans spica composita. Rāy Cat. Pl. Ang. ubi ad spicam (dicit) nullum apponitur folium, & in Hist. (spicâ compositâ asperiore) legitur). - nostri tamen spica mollis est, & foliolum ei subjectum habet.
5. Gr. cyp. polystachion flavicans spicis brevib; prope summitatem caulis Rāy Hist.
6. Gr. cyp. polistachion lanuginosum Rāy Hist. an Gr. cyperoid. Norvegicum parvum lanosum, Park.
7. Gramen cyperoides ex monte Ballon simile spicâ totâ è plurimis spicis compositâ Rāy Hist. an Gr. cyp. elegans multiferâ spicâ Park.
8. Gramen cyper. ex monte Ballon simile humilius in maritimis & arenosis nascens, Rāy Hist.
9. Gr. cyperoides spicâ simplici compressâ disticha D. Pluk enet. Rāy Synop. Stirp. Brit. & Hist.
10. Gr. cyp. minimum, seminib; deorsum reflexis, pulicaribus. Rāy Hist.
11. Gramini Luzulæ accedens glabrum in palustribus proveniens paniculatum, an Gr. cyp. palustre leucanthemum Rāy Hist.

TAB. XXXV.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Tab. xxxv.

1. Gr. junceum clavatum minimum, Holosteum palustre repens foliis, capitulis, & seminib; Psyllij Rāy. Synops. Stirp. Brit. & Hist. à Reverendo viro D. Matthæo Dodsworth, Evangelij prædicatore vigilantissimo, & Botanicorum numero nequaquām postremo, nobis primùm ostenditur.

2. Gram. junceum. Holosteum minimum palustre capitulis quatuor longissim. staminib; donatis Rāy. Syn. Stirp. Br. & Hist.

3. Guaiacum Jamaicense Lentisci subrotundis foliis lætè virentib; flore albo. Guaicū Officinar. Parad. Bat. Prod. Guaiac. foliis Lentisci. CBP. Guaiaci ramulus Clus. apd Monardem. Guaiac. Terentij apud Hernāndez.

4. Guaicū Jamaic. foliis beluti muriâ conditis, spissiùs virentib, flore subcæruleo. an Guaiacum foliis Ceratonice, Aceris. s. Bursæ pastoris fructu, flore cæruleo Breyn. Prodr. 2.

5. Gratiola affinis è Coromandel foliis superioribus, Rubiæ quadrifolicæ crenatis, imis. Coriandri modo tenuissimè divisis.

TAB. XXXVI.

TAB. XXXVI.

1. Malinus humilis erecta semine folliculis membranaceis bivalvib. in latitudinem porrectis, & utring. recurvis, longo pedunculo insidentib.; clauso. Hal. angustif. semin. ib. singularib. bascullis Bursæ pastoriæ æmulis, bicornib. inclusis. Raij Hist. app. an Halim. min. Gerinanic. Park Halim. min. CB. pin. et Halim. aurei. Eiusd. prodr. hanc etiam in maritimis Belgiis nuperrime inventi. Spettatissim. bir. et Rei Herbariæ amantissimus B. Carol. du Bois cui, ramuli summitates solicitè excultæ apud Sch. Baulin. ad Portulacæ marinæ frutic. & Icoacam appingi dicitur. item. apud Bedeuke. & Stapel. Annot. in Theophr. pag. 509.
2. Hedera monophylla convolvuli foliis birginiana. Clematis hederacea birginiensis umbilicato folio flore papposo CAI. HER. Hedera birginian. Clematis scandens, radicel. flavescente. Col HAL. si hiq. flores pappis coronantur ad clematidis genus amandari debet, multoties hanc plantam nos florentem vidimus, at nunquam nobis Pappus occurrit.
3. Heliotrop. monosperm. Indic. procumbens, glaucophyllon florib. albis. aiv Tolucy. Xochiuh Mexic. Hernand. Heliotrop. Americ. minus glabrum folio. angusto glauco. Br. Pr. 2.
4. Hemionitis Americam. speciosa folio Securis Romanæ figuram æmulante. Hemionitis parva Antegoana folio Platoni serè in modum divisa Raij Hist. app. ab honestissimo viro D. G. Horsmed ex Antego Insula in Patriam reduce nos accepimus.
5. Hemionit. Ind. Orient. Phagis. Exult folio aliquatenus accedens. aiv Hemionitis mulifida Zeylan. Costi sagittata s. Filix foliis integris Zeylanica paleolo alato. Breyn Prod. 2.
6. Hemionitis pumila foliis integris, trifidis, et quinquefidis paria Cambrobritannica. Hemionit. pumila trifolia vel quinquefolia maritima. D. Lloyd. Raij Synop. Sherp. Brit.
7. Hemionitidi affinis Americana epiphyllanthos, folio simpliciter pinnato. Hippoglossi æmulo, radice reptatrice lignosa. ad foliorum crenas florida.

TAB. XXXVII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

xxxvii.

1. Hesperis prodiotosa hortensis Molluginis ad imaginem degenerans.
2. Hieracium folijs & floribus Dentis Leonis bulbosi semitæ curvo. Moris. Prælud. Dens Leon. folijs radialis Bot. Monsp. Dns Leon. minor folijs radialis. CB. prodr. & pin. cui & Trinciatella Italorum Camerar. Hort. Med.
3. Hieracium s. Piloselle majoris species folijs variùs dentatis flore singulari nostras.
4. Holosteum s. Coronopus serpentina folijs betonicæ angustis, spicâ Rubiæ spicatæ gracili. an Holost. strictissimo folio minus. C B P. Serpentina ovium minima. Lob. Icon. Holostrum nobis hic allatum optimè convenit cum Descriptione Plantæ quam Ioh. Bauhin. in Hist. pro Coronopo serpentaria ovium minima proposuit in quâ tamen foliola cauliculis adnexa non concedet.
5. Hyoscianus pusillus aureus American; Antirrhini folijs glabris. forte Hyosciami albi Ægyptij Veslingiani. baridas minor ex Americâ. hujus unam aut alteram plantam à seminib, ex Americâ delatis curâ & vigilantiâ D. Georgij Loudon Regij nunc Hortulani, & de Rebus Botanicis optimè meriti, pronatam conspexi; in Horto cultissimo novisq; ac rarioribus undiq; conquisitis stirpibus instructissimo, Honoratissimi Domini, & Reverendi admodum in Christo Patris Henrici Compton. Episcopi Londinensis, omnium Botanophilorum Mecœnatis colendissimi.

TAB. XXXVIII.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Tab. XXXVIII.

1. Jacea latifol. caule alato capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo è squamularum cuspidib; orto. Jacea latifolia spinos. capitulis pulchris flore pur purco I.B. an Jac. Cyanoid. altera alato caule. Cyanus Creticus spinos; Belgarum, Cat. H.R.P. Jacea foliis Seridis candicantib; purpur. C.B.P. Jacea purpurea Valentina muricato capite Clus. cui & ille attribuit folia Seridis canchicantlia.

2. Jacea montan. alato caule purpurea ex singulis capitulor. squamis spinulis. plurimis in Hemicyclum dispositis. Jacea mont. purp. echinato capite Park. Jacea Cyanoid. echinato capite, C.B.P. Jac. mont. comm. capite Clus. fortè etiam Jacea capitulis hirsut. Boelij Ger. emac. sub hoc enim titulo multis abhinc annis et à D. Edvard. Morgan. viro in Rebus Botanicis haud infimæ notæ accepimus.

3. Jacea spinosa Sonchi angusto folio, maritima, minor, ad squamas capituli, spinulis plurimis.

4. Jac. incana Cyani majoris folio in aculeum desinente, squammis cum ciliarib; nigris. an Jac. nigr. angustif. vel Lithospermi arvens. fol. C.B.P. quæ à in prodr. item Jac. nigra angustif. alt. fol. longioribus, lanuginosis. ejusd. prodr. fortè etiam Jac. min. fol. aculeatis, Cyani majoris nomine missa ejusd. Tin.

5. Jac. Tingitana Centauroid. echinato capite billoso, ex unaquâq; squamâ plurimis aculeis circulariter radiatis. Huic proximè accedit vemi fallor eadem est Jac. capite longis aculeis spinoso C.B.P. Quam iste vir magnus &c in arte Botanica & Jacobæa 1570, à Jac. mont. echinato capite Clus. diversam esse, rectè pronunciabat. Centaurij marini nomine ad Casparū. Bauhinum D. Bobartus misit.

TAB. XXXIX.



Tab. XXXIX.

1. Jac. laciniato Sonchi fol. s. latifolia purp. capitulo spinos. C B P. ex capitulor. squamis spimulæ plures pulchro ordine stellam dimidiatam referentes, atq; deorsùm tendentes exeunt, quarum media ceteris latiore longior evadit.
2. Jac. min. Stœbe Gallicæ & Austriacæ accedens, squamis capitulor. crebrioribus, quarũ singulæ unico saltem aculeo sunt armatæ.
3. Jac. min. exotica ad foliorum margines spimulis donata.
4. Jac. min. Attica capitulis plurimis ex apicibus squamularum spinâ rectâ singulari. ã doctissimi pariter ac humanissimi necnon Reverendi admodum viri D. Georgij Wheeler. Eq. aur. liberalitate accepimus.
5. Jacobea lanosa foliis brevibus subrotundis Floscllæ flore impense flavo. aũ Jacobea lanata foliis brevibus subrotund D. Bau. cat. Stirp. Virg.
6. Jacob. pumila Absinthij Umbelliferi foliis incanis. floribꝰ, velut in Umbellam positis. aũ Chrisanthemum Alpin. 1m clus.
7. Jacob. pumila sinuatis foliis argentea, supremo ejus flore singulari. Ingenioso viro & Chirurgo Londinensi D. Parvo hujus communicationem debeo.
8. Iberis Americana latioribꝰ, serratis foliis, ad caulem virgultatis.

TAB. XL.



Tab. XL.

1. Juncus aculus maritimus, caule triquetro rigido, mucrone pungente. an Juncus aculus maritimus caule triangulo. C B P. 11. & Prodr. 22.
2. Junc; aculus maritimus; caule triquetro maximo molli. v. procerior nostras.
3. Junc; aculus maritimus; caule triquetro molli spicâ glomerata. in Stylo sessili.
4. Juncus aculus maritimus capitulis rotundis C B P. 11. Juncus aculus maritimus, alter Park.
5. Juncus minor aculus maritimus prolifer. s. ex uno capitulo multa.
6. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis Equiseti, Ray Hist. Junc; mont. parvus cum parvis capitulis luteis I B. Gramen spartum capitulis Equiseti. Merett. Pin. Rer. Nat. Brit.
7. Juncelli visum minimi capitulis Equiset Ray Hist. primus ejus Inventor fuit amicissimus vir Reiq Herbariæ amantissimus D. Matth. Bodsworth. qui et jam olim hujus exemplar, optimè exsiccatum nobis benignè communicavit.
8. Junc; parvus calamo supra paniculam compactam longius producto Raij Hist. in Westmorlandiâ invenit ille Stirp. Britannicar. explorator. indefessus. D. Iacob; Newton. cujus munere accipiebam.
9. Juniperus Caroliniana Thujæ ramulis fusis. v. compressis odoratior. an Cedrus folio Cupressi major. fructu flavescente C B P. Thuja genus 4tum Hist Lugd. 61.

TAB. XLI.



Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 1.



Fig. 6.



Fig. 3.

Fig. 4.

Tab. XLI.

1. Lamium album Paristariæ folio virginianum. Lamium Paristariæ facie Moris. Prælud. Bot. 278. Lamiū Paristariæ foliis Ic. Roberti. sed hujus Icon minus placet. an Lamium album non fœtens folio oblongo minus Cat. HRP. 99. Lamium Paristariæ folio Bruynero Lonquet Hort. 69.
2. Lamium pusillum rubrum Paristariæ facie Americanum. an Lamium Novæ Angliæ Paristariæ foliis Raij Hist. 560.
3. Lam. rubr. minus foliis profundè incisis Raij Hist 560.
4. Lam. Cannabinum aculeatum flore specioso luteo, labijs purpureis. Cannab. spuria flor. speciosa luteo. labro purpureo Raÿ Hist. 561. an Cannabis altera spuria Park. pag. 599. an Urtica aculeata foliis serratis altera CBP. 232. quærit & ipse Cl. Rajus.
5. Lappula Bengalens. tetraspermos Ribesij folio echinis orbicularib; ad folior exortus plurimis simul Sessilibus. an Alcea Indiæ Orientalis fructu lappaceo folio Ribes Breyn. Pr. Nexpayan Mexicensium Hernand huc pertinere videtur.
6. Centinula palustris Indica foliolis subrotundis binis capillamentis ad imum barbatis.

TAB. XLII.



Tab. XLII.

1. 2. Cucoum. s. Lunaria baculo sublongo intorto. Raÿ Hist. 789.
2. Lichen parvus erectus foliolis profundè laciniatis. ān. Lichen minim. foliolis laciniatis. Raÿ Hist. 126. in Umbrosis humidis ad parvulum fluentum juxtà Fontes medicatos apud Dorvictum, quatuor circitèr milliaria à Londino. dissitum. in agro Surriensi. copiosissimum invenimus.
3. Lilio-narcissus. s. Narcissus liliflorus Carolinianus. flore albo. singulari. cum rubedine dilute. ab honestiss. viro & Hortulano admodùm industrio. D. Gulielm. Darby. accepimus ad quem huj. radices plurimæ ab amico suo è Carolinâ allatæ sunt. & in viridario suo jàm nunc superbiunt apud. Hogsedon. vicum Londini. ad aquilonem suburbanum. lit. a. capsulam triquetram. semirab. oppletam significat.
4. Limonium reticulatum supinum Boccon. de Pl. Sicul. pag. 82.
5. Limonium minimum comatum elegans. an limon minus densâ cauliculi seminudacei beluti comâ Lœl. Triumfet. catal. apud Fratrem. p. 65. fortè etiàm Limon. Ferulæ folio. Boelÿ. Park. 1235.
6. Liquid-ambari arbor. s. Styracifera Aceris folio fructu tribuloide. (i e) pericarpio orbiculari ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens. Oriental. Indorum Monard. apud Clus. 302. Xochicoxo. Quahuill. Mexicens. Hernand. Styrax Aceris folio Hon. Belli. CB. prodr. Styrax arbor virginiana Aceris fol. Raÿ Hist. nec Acer nec Platanus propriè dici potest: est enim quædam Heterodyta & sui generis Arbor. lit. a. fructum muricatum: cujus ē transversam sectionem. b. indicat. ccc. semina.
7. Lithospermum angustifol. umbellatum CB P. 258. & in append. 521. Park. Paul. Boccon. de Pl. Sicul. pag. 77.
8. Lychnis Alpina muscosis foliis densius stipatis. floribus parvis. Calyce duriore. ab Oxymoide muscoso Park. plurimùm differt.

TAB. XLIII.

1. Lotus argentea Cretica. Lotus κολυκέφαλος fruticosa Cretica argentea, siliquis longiss. propendentib; rachi Moris. Hist. 2. (nostræ tamen siliquæ pendulæ non sunt sed sursum rigescunt.) an Lotus inanus major s. Trifol. corniculatum siliquâ brandi. incanum maritim. Rây Hist.
2. Lotus fruticosior Africana, foliis incanis, floribus binis, amplis, coccineis. à D. Iohanne Fishwick accepimus.
3. Lotus tetralobos minor Cretica. s. Lotus parva, Cretica, procumbens, incana, quaternis siliquis cruciatim dispositis. Candia Lobeliuse.
4. Cythnis caryophyllæus virginian; Gentianæ foliis glabris, quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus flore amplo fimbriato. nostr. Rây Hist. app. 1898.
hùc fortè pertinet Eloquiltic Mexicensibus. s. Herba geniculata. Hernand. 310.
5. Lysimachiæ Ephemeron dictæ, genus Madera aspalense, Limonij foliis subrotundis, caule erecto fungoso. lit. a. florē exponū ostendit.
6. Lysimachiæ spicatæ purpureæ affinis Thymifolia, flexilis in caulimine plurimis, quasi in nodis junctis. Anthyllis fortè Prosp. Alpin. exot. cujus specimen Reverend. Vir D. Geo. Wheeler. è Græcia (quâ invenit) rediens nobis munere donavit.
7. Thymalus hebroyoid. Madera aspalens Hyperici foliis non crenatis, floribus; ex alis uno versu provenientibus. inter Lysimachias in Tabulis nostris per errorem transpositus.

TAB. XLIV.

Tab. XLIII.

1. 2. Lysimachia non papposa Melissophylla Maderaspatana. fortè Melochiæ genus siliquâ quinq; capsulari.
3. Malva Tingitana. flore Cæruleo parva.
4. Malva rotundifolia. glabra ex Hispaniâ flore amplo rubello.
5. Malva. Gallo-provincia laciniata s. Alcea tenuifolia. Pulsatillæ foliis. flor. amppl. rubente. Alcea tenuifol. humil. marithm. Gallo-provincialis fol. inferiorib; nonnihil ad Geranium accedentib; Sch. Bot.
6. Malva. Oriental. elatior longioris fol. fl. alb. minimo. capsulis conglomeratis. an Malva. frutex. Melochiæ angusto fol. floribus alb. fasciculatim. congestis. Par. Bat. Prodr. inter addenda.
7. Mandarù Maderaspatense foliis firmioribus parvis bisulcis. glabritie splendentibus ad Surculum densiùs stipatis.
8. Muscus polytrichoides elatior foliis angustis pellucidis & fere membranaceis noster Raij. Synops. Stirp. Brit.

TAB. XLV.

Tab XLV.

1. Marrubium aquaticum s. aquatile, foliis tenuius dissectis Moris. Prælud. fortè Marrub. palustre hirsut. tenuius laciniatum CB Pin. 236 in Prodr. nostri tamen folia sunt omninò glabra.
2. Marrub. an potius Cardiaca foliorum apicib, in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum petiolis insidentibus. an Marrub. ex Aleppo verticillis longis pediculis insidentibus. cat. Hort. Edinburg.
3. Matricariæ Achaovan. dictæ similis, Eryisimi foliis, Absinthij sapore Jamaicensis.
4. Melilotus lutea Indiæ Orientalis erecta, folliculis rotundis, parvis, spicis florum ex foliorū alis multiplicatis.
5. Melilot. Indic. humil. erecta floribus exiguis odorat. albis, paucorpijs majoribus, spicatum densius stipatis. Surudadi-pullu Hort. Malab. P. 9.
6. Mentha hirsutior Βραχυμαστυφυλλος. exolita. ad. Doody. accepimus.
7. Muscus polytrichoides humilior foliis latis subrotundis. Adiantum aureum humilius fol. latis subrat. Raij Hist. an Musc. Trichomanis facie Jungermanni foliis utrinq, rotund. splendentibus. cat. Alderf.
8. Melilot. lutea minima prohibens folijs minoribus: crenatis. an Melilot. Messanensis procumb. folliculis rugosis sublong. spicis florum brevioribus; Raij Hist. cal. Εχλυδ.

TAB.

TAB. XLVI.

Tab. XLVI.

1. Mespilus arborea Pyrifolia denticulato splendens fructu insigni rutilo Virginiensis. an Mespil; virginiana colore rutilo CBP. hujus folia aliquandò variant. v. sæpe-tùs multim laciniata evadunt, ut in Horto Nobilis. viri D. Caroli Howard. propè oppidum Barkin in agro Surriensi observavimus. hujus folium ad lit. a in Tab. exprimitur.

2. Mespilus Prunifolia Virginiana. non spinosa fructu nigricante. Rhamnus virginiana Prunifolia fructu nigro. ossiculo compresso Banist. Cat. Stirp. Virgin. an Mespilus. 2. Sorbus terminalis virginiana folio latiori fructu nigro Sch. Bolan. fortè etiam Mespilus spinosa 2. Oxyacantha virginiana nigra Cat. H.AL. à saltim aliquandò inermisque spinosa. v. ubimagis domestica spinis careat, ut accidit in Anthedonâ Azarolo Cæsalp. Theophrasto. memorato, nostram autem unquam spinosam esse, mè haud persuadere possum, b. ramulum fructu onustum significat.

3. Mespilus Virginiana. Apij folio vulgari similis major grandioribus spinis.

4. Mespil; Apij folio Virginianâ spinis horrida fructu amplo coccineo. Mespilus Apij folio Indica Sch. Bot. Mespil; spinos. 2. Oxyacantha maxima virginiana Cat. HAL. Oxyacantha Ossiculis binis fructu magno inclusis Banist. Cat. Stirp. Virg. Oxyacantha Americ. Galli calcar dicta. R.S. Bau. Ray Hist. hujus Arbor Spina Christi. & Spina Sancta per errorem dici solita est. lit. a. Surculum cum aculeo armatum b. b. ossicula demonstrant.

TAB. XLVII.



1. Millefolium Tanaceti foliis flore albo Moris. Præludi. in Corymbifera Millefolij Umbellâ folio alato & lacinato Raÿ Hist.
2. Muscus clavatus Coranoides segmentis latioribus. Compressis eburneo nitens noster Raÿ. Syn. Stirp. Brit. app.
3. Muse, clavatus Coranoides Gagatus nigredine splendens, noster Raÿ. Syn. St. Brit. append.
4. Muse, montanus gracilis ramosus, bifidis longioribus glabris. an Muscus ramosus erectus minor CB. pin. & prod.
5. Muse, Alpinus ramosior, erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus. an Muscus terrestris ramosus erectus major CB. pin. & prodr. Muscus montanus Tab. Icon. forte etiam Muscus hirsutus capillaceus Merett. Pinac.
6. Muscus parvus stellaris CBP. Park. Adianthi capitulis. Muscus in ericetis proveniens IB. Hist. Lob. Icon. sed figura non placet.
7. Muscus terrestris erectus minor, polyspermos Raÿ Hist. & Synops. Method. Stirp. Brit.
8. Muse, terrestris repens pediculis foliatis binis clavis in altum se erigentibus. Muscus alius terrestris, Cupressodium Dodonæi Hist. Lugd. qui à Musco terrestri 2. ejusd. Histor. (de) terrestri repente à Dodone picto IB. plurimum differt, licet in Pinace suo Casp. Bauhin. ab illo non separat. sed plerè utrumq. conjunct.
9. Muscus Lycopodioides, erectus perpetuo virens, in arboris procerioris cortice. an Juniperus cæl. s. Spica arboris Hernand. Hist. Mexic.
10. Muscus Coralloides, multifido capillaceo folio, Palmites pelagica nigra. Muse, capillac. multifid. niger. CBP. ad lib. a. Palmites pelagica alba depingitur. Muscus capillac. multifido folio albido CBP. Corallidis affinis 2. Muscus marinus tenuis capillo. IB. Muscus marinus vulgatissimus Lob. Icon. p. 2.
11. Muscus marinus denticulatus, procumbens, caule tenuissimo, denticulis bijugis Raÿ. Histor.
12. Muse, pennatus, ramulis & capillamentis falcatis Raÿ Hist.
13. Muscus marinus Neapolitanus Park. Coralloides lenta faniculacea. IB. Fucus faniculaceus colore livido nobis Raij Synop. app.

TAB. XLVIII.



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 9.
Fig. 8.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 7.

Tab. XLVIII.

Fig. 1. Muscus aureus, capillaris, palustris inter foliola folliculis rotundis (ex sententia D. Doodij) quadripartitis. Graminifolia palustris repens. Bosculis granorum Piperis cernuis. Raÿ. Hist. & Synops.

2. Muscus pelagij, pennati, rubens, ramulis numerosis mollib, latius se spargentibus. an Muse, marin, rubus pennatus nostras. Raÿ Hist. item Muse, marin, purpur. parvus, foliis oblongis. Milleſolij ferè divisura. ejusd. Hist.

3. Muse, marin, denticulatis minor, ramulis in creberrima capillamenta sparsis. an Muscus marinus denticulat, minor, denticulis alternis Raÿ Hist.

4. Muscus marinus geniculatus, eburneo nitore candicans, erectus, cauliculis pinnatis. Muscus marinus candidus Coralloides Hist. Lugd. Teh. Icon. p. 1. Corallina altera Tabern. Icon. sed figuræ minus placet. Muscus Coralloid. squammulis loricatus. CBP.

5. Muscus marinus major arcuatè denticulatus Raÿ. Hist. Muscus Coralloides alter albus Teh. Icon. part. 2. Abies marina Belgica. Class Hist. Abiti simile maritima CBP.

6. Muscus marin. s. Coralloid. non ramosus erectus, arenarii coloris, Asparum cormuli adinstar, geniculatus. Muscus marinus Equiseti formis non ramosus Raÿ. Hist.

7. Myosotis Scorpioides, an potius Heliotropium minus erectum, foliis sublus incanis, è Madera aspatan.

8. Myrt; Brabantiæ accedens, Africana, bacris carens, conifera. Arbor conifera odorata foliis Saliis rigidis, leviter serratis Raÿ. Hist. an Laur, serrata odora Promont. Bon. Spei. Bod à Stapel. in Theophr. p. 333. ex America quoq, nobis allata est. v. à Nostratib, Insulam Bermudensem incolentibus Laurus odorata, vulgò nominatur, ut ab honestiss. viro Jacobo Harlow. didicimus.

9. Myrt; Brabantiæ similis, Carolinensis, baciifera, fructu racemoso, sessili, monospermo, fructum fert bacis Sacharo candidiss. incrustatum, cujus ramulus cum fructu, ut per Microscopium apparuit, adpingitur. Hujus pulchri Sanè perrari, & prorsus novi Arbusculi Americani generis, munificentia Illustris viri D. Guilelmi Courtèae, compos factus sum.

TAB. XLIX.



Tab. XLIX.

1. 2. Muscus polytrichoides angustifolius pellucidus ramosus noster Raÿ. Synops. Stirp. Brit.

2. Njoræ Hort. Malab. similis è C. Moderaspatan. Arbor rect. Ceratiæ fol. Corymbosa.

3. Nir-Sthulli Hort. Malab. accedens è Cormandel. Gratiolæ affinis Indiæ Orientalis, Digitalis æmula. ubi tres exhibentur species, seminum figurâ discrepantes, ut litteræ a. b. ccc. denotant.

4. Oenanthe aquatica, Pimpinellæ Saxifragæ divisurâ, nostras. Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens IB. Oenanthe Pastinacæ Sylvestr. folio semine Atriplicis CBP.

5. Onobrychis Bisnagarica, Mimosæ foliis, siliquis ad unum solummodò latus dentatis, ex alis polyceratos.

TAB. L.

Tab. L.

1. Onobrychis minor flore parvo purpureo siliquâ echinatâ, majoribus aculeis. Raij Hist. Onobrych. minor, siliculis echinatis cristatis majorib; v. crassiorib; aculeis pradikis donata Moris. Hist. 2. an Onobrych. fructu echinato minor. CBP. item Caput Gallinaceum minus ejusd. pin. & prodr. Onobrychis. 1. Caput gallinaceum minus fructu maximo, insigniter echinato. Raij Triumfetti. Cat. apud fratrem.

2. Onobrychis minor foliolis cordatis siliquis magnis, lateris compressis, bini isthmo interceptis, floribus in globum congestis. an Onobrychis foliis bicis, fructu echinato major caulescens & ramosa Schol. Bothh. an Onobrychis semine Cupreato aspero minor CB. Pin. & Prodr.

3. Onobrychis Gangaica monophyllos siliculis singularibus, lævibus, falcatim per internodia discriminatis.

4. Pai-paroea. Conradi. Hort. Malab. similis, sinon eadem. Frutex baccifer Malabaric; fructu plano rotundo piloso tetrapyreno. Raij Hist.

5. Perfoliata alpina angustifolia minor CBP. quæ 4.ª in Prodromo. Park. Theatr.

6. Perfoliata minor angustifolia, Buplauri folio CBP. Perfoliatum angustifolium montanum Col. ecphr. 247. Perfoliata angustifolia Alpina minima Park. Auricula leporis affinis, Odontitis lutea Valerandi. v Dalechampij. IB. Hist. tom. 3. lib. 27. p. 201.

TAB. LI.



Tab. LI.

1. Palma Jamaicens. non spinosa humilis. folio multisciso. flabelli formi, Arapanæ. Malabar. haud absimili.
2. Phaseolus marsupinus purgans, radice bivaci. foliis crassis, subrotundis. Binagaris, an Phaseolus Brasilicus Floridæ Renoval. tit. p. Hasselq. Meriannum. Katu-tsjandi. H. Malab. p. 8.
3. Phaseolus Orientalis Anagyridis folio. siliquâ falcatâ glabrâ.
4. Phaseol. minimus Madraspatanus, floribus miniatis. Meliloti admixtis spicatis, huic fortè pertinet Vstastlalametl Mexicanis. Hernand. Hist. 452.
5. Paronychia myosotis virginiana. foliis subrotundis. Nasturtium myosotis insipidum Bonis. Cat. Stirp. Virgin. à D. Bobart. amicissimè communicatum fuit huius optimè asservatum exemplar.

TAB. LII.



LII.

1. Ornithopodium majus è Madraspatàn. foliis lanugine argentatis.
2. Phaseolus parvus spicatus Madraspatens. cordatis, & insanis foliis, siliquâ utriculatâ nigrâ.
3. Phaseol. minor Vinagaricus foliis argenteo colore villosis, siliquis torosis brevibus, spadiceâ hirsutie pubescent. frutu parvo Scaraboide nigro. an Phaseol. Zeylan. Salviæ foliis subrotund. mollib. & hirsutis Parad. Bat. Prodr. item Orob. Phaseoloides Zeylan. foliis Salviæ rotundis insanis subhirsutis ejusd. P.B.
4. Phaseolus Nevisensis. foliis multangulis, tuberosâ radice esculentâ, Phaseolus perennis Martinicensis radice tuberosâ esculentâ, angulose ornato folio P.B.P. nostratib. the Turneptree bean.
5. Phaseolis accedens, Frutex Taphnapatmas spinosus, frustu Ovali, nigris & cinereis punctis, elegantèr guttato P.B.P.
6. Pilosella minima, Gnaphalij montani lanosis foliis, flore aureo, nondùm descripta.
7. Polygonum minus procumbens, niveum fusè glaucis exiguæ. Polygonum minus candicans supinum Botan. Monspel. Polygala repens nivea C.B.P. Polygala repens Nuptiarum Obs. & Ic. Lob.

TAB. LIII.

Malabaricæ similis, Arbor è Madraspatan. (h.e) Clematis arborea Indica Jeglandis folio, flore luteo, spicato, minimo, siliquis longis, angustis, adratis, alatis contortis, seminibus substantiâ lignosâ obductis Breyn. Prodr. 2.

ulæ affinis Africana glabra, floris galeâ binis tristis fimbriatis, ornata, ex involucro magno diphtalo erumpente.

num maritimum longius radicatum nostras, Serpylli folio sinuato, crasso, hirsuto, Synopsi. Stirp. Britt. app. fortè Polygon. minus

tifolium C. B. Pr. prodr. Polygon. minus Monspeliens. Park. huic proximè convenirat Polygon. Herniariæ foliis, sæpe ramplè radiis Astragali

dv. Lob. ss. hæc herbula non sicut tota incana, nostra autem glabrikie splendet.

num lignosum à maritimis Africanum, cæruæi coloris foliorum dice, squamulis pellucidis ornatum. Limonium lignosum Gallos ferens Bocconi. huic

rtinet, & fortè idem est, à D. Fairwick. nobis transmissum.

ica virginiana Scabiosæ Austriacæ foliis indivisis. Ptarmica virginiana folio Helenij Moris. Prælud. Pseudo costus virginiana, seu Anony-

as corimbifera virginiana flore albo Rajj Hist. hujus specimen jam ante triginta circiter annos in Horto D. Walker. apud Westmonastrium

imus: cujus filius hanc plantam cum aliis variorib; è virginiâ transmisit.

TAB. LIV.



Tab. LIII.
1. Pentaletiæ Malabaricæ similis Arbuscula Maderaspatensis (i.e) Batisera Indica baccis oblongis in Umbella formam dispositis Raij Hist.
2. Pulegium Virginianum angustifol. (Serpentaria dictum) flosculis in Cymis, an potius Clinopodium Pulegij angusto rigidoq. folio virginian. flosculis in Cymis. Pulegium virginianum Nonnullis, alijs Serpentaria aut Colubrina virginiana Raij Hist. Satureia floribus in summitate dispositis Cat. H. A. I. Pulegio Cervino quodammodo accedens Capitata Chamæpitys Austriaca cæruleæ foliis v. facie Breyn. Prodr. 2.
3. Quercus virginiana Castaneæ folio, nostra Raij Hist. append.
4. Quercus Esculi diversa foliis amplioribus aculeatis, an Quercus alba virginiana Park.
5. Quercus virginiana rubris venis notata The Scarlet Oake nostratibus dicta. in Horto. Comptoniano, hujus plurimas adolescentes Arbores observavimus.

TAB. LV.



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.

Tab. LV.
Ranunculus hirsutus annuus floreminimo Raÿ Hist. & Synops. Method. Stirp. Brit.
Ranunc. aquatic. albus cirrinatis tenuissime divisis foliis floribus ex alis longis pediculis innixis Nobis Raÿ Synops. Millefolium aquaticum cornutum quoad figuram I.B. t. 3. item quoad figuram, usu, descriptionem C.B. Prod. Millefolium aquaticum cornutum majus Park.
Rapunculus aplenus Saliis glabro folio Bisnagovisus floribus aurantijs.
Reseda Masticuta foliis latioribus crispis. Reseda crispa Gallica Bocconi 77. Reseda latifolia flore flavo Moris Prælud. Botan.
Reseda minor Indiæ Orient. Pharmacæ pratensis folio, crenis exasperata. s. Sesamoides parvum Bengalense serratum.
Rhamnus Lusij Myrsinites facie Gangetinus, foliis densis, ferè convolutis. Jasmini floribus & spinis gemellis.
Rhamnus Orientalis spinis unicatis, alvo purpureis. Oleæ. s. Ligustri folio, cujus ad ictum, petiolus umbilico inarticulatur. Rhamn. Orientel. Ligustri folio spinis alvo-purpureis nostra Raÿ Hist. an Mahaleb genuinum Arabum?

TAB. LVI.

Tab. LVI.

1. 1. Rhoi Obsoniorum simile Americana, Gummi candidum fundens, non serrata, foliorum rachi medio alata. Rhus virginianum Lentisci foliis Raij Hist Bauh. Cat. Stirp. Virg. Mss. hæc est è Copalifera Arbor. Errandi ansam nonnullis scriptoribus; hæc fortè præbuit Arbor, quam Lentiscum nostram Europeam Virginiæ plagis indigenam esse contendere velint Vid. Hond. Geograph.

2. Ricinus Indicus pilosus, trifidus, vel quinquefid, flosculis atro purpureis, in Umbellâ aggregatis. Huitzpochotl. Huaxacensis, sive Ricinus Novæ Hispaniæ Hernandez. Hist. Mexic. an Ricinus Americanus folio Staphisagriæ C.B. Pin. app.

3. Euphrasia Alsines angustiori folio. Rubiæ modo Spicata, Golcondea, herbulam hanc exoticam sub Euphrasiarum vexillo militari, ab eximio Botanico D. Doody. didicimus, ideòq, malè hoc loco collocatur. ad Euphrasias oblonga sit.

4. Saamoùna Pisonis. s. Siliquifera Brasiliensis arbor, digitatis foliis, serratis, floribus Taurij purpureis. Arbor pentaphillas virginiana floribus spicatis monopetalis Mus. Courtnian. Raij Hist. hujus exemplar, cum multis aliis exoticis, ab insigni viro D. Gulielmo Courtenae, dono accepimus.

5. Salix longiori folio hirsuta, rosea, nostras.

TAB. LVII.



Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 2.

Fig. 6.

LVII.

1. Salvia peranquste sinuatis foliis, longis pedinculis insidentibus, lanuginosa. an Salvia angustifolia serrata C.B.P. Salvia Cretica angustifolia aurita Park. (2) Salvia tenuifolia I.B. Hist. t. 3.

2. Salvia Cretica pomifera Clus. Hist. Salvia bacifera C.B.P. Salvia gallifera Cretica I.B. Hist. t. 3 Salvia major Cretica latifolia v angustifolia, aurita v non aurita, pomifera v non pomifera Park. Theatr. huic folia sunt viridia.

3. Salvia auriculata crenata foliis crassis, lanuginosa, appendicibus austa.

4. Salvia trifoliata minor Indica.

5. Salvia Cisti folio 2 Pomolorio. Bon. Spec. forte Salvia Syriaca Cisti fomin. foliis acetabulis Moluccæ Breyn. hujus etiam Leonard; Rawolfius. mmimitin sup Hodæporico.

6. Salvia fruticosa Cisti folio haud intense flore, purpurea. Verbascum verum flore rubro arborescens Cat. Hort. Groningens. Verbasc. sylo. Salvifolium exoticum folio rotundiore Lobel. I.B. Hist. t. 3 Verbascum subrotundo, Salvia folio C.B.P. Verbasc. Salvifol. exoticum Cistoidis Park. et sub Verbasci Cistoidis nomine ex Horto Cl. Contareni, habuit Caspar Bauhinus. hujus flores Lobelio videre usquam contigit: et Cisti omnes appingit Parkinsonus. illorum pentapetalos dre, petalis subrot. colore flavo, staminibus rubentibus describit, sed hæc omnia per figurantium, non minus erronee à Cl. Hermanno in Cat. H. Ac Lugd. append. elegans hæc v minus cognita species, Verbasci latis, Salviæ foliis C.B. Synonymo proponitur. Anth triginta circiter annos in Horto D. Morgani luxurianten observavimus.

7. Saxifraga alsoides tridactylites Alpina minor flore albo major. Sedo Alpino tertio similis, altera Fab. Col. ephr. p. 2. Sedum Alpinum trifido folio C.B.P. Sedum Alpin. laciniatis ajugæ foliis. Park. Sedi affinis Aristolea Alpina flore albo I.B. Hist. t. 3.

TAB. LVIII.

Tab. LVIII.

f. 1. Sambucus humilis, s. Ebulus laciniata folio C B P. Ebulus laciniata Ponæ. Ital. ā flores b. fructum indicat.

2. Saniculæ majoris alpina, floribus albicantibus, fere Umbellatis. Saniculæ Alpinæ aliquatenus affinis I B. l. 3. Cotyledon hirsuta Phyt. Brit. Ray Hist. & Synops. an Saniculæ montanæ alterius species C. Clus. Hist.

3. Saniculæ s. Corrusa Americana spicata, floribus squallidè purpureis.

4. Scabiosa peregrina Thapsiæ majoris folio, squammatis capitulis, flore flavescente.

5. Scabiosa Bismagorica, s. Globularia frutex, rigidis foliis, ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autem mucrone præditis.

6. Scabiosa Tamaiensis hyssopi folio s. Globularia capitulis ad geniculo. foliis plurimis, stellatim ambientibus, hirsutissima. fortè Tricacanthos Tecomatli, s. caput formicæ Hernand. Hist. Mexic.

TAB. LIX.

LIX.
...cula virginiensis alba folio oblongo mucronato. Saxifraga alba folio oblongo acuminato B. Banist. Cat. Mss.
...ti Hort. Malab. ẽ Madera spatan. Jasminum Indicum Lauri folio inodorum. Umbellatum floribus Cassiae P.B.P. Jasmin. arboresc. Indic. flore ...tapetalo Umbellato. pharetreo. foliis Laurinis. Breyn. Prod. 2. Ratambala Leylanensium.
...rpioides Bunagavica. folio singulari rigido siliquis articulatis erectis. Onobrychis Zeylanica folio singulari oblongo rotundo D. Hermanno. D. Sherrard.
...rrenaria bulbosa Bistortæ minimæ foliis binominata.
...pheloria Secundariæ foliis Raii Hist. 2. v. Prælud. Bot. Ray Hist. & Synops. Lacinia nostra Anglica adjacentis Insulæ indigenam ejus B.B. Sherard.
... nuperrime Observata.
...uridaca Madera spatana. siliquis falcatis, fulvis, & villosis, plurimis circa ramulos stellatim positis. Stella Orientalis fulgens. a. siliquam seorsum, ...b. seminа demotant.

TAB. LX.



Tab. LX.

1. Sena ziquis Madraspatana, s. Tetraphylla siliquifera glabra, florum pediculis inter foliorū exortum dispositis. an Absus Varlingÿ. Obs. in Alpin. Senna Orientalis. Tetraphylla Absus dicta Lat. Hort. Ac. Lugd. Semen atro colore splendidum, parvis includit siliquis Ciceris amuli, ut ex Icone videre. a. semina rhomboide figurâ ostendit.

2. Sena tetraphylla, s. Absi congener hirsuta, à Madraspatana flore flavo, siliquis punctatis scabris, folliculos sub terram condens. b. folliculum c. nucleum è folliculo exutum. d. siliquam cum seminibus Pyri proximis extendit. an Arachidna Indica utriusq; tetraphylla P. BF. Manduli. Pisonis.

3. Senecio pusillus Madraspatanus foliis crenatis, crassis, & hirsutis. Plantarum hujusmodi Nov. Hisp. Recch. huic haud prorsus dissimilis.

4. Seseli pratense, foliis densius pilis pubescentibus.

5. Sinapistrum Indicum diphyllon, radicalis siliquis ad sinus foliorum ex adverso binis, ad hujus Sinapistri genus annumeri debent. Cupa-Veela. & Aria Veela Hort. Malab. p. 9. ut nobis videtur.

TAB. LXI.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

Tab. LXI.

1. Sisyrichium caruleum parvum gladiato caule Virginian. Gladiol; cæruleus hexapetalos caule etiam gladiato Banist. Cat. Mss.
2. Sisyrichium Bermudense floribs; parvis ex cærulo & aureo mixtis. Iris Phalangoides quorundam.
3. Sium minimum umbellatum foliis variis. Sium minimum Raji Hist. Sium minimum ferulaceis foliis Moris. Prælud.
4. Soldæ Malaboricæ similis Arbor Madraspatana auramentis donata.
5. Sonchus subrotundo folio nostras, læviss. spinulis circa foliorum oras ex asperatus. an Sonchus asper subrotundo folio C.B.P. Park. Sonchus asper vulgi, flore Hieracij Monspeliensib; Raji Hist. Monspelij sponte nascitur, & in Anglia.

TAB. LXII.



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 4.

Tab. LXII.

1. 1. Solanum insanum Chinense minus spinosum, floribus parvis, ferè umbellatis à D. Petiver. accepi.

2. Solanum Indic. spinos. atro virens, undiq; glabrum, foliis Branca Ursinæ divisuris, an Solan. pomiferum spinos. Indic. fructu echinato foliis Cardui s. Acanthi spinosi Bapt. Prodr. 2. in Horto quodam Hollandiæ celebriori collegit D. London, & nobis transmisit.

3. Solan. annuum nigricans Virginianum spinosiss., latè se spargens, flore cæruleo glabrum. Planta spinosiss. Virginiana Borraginis flore Tradescantio Raÿ Hist. 674. & in App. 1876. item Solanum pomiferum fructu &c. Africanum spinos. nigricans Borraginis flore foliis minus profundè laciniatis, spinis multò longioribus, majoribus & crebrioribus horridum Raÿ Hist. 1799. an Solan. Americanum laciniatum spinosiss. P. B. P.

4. Sonchus ἀφυλλόκαυλος angusto & oblongo folio nostras, per foliorum ambitum crebernimis spinulis asperatus.

5. Sonchus angustifolius maritimus C. B. Pin. & in Prodr.

TAB. LXIII.



b LXIII.

1. Solano ab potius Mirabili Peruvianæ affinis tinctoria Betæfolio scandens Cochin-Chinensis, flosculis puniceis, muricatis spicatis, fructu intùs Cochleato. Solanum scandens Malabaricum Betæfolio Commelin. Hort. Amst. Solanum peregrinum Betæfolium Raji Hist. Beta baccifera arboridea rotundi folia Zeylanica Breyn. Prodr. 2. Basella Zanon. Basella Hort. Malab. P. 7. ubi sub Bryoniæ genere (ramus aptè) recenseri bellet Commelin in Not. suprà loc. Bimbal Zeylanensib. & Cochin-Chinensibus Bracho-Condolo nominatur, succum ex floribus, non ex fructibus (ut balt Annotator) ex præsius commodissimè proliminatur & utitur. in Horto Comeliniano apud Fulhamenses cum floribus & fructu collegimus.

2. Spiræa Theophrasti similis Frutex Indicus latifolius, spicis florum è foliorum alis, hujus ramulum noster amicus Reverend. D. Dodesworth in horto cujusdam ingeniosi viri D. Wilkinson, Pharmacopœi Eboracensis collectum & optimè exsiccatum absq; titulo nobis Londino transmisit, & fortè Communi nostræ hujusmodi foliis Caroliniensis varietas haberi possit, an Frutex Virginianus floribus albis instar Spiræas compactis Cat. Ill. & Hort. Oxon. sit a significat flosculos per Microscopium viros, in perianthijs occlusos & nondum explicatos.

3. Sphondylium hirsutum minus foliis tenuiter laciniatis seminale. Sphondyl. mont. min. angustifol. tenuiter laciniat. nostrum Raji Synops. an Sphondylium Alpinum parvum CB. pin. & prodr.

4. Staphylodendron Æthiopis Μονοδακτυλοφυλλον. singulari hirsuto folio nitente, Staphylod. Afric. sempervirens foliis splendentibus Commel. Hort. Amst. Staphylod. Afric. folio lucido P.B.P.

TAB. LXIV.



Tab. LXiv.

1. Stachys angustifolia Lychnitis, non ornata. Stachys Cretica C. B. P. Stach. 3. Pseudo Stachys Cretica Park.
2. Stachys Lychnitis angustifolia ornata Madraspatana, lit. a, imum folium cumejus petiolo oblongo significat.
3. Syringa Lauri-folia Tamaricensis floribus ex flavo-pallescentibus, huic fortè pertinet Totoncapalli Mexicanis; Syringa lutea Hernand. Hist. Mexic.
a. Tamarind; Americanus siliquâ fere orbiculatâ monospermos Mus. Courten. Tamarind; Occidentalis siliquâ subrotundâ, Carandas fortè Bontio R. a. Hist.
4. Tamarindus Bimagaricus siliquâ productiore dispermos, seminib; beluti isthmo interceptis, ex semina siliquis exuta demotant.
b. Tordylio minoris ornata foliis angustioribus, vel rotundioribus. Asbasella Bimagarica.
5. Teucrij facie Bimagarica tetragonis rostrata, pilis scabris, foliis profundè dentatis.
6.

TAB. LXV.



Fig. 6.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 5.
Fig. 7.
Fig. 3.
Fig. 8.
Fig. 4.

Tab. LXV.

1. Teucrium lucidum parvo folio flore dense purpureo. Chamædrys Alpina lutisla Cat. H. R. P. Chamædrys Alpina latifolia elatior splendens Sch. Bot. Teucrium African. fruticans folio viridi splendido D. Magnol. Hus. Courtea.
2. Teucrium Atticum molli lanugine incanum. an Teucrium Creticum Clus. Hist. Park. Teucrium Creticum incanum C.B.P. forte etiam Scordium lanuginosum quod C.B.P. Scordium lanuginosos Creticum Camer. munificentiâ D. Wheeler. accepimus.
3. Thalictrum pratense majus Monspeliensium foliis rugosis Cat. H. R. P.
4. Thalictrum minimum fœtidis. Caspare Bauhino I.B. Hist. Park.
5. Thalictrum minus lucidum Cynanchis Carvonaria folio an Thalictr. foliis lucid. Rorismarini instar quorundam.
6. Thalictr. angustis. folio Park. Thalictr. pratense angustis folio C.B.P. quod prim. in Prodr.
7. Thapsia latifolia Hispanica Park. Thaps. 2. Clusij. latifolia flore luteo, semine loto simili Sesdi Peloponensi Lobelio I.B. Hist. l. 3.
8. Tithymalus 1. Chamædryes altera virgininna foliis crenatis & macula fusca elegantèr notatis, nostr. Raij Hist. Commelin. Hort. Amst. triginta abhinc ad minimum annis in Horto D. Walker. observavimus.

TAB. LXVI.



Tab. LXVI.

1. Thapsia glutinosa segmentis densioribus subhirsutis, alterno situ positis. an Sesseli Peloponense folia Cicutæ Adv. & Icon. Lob.
2. Thapsia Cisalpini semine candido crasso I B. Hist. l. 3.
3. Thaps. latifol. villosa C. B. P. Sesseli Peloponens. majus Lob. Ic. Thapsia quorund. hirsuta & aspera, Cicutæ folio, flore luteo, semine lato. aliis Sesseli Peloponesiacum I B. Hist.
4. Thapsia glutinosa Pimpinellæ Saxifragæ foliis bimensis. ex Hispaniâ Thapsia 4.ta s. Tragi. dicta Clus. Hist. Thapsia 4.ta Clusij. Tragi. hirsuta foliis glutinosis, radice nigrâ fœtis I B. Hist. l. 3. Thapsia foliis Libanotidis fœtidissima C. B. P. item Cicutaria latifolia fœtidissima altera Phytopin.
5. Thapsia Carotæ facie I B. Hist. Thapsia Carotæ folio C. B. P. Thaps. bulgaris Carotæ effigie Adv. & Ic. Lob. lib. 2. hujus umbellam seminibus onustam indicat.

TAB. LXVII.



Tab. LXVII.

f. 1. Thapsia maximis foliis glutinosa, segmentis densioribus ex adverso sitis. Thapsia Salmanticensis. s. f. Clusij. magno. flore luteo semine lato I B. Hist. l. 3. Thapsia maxima Hispanica Park. Thapsia maxima latissimo folio C. B. P.

2. Thapsia Libanotidis folio glutinosa glabra. Thapsia Thalictri folio Bot. Monsp. Thapsia s. Turbith Garganicum. semine latissimo I B. Hist. l. 3 alit. a. appingitur Umbella.

3. Thymdæa Africana glabra floribus rubentimis nostra Raij. Hist. app. an Sonamunda 4.ta s. foliis glabris acutis Breyn. Fascic.

4. Tribulus terrestris Amœnissimus Argemones flore flavo. Tribulus terrestris major Curaçaoie; P. B. P. Tribuli terrestris Ambrie, Chamæcisti flora. fructu spinoso maximo Breyn. Prod. 2. lit. a. fructum denotat. ab Insigni Botanico D. Tancred Robinson. accepimus, qui in Hortis Batavis collegit, sed absq; semine.

5. Trifolium purpureum Ebenus Cretica dictum. Lelo affinis folio v. facie Pentaphylloides fruticosi nostratis. floribus in spicam longiorem dispositis. Cytisus Cretensis ἀχνοδοξυλον. Honor. Belli.

TAB. LXVIII.



LXVIII.

1. Trifolium siliquos Leto affine, siliquis Ornithopodij. Trifolium siliquis Ornithopodij nostros Rajj Synops. & Hist.

2. Trifolium pediculis foliorum longissimis Bisnagaricum. fortè Trifolij Bituminosi genus India Orientalis.

3. Tulipifera Caroliniana foliis productioribus magis angulosis Mus. Courten. fortè Macpalxochis-Quahuitl Mexicensibus Hernandez. Hist. lib. 2. florem expansum indigitat.

4. Tulipifera virginiana Lauri inis foliis aversâ parte veris cæruleo tinctis, Conibacifera, Laurus Tulipifera baccis rubellis Cono crecto inclusis. Banist. Cat. Laurus Tulipifera foliis subtùs ex cinereo aut argenteo purpurantibus Rajj Hist. lib. 6. baccas Cono capsulato per tenue filamentum appensas ostendit.

TAB. LXIX.



Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

LXIX.

Trifolium pumilum Bisnagaricum argenteo nitore sericeum capitulis oblongis hispidis.

Trifolium Americanum elatius holosericeum summo folio bifido suave olens. Meliloti genus (fortè) Indicum.

Vitis Idææ species Maderaspatana Nirurifortè Malabarensibus dicta Hort. Mal. P. 2. an Frutex Indicus baciferVitis Idæa secunda Clusij facie Breyn. Cent. 1

Vitis Idæa Bengalensis Uvæ Ursi baccâ singulari, ad foliorum exortum barbulis donata.

Volubilis Gangetica sapore acri, & aromaticâ, clarius autem Aristolochia Clematitis Gangetica foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratissimâ, an Aristolochia Clematitis Indica odorata P. B. P. Addend. Carolo-Vango Hort. Malab. Sasanda Zeylanensib.

Volubilis, s. Aristolochia Clematitis. Bisnagarica, spinis gemellis aculeata.

Vadouk & Malabaricè haud multùm dispar, Frutex aculeatus è Maderaspatana Hort. Mal. P. 4.

TAB. LXX.



Fig. 2.

Fig. 1.

Tab. LXX.

f. 1. Verbena Scutellariæ. Cassidæ folia dispermos. Americana, an Verbena Indica Bontij. Hist. Ind. Or. fortè etiam Verbena Curassavica Scutellariæ foliis, flore purpurascente P.B.P.

2. Veronica Virginiana procerior, foliis ternis, quaternis, & etiam quinis, caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis. an Veronica Americana erecta, frutescens, & ramosa folio Verbenæ P.B.P.

TAB. LXXI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Tab LXXI.

f. 1. Vicia multiflora maxima perennis tetro odore floribus albentibus, lineis cæruleis, Striatis. Vicia Sylvatica multiflora maxima Phytol. Brit. Rajÿ. Synops & Hist. Vicia perennis multiflora spicata major. floribus albis, lineis cæruleis notatis. Moris. Hist. 2.

2. Vicia Lathyroides nostras, s. Lathyrus Viciæ formis Rajÿ Hist. & Synops. Lathyrus ex cæruleo & rubro mixtus Merret. Pin.

TAB. LXXII



Tab. LXXII.

1. Vicia multiflora major angustifolia glabra, floribus oblongis cæ albo & cæruleo mixtis. an Vicia Onobrychidis flore C.B.P.
forte Vicia maritima multiflora alba Messanensis Rayi Hist. & Cat. Exter. forte etiam Aracus minor Lusitanicus Park.
Legumen pallidū Ulyssipponense Nonÿ. Brandonÿ. Ger. emac. app.

2. Vicia multiflora Cassubica frutescens Lentis siliquâ Breyn. Prodr. 1. Cat. Hort. Ac. Lugd.

LEONARDI PLUKENETII.

PHYTOGRAPHIA.

Seu

Stirpium Εἰκονες fidelitèr & exquisitè ad vivum delineatæ ÆNEIS & TABULIS illustratæ

in Quibus

Novæ plures & Exoticæ Plantæ à nemine hactenùs animadversæ nunc primùm proponuntur: Necnon aliæ quædam apud Neotericos dubiæ atq; obscuræ (mutatis aliquandò Nominibus proùt res ipsa postulat) perspicuâ brevitate dilucidantur.

PARS ALTERA

ET SIC MEMINISSE JUVABIT

Ea quæ scimus, sunt pars minima eorum, quæ Ignoram.

LONDINI. MDCXCI.
SUMPTIBUS AUTORIS.

INCLYTO HEROI

atq.

ILLUSTRISSIMO DOMINO.

DOMINO

à BENTINGK.

COMITI de PORTLANDIA. &c. &c. &c.

φιλαβολανῶν PATRONO longè Gratioſsimo.

LEONARDUS PLUKENETIUS

Hortorum amœnitates, ac adumbratam VEGETANTIS ORBIS Imaginem, Hisce TABULIS suis PHYTOGRAPHICIS in altera Parte contentis exhibitam, summâ cum humilitate.

Dat. Dicat. Dedicat.

TAB. LXXIII.



Tab. LXXIII.

1. *Absinthium Ponticum, repens bd supinum C.B.P. Absinth. Ponticum supinum Herbariorum Obs. Lob. Absinth. repens* Tab. Icon.

2. *Absinth. Halepense maximum, gratè odoris, comâ ddiaphori. Absinth. Sardonicum Arabicum D. Bobart. sorte Schecha Arabum, Absinthij genus circa Bethlehem* R. Zwölfv. *Hist. Lugd. App. Hæc pulcherrima Absinthij species, cum plurimis aliis novis & illustribus Plantis quas summâ diligentiâ ac indefessâ peregrinatione super Isthmum sive Europam, sibi conquisivit Ornatissimus vir, & hujus Botanices Scientissimus Ornamentum D. Gulielmus Sherard, nos donavit.*

3. *Acacia spinosa foliis parvis, crassis, & obtusis crispatis Maderaspatana, sive Indica, foliis Acacia Mesopotamicæ; Fab. Col. Nol. in Recch. Acacia similis Mesopotamica minutissimis foliis, siliquis inter se contortis, crassis, & obtusis.* Siliqua Nabathæa Breyn. Prodr. 2.

4. *Acacia spinis binis longissimis spinosa, siliquâ membranaceâ planâ, floribus albis, papilionaceis. Anagyrid. modo in Ubam propendentibus. Acacia Virginiana siliquis glabris* Ray Hist. *Arbor siliquas, Virginiana spinosa. Lycium Monspeliacum dictum* Park. *Anagyris Americana spinosa floribus albis odoratis* P.B.P. *item Laburnum odoratum. Lignosum folio Cytisoid. quod* P. *& P. Lotharingum spinosum. Mauritanicum foliis Glycyrrhizæ & flore albo* Breyn. Prodr. 1. *Glycyrrhiza Balearica major. Glycyrrhiza spinis spinosa, arbor sicula, Mauritanica. Laburnus flore albo quod* Br. Prodr. 2. lib. 2. *siliquam indigitat.*

5. *Adianthum aureum, Rubi marini aculeo ornatum, spinulis obtusis & longis, angustis, in summitatis tribus artibus, &c. Pardus habuimus.*

6. *Adianthi, maritimum, segmentis rotundioribus. Sch. Bot. Adiantk. mas* Tab. Ic. C.B.P. *ubi planè fallitur, quid sit hoc Adianthi genus, se nondum assequi Iersiæ, Angliæ nostræ adjacentis Insulæ alumna est, ut candidè nos monuit. D. Sherard.*

7. *Alcea an Malva potius erectior. Pentaphylli folio profundè incisa, purpurea, floribus sine pedunculis.*

TAB. LXXIV.



Tab. LXXIV.

1. Alcea Indica frutescens in laciniarias partes dissectis. an Alcea arborescens Japonica folio Turrcus, flore pleno carneo, in medio roseo? Cluſ. Breyn. Prodr. 2. Sansanqua Japonensibus.

2. Alsine Saxifraga Graminifolia, floscul is tetrapetalis herbidis & muscosis, an Saxifraga Anglica annua Alsine folio J. Plot. Raÿ Hist. forte etiam Saxifraga graminea pusilla folijs brevioribus rasis orib; & succulentioribus quæ ad Synops. Septentrionalibus Angliæ nostræ a D. Lawson. observata.

3. Alsine Polygonoides foliis tenuissimis per geniculabini ad summum caulium polyanthos. Alsine Nodosa multiflora Seh. Bot. a nunquam satis laudato viro D. Sherard habuimus.

4. Alsine palustris repens foliis lanceolatis floribus albis per exiguis. Alsine palustris exigua foliis lanceolatis, Plantaginellæ aquaticæ instar, floscul is albis bix conspicuis Mentz. pugil. Plantago aquat. minim. Clus. Hist. Park. Plantaginella palustris C. B. P.

5. Alsine aquatica major repens foliis acuminatis. Virginiana.

6. Althæa Indica Abutilis subrotundo folio, flore luteo, spicato, forte Malva Armeriæ. Abutilis folio, flore luteo spicato foliis incanis P. B. P.

7. Althæa Stammonij folio, flosculis albis Zeylanica P. B. P. Nalapongahuw Wijs adulis Zeylanensib; dicta in Hort. Regio. Hamptoniens. longe celeberrimo, conspeximus, & in Horto Comptoniano collegimus.

8. Althæa Americana frutescens, Melochiæ foliis angustioribus; an Malva frutex. Melochiæ angusto folio, floribus albis fasciculatim congestis P. B. P. inter Addenda. an Isora Urens. Hort. Malab. P. 9.

TAB. LXXV.

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

1. Alsine montana capillaceo folio C.B.P. Park. an Alpina Saxifraga angustifolia minima montana Col. ecphr. quæ parum differt ab Alsine tenui folia muscosa ejusd. C.B.P.
2. Alsine Caryophylloides angustifolia, multiflora, glabra, purpurascens, radice Astragali, an Caryophyllus sylvestris, graminis, multiflorus C.B.P. forte etiam Caryophyllus Saxatilis foliis graminis, umbellatis corymbis ejusd. C.B.P. (i.e.) Symphytum petræum. Lysimachion majus Thalij. Harcy.
3. Alsine Polygonoides tenuifolia flosculis ad longitudinem caulis deluti in spicam dispositis nostra. Raij Synops. Polygonum angustissimo gramineo folio erectum. Bot. Monsp. in Maritimis circa Bostoniam agrilineolnis.
4. Alsine Polygonoides herbacea minor Lariessis foliis capillaceis ex uno pediculo plurimis. a D. Sherard. habui.
5. Alsine Alpina glabra sobolis roseis. an Saxifraga Bavarica Park. ejusd. D. Sherard. humanitate accepi.
6. Alsine Spergulæ facie Bengalensis foliis angustis ad genicula binis, flosculis autem plurimis, ad caulem radiatis, semine minutissimo fulvo.
7. Alsine Americana Nummulariæ foliis Parad. Bauh. Prodr. ab eodem D. Sherard. communicata.
8. Amaranthus Indicus herbaceus altissimus albus. Origani foliis lanugine incanis. an Amaranth. ; Aloepecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio. Breyn. Prod. ut forte etiam Amaranthoides humile Curassavicum foliis Polygoni Par. Bat. Pr. in Hort. Reg. Hampton. observavimus
9. Amaranthoides humile Curassavicum foliis Cepæa lucidis, capitulis albis. Pluk. Amaranthi affinis pseudo-Ides. Amaranthoides minor Americana procumbens. Sedi tenuifolij foliis, facie, flore oblongo niveo. Breyn. Prod. 2. Trifolij spica Crithmum maritimum non spinosum. Brasiliense Raij. Hist. Perexil. alo Mar. Lusitanis. s. Lasponga i. Brasilianum Pison. Hist.

TAB. LXXVI.

Fig. 1.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 5.



Fig. 6.

Tab. LXXVI.

1. Angelica charibbæarum elatior. Oluatri folia flore albo, seminib; striatis, Cumini odore & sapore.
2. Anchusa repens Lithospermi facie floribus cæruleis secundum folia prorumpentibus. Lithospermum birsutum Thalÿ. Harcyn. Lithosp. maj; repens latifolium C.B.P. Lithosp. majus Dodonæi fl. purpur. semine Anchusæ I.B. Hist. t. 3. l. 33. p. 592. ubi Icon minus feliciter exsculpta per errorem ad pag. 692. transposita est.
3. Anchusæ dd generis facie Indiæ Orientalis herba quadricapsularis.
4. Anonis purpurea procumbens bvna. s. præcox, fruticosa annua. biscosa. siliquis crassis, lentiformibus, varius disposita Moris. Hist. 2. sorte Anonis Hispanica frutescens, folio Ciceris sylvestris triphylli Sch. Bot. Anonis annua ramosa, foliis rotundis serratis Cat. Hort. Edinburg.
5. Apocynum birsutum, scandens. Americanum flore ampla purpureo. an Apocynum scandens Africanum birsutum P.B.P. ? Spectatissimi viri D. Fosteri Horto plurimarum Plantarum exoticarum instructissimo, Lambethæ ad Austrum sita florentem vidimus & habuimus.
6. Apocynum Curassavicum fibrosa radice floribus, aurantijs. Chamænerij foliis angustioribus P.B.P. an Apocyn. erect. minimum angustif. Americ. flore umbellato, aurantio, petalis reflexis Breyn. Prod. 2. sed nostri florum petala non reflexa sunt, sed potius in flectuntur & ita disposita ut flosculum centrum efformant.

TAB. LXXVII.



Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 2.

Tab. LXVII.

Apocynum Americum. erectum tuberosa radice, caule ramoso foliis viridioribus latis subrotundis floribus albis intus purpureis summo cauli
Cornutum magnum effer mentibus an Apocyn. Amer. is. arborescens foliis viridis, subrotundis. amplissimis. P. B. P. forte Apocynum
erectum non tuberosum, foliis ceraso. Umbellis florum albicantibus Banister. Cat. Sirp. Virg.
ber Americus Mori folio, baccale viminale Barrus arborescens annuus. ovati. Balsamum olens. Cedrus spuria Jamaicensib; nostratibus dicta.
ber Orientalis Bellidis aquaticæ folio, capitulis parvis quadripartitis. Kiluka Cingalensib; dicta hujus primum excitatum Insigni Botanico S. Tournefort Robinson. debemus.
ber Americanus tripetalla fructu Platani quo adnumerat amulenta Lignum fistularium (ita) Button wood. Nostratib; dicta.
um triphyllum minus purpureo rubente Virginianum. Arisarum triphyllum minus penè atro rubente Banister.
um Moschatum Ophioglossoid. s. ganeuddi Jamaicense. an melius Ophioglossum. Moschatum Jamaicense. Limonij foliis in extremo
Simuatis. an Arisarum fluitans penè nudo Virginianum. Banist. Cat. Mss.

TAB. LXXVIII.



Tab. LXXVIII.

f. 1. Aristolochia polyrhiza, os auriculatis foliis, Virginiana, fortè Polyrrhizos Virginiana Park. Serpentaria altera Virginiana bulgo.
2. Asarum Virginianum, Pistolochiæ foliis subrotundis Cyclaminum more maculatis. Asarum Cyclaminis folio Virginiana. Banist. Cat.
3. Asparagus deciduus triplicis spinæ. Prom. Bot. Spec. an Asparagus sylvestr. spinosa Africana C. B. Hort. Apost. dictus in Hort. Reg. Hamptonensi?
4. Aster lutus latifolius, non ramosus foliis summo caule ramosis, floribus amplis. an Herba Vulneraria. ad fluvium Prim. Hieronym. Tragi. Conyza affinis Germanica C. B. P. Consolida Saracenica 3ª Tragi. Hist. Lugd. Conyzis affinis, Herba Vulneraria, s. Solidago Saracenica 3ª Tragi hirsuta I. B. Hist. t. 2. hujus exemplar nobis amicissimè donavit D. Doody, qui ipse inter Siccatas exoticas, & quàm plurimas varias Plantas, in Horto Potavino jamdudùm collectas, & in Chartis asservatas, quas sibi impetravit absq; titulo invenit.
5. Aster Americanus Bellidis foliis floribus ex cæruleo albicantibus, spicis longioribus. an Aster Novæ Angliæ Tripolij floribus spicis longis dispositis P. B. P.
6. Aster Americanus, multiflorus, flore albo Bellidis disco luteo Dnæ de Fliness. Sch. Bot.

TAB. LXXIX.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

TAB. LXXIX.

Aster Americanus albus latifolius caule ad summum brachiato, si color florum, & foliorum conjugata positio non obstarent, hanc Tlalo-xoch II. Nov. Hisp. Recch. eandem plantam esse suspicaremur.
Aster Americanus albus Morif. Hist. 2. Arabum ex asperatis foliis, flo rum petalis reflexis.
Astragalus annuus foliis & siliquis hirsutis, plurimis in foliorum alis sessilibus. Astrag. siliq. foliis hirsutis floribus parvis Morif. Hist. 2. Fænugræco sylvestri Tragi in quibusdam accedens Planta I. B. Hist. l. 2. Astragalus marinus Botanis Park. Vicia Sarracenica Apula Col. ecphr.
Astragalus hirsutus cornutis plurimis uno pediculo stelliformiter adaptis. Ornithopodio affinis hirsuta frutus stellato C. B. P. Stella leguminosa I. B. Hist. l. 2. munere Ornatissimi Viri D. Patricy Adair acceptimus.
Astragalus Pyrenaicus inscapus foliis Bistæ, flore sulphureo Sth. Bol.
Auricula Ursi Virginiana floribus albis Borraginis instar rostralis, Cyclaminum more reflexis. à Celeberrimo Botanico D. Bannister in Anglia superrime transmissa.

TAB. LXXX.



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

LXXX.

1. Balsamum Caprarium Antego anum v Nevisense fœtidum. s. Arbuscula Americana Ballotæ folens. Stramoniæ foliis punctatis ferrugineâ lanugine obductis, floribus parvis pentapetalis spicatis.
2. Brassica spuria ailis non laciniata caule magis folioso hirsutior, foliis subrotundis. Brassica spuria minima, caule magis folioso hirsutior nostro. Ray. Synops. app.
3. Brunella Hyssopifolia C.B.P. Brunella minor folio rigido integro ejus d. Phytop. Prunella angustifol. I.B.
4. Bugula non ramosa densa mossa. Stantica seminibus albis. Munera doctiss. viri v. Divini Verbi Præconis apud Londinates Reverendiss. D.G. Stonestreet. primus novum hoc Bugulæ genus aspernus.
5. Buxus Africana rotundifolia serrata P.B. Pin Horto Regio Hamptonians. collegimus.
6. Buxus Lauri Alex angustiore foliis accedens Americana.
7. Cardiaca minor annua Americana flore argenteo. Leonurus Americana alba folio sideritidis longiore. Ex seminibus natam superiori anno in Horto Comptonians obtinuimus.

TAB. LXXXI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

1. Lignum Jamaicense, cortice cinereo candicante. Canella alba Church. Laurifolia Magellanica cortice acri C.B.P. Cortex Winteranus verus, s. Canella alba I.B. an Ligni aromatici Monardi cortex.
2. Cardous Tinguitanus, flore magno caruleo, folio Atractylidis divisuris subtilissime spinis duris horrido.
3. Caryophyllus sylvestris Alsines holosteo ramis glabris, flos unus. Calyce barbato. Armeria spinosa flore summo caule singulari inscripta Raij. Synops. app. forte Caryophyllus sylvestr. humilis flore unico C.B.P. an Cyphonis Messanensis parvo flore rubello, cui calyx oblongo angusto Raij. Cat. Exterar.
4. Centaurium siliquosum minus Bisnagarium Origani foliis amplioribus, floribus in Umbellis.
5. Chamædryfolia, Scandens clavis alata, Corymbifera Jamaicensis. huic forte pertinet Bryonoides. s. Jamaicensis Yaxtapoensis Mexicensibus Hernand.

TAB. LXXXII.



LXXII.
. Alg montana minor Tanaceti folijs Moris. Prælud Tanacetum montan. inodorū. minori flore C.B.P. Tanacetum album IB. Hist. l. 3.
Tanacetum inodorum secund. Clus. Hist.
. Centaurium Ciliare minus Cisti ex foliis firmioribus spicatis floribus ē Madera patān.
. Cretia diphyllos Antegoana Ricini majoris fructu ossea siliqua grandi inclusa. Arbor siliquosa ex Virginia lobo fusco scabro. C.B.P. item Arbor siliquas ex quâ Gummi Animæ ekicitur, ejusd. C.B.P. Icaiba arbor Gummi Anime fundens Pison. Acacia quo dammodò accedens, Arbor Animæ Gummi fundens Americana foliis magnis, acuminatis in pediculo binis, Lobo magno crassissima edulli. Brayn. Prodr. 2. Animifera arbor Brasiliana P.B.P. hujus siliquæ est Lobus ille ex Wigandæ cum de quo Clusius. in ex ot. Cæsius Nostratib, vulgò. a a. Lobum. bb. bb. fructum Indicam.
. Cæ alia quo dam modo affinis Bengalensis, foliis bigemellis, nubro undis, siliquis admodum intortis in orbē circum flexis, ex minio nigricantibus fructu rubro, maculis nigr ânigmato. in Asserame-Tomo Brasilien sibus Pisonā. siliquam b. fructum indigitant. in Horto Comptoniano enutritam vidimus.

TAB. LXXXIII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

LXXXIII.

1. Chrysanthemum minus Alpinum elegans flore magno albicante foliis crassis, Saxifragiæ chelidonides accedentib; hæc elegans planta Chrysanthemo Corymbifero Africano Trium satis quoad folia optimè convenit, à D. Parry. ad exsculpendam accepimus.

2. Chrysanth. Orientalis altissimus erectus scabrus Maderaspatanum florum petalis quinis tetragonis, ex calyce ample viridi fistulosis.

3. Chrysanth. angulosis Platani foliis Virginianum. Doronicum maxim. American. latissim. angulosis fol. radice transparenti. Cat. H. Ac. Lugd. an Chrysanth. latifol. Brasilianum C.B. prodr. forte Noviseptum quadrilaterum Hernandez.

4. Chrysanth. Virginian. villosum latis luteo petalis quinis oppositis. Chrysanthem. pentapetalon villoso caule Banist. Cat. Mss.

5. Chrysanth. hirsutum Virginian. auriculato Dulcamaræ folio octopetalon. Chrysanth. folio oblongo auriculato Banist. Cat. Mss.

6. Cistus humilis. Chamæistus Ericæ folio luteus & elatior C. B. P. Helianthemum tenuifol. glabrum flore luteo I. B. Hist. L. 2. Chamæistus Ericæ folio Park. Corisimillimus, Fruticosus in maritimis Andr. Cæsalp.

TAB. LXXXIV.



Tab. LXXXIV.

f. 1. Chrysanth. Alpin. Bellidis folio caule singulari. Chrysanth. parvum, 1. Bellis lutea parva latifolia I B. Hist. l. 3. Chrys. Alpestre Bellidis folio Cat. H. Pis. à Turre.
2. Chrysanth. Alpinum Bellidis folio ramosum.
3. Chrysanth. Amoric. bidens alatum flore parvo aurantiaco. Chrys. compositis alato caule Curassavicum P.B.P. Chrys. cannabinum Americanum alatum, flore aphyllo, glabro, aurantio, foliis Bacharidis. Breyn. Prodrom. 2.
4. Cistus Helianthemos, frica brevioribus foliis humilior. C.B.P.
5. Cistus Alpina, hemitis foliis Thymi minutissimis.
6. Cist. humilis Matthiolo Camphorata tenuissimis foliis glabris Chamæcist. Matthiolus. Corruda vel Coridi latifolio Schol. Bot. hanc eandem esse plantam, cujus ova folia tenuissima Camphoratæ similia, glabra, quam Celeberrimus noster Rajus circa Massiliam invenit, ab ornatissimo Botanico D. Sherard. merito censetur.
7. Clematis Alpina Gerardi folio C.B.P. & Prodr. Clematis cruciata Alpina Ponæ. Descript. Montis Baldi.
8. Clinopodium minus exoticum Thymi folio majore. Clinopod. Creticum Pr. Alpina Thymum exoticum flosculis nunquam expansis D. Bobart.
9. Conferva geniculata minima nostras. Oculatissimus D. Sherard. hanc esse Umbelliferam aliquando suspicabatur.

TAB. LXXXV.

LXXXV.

1. Clinopodium minus exoticum Thymi folio minore. Clinopodium Thymi folio variis Schol. Botan. Has 3 plantas novissime recensitas, a D. Sherard accepimus.

2. Clinopodium Amaracifolia, flore albo Americanum Distamnus ribi bo calum.

3. Convolvulus Sagittaria folio, flore purpureo Wheleri. ab nunc tere habus.

4. Convolvulus Stammanea dictus major virgin. an Stammonea macrorhizos Pr. Alp. exot. Stammonea macrorhizos. Cretica Park. hanc multo esse simillimam in Horto suo D. Edward. Morgan.

5. Cucumis parvus spinosus Virginianus fructu minimo Banist. Cat. Mss. fructum dd. semina deponant.

6. Cupressus Virginiana folio Abietis cornigera paribus deciduis, Cupressus Virginiana folio Abietis mollib; alis deciduis Bryon. Pr. 2. Cupressus Americana Park. Plant. Cupressus Americana fructu ovato ferens Habitat. Paludensis cujus fructus in formam speciosi stellarum amplitudinem abhujus nucleo haud multum abludit. Vide notatu Cl. Rajus oblectamen Natalis distantiam, eandem non ausus est affirmare. a. a. hujus nuclei integram & diversimode dissectam. b b. nucleos ostendunt.

TAB. LXXXVI.



Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 7.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 8.

Tab. LXXXVI.

1. 2. Cytisus foliis viridib; angustis quasi complicatis Monspeliens. C.B.P.
2. Cytisus procumbens Americanus fl. luteo ramosissimus, qui Anil suppeditat apud Barbadensium colonos. Chamæ-Indigo sylv. trifolia Barbadensib; ab Cytiso humili procumbente P.B.P.
3. Doronicis affinis longifolia, Ray Hist. Tussilago Alpina folio longo C.B.Hist. l. 3. Tussilago Alpina folio oblongo C.B.P. Doronicum Pyræ-naic. Persicæ foliis glabrum Schol. Botan. ubi pro non describit. ponitur.
4. Clathrus foliis pilosis striatis capillamento flave Madera spatana.
5. Chrysocome affinis Orientalis foliis ad geniculo binis, flore pentapetaloide argenteo apicibus auricis palescen.
6. Chrysocome affinis Orientalis foliis ad geniculo binis, flore pentapetaloide argenteo apicibus auricis palescen.
7. Cruciata Orientalis ramosior foliis ad cauliu nodos radiatim ambientib; Cornopeltes à flore albo lineis auricis striata.
8. Cruciata virginiana Bellidis majoris folio Morif. Hist.

TAB. L XXXVII.



Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 6.

Fig. 1.

Tab. LXXXVII.

1. Eupatoria compositis Verbasci folia. s. Bacharis Americana suaveolens. Exodendron (ic) Sawood. Barbadensibus dicta.

2. Eupatoria conyzoid. odorata folio serrato molli subinviano. Serratula Novebor. annis, folio lanitie serrato molli subinviano P.B.P. fortè Serratula Indica major latifolia mollis Breyn. Prod. 2. Jacea v. Serratula affinis capitulis Bacharidis foliis Trachelij Zeylanica. quord. Prod. 2. Cattu-Shiragam Horl. Malab. P. 2. Tab. 61. pro Conyza Syriaca Raij Hist. Lugd. Bat.

3. Eupatorium Americanum. Malissa foliis pinnatis acuminatis. an Eupatorium Novæ Angliæ Stachidis s. Betonicæ foliis serratis floribus; albis P.B.P. fortè etiam Eupatorium Americanum Nepetæ foliis latioribus floribus albis breviorib; Breyn. Prod. 2.

4. Eupatoria conyzoides maxima, Cathadanis folijs caulem angulosum longa major. alata caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, gravior odoratis. Lapsy. Trium folii. apud Fratres. an virga aurea latissimo folio Canadensis glabra Schol. Botan.

5. Eupatoria conyzoid. integro Jacobæa folio glabro, & auriculis Indica Orientalis, fortè Jacea v. Serratula affinis Breynij. Cat. H. Ac. Lugd. Bat. hanc mirum fl. Hermanni. Malab. Shiragam. Horl. Malab. non sparsit. cum reliqua aurea Plantæ inter se admodum diversæ sint ex Iconibus nostris liquido patebit.

6. Eruditissimo D. Plumbio hujus notitia debetur.

Eupatorium Virginian. Salviæ foliis longis, acuminatis perfoliatum. Hujus folia longa, mucronata, sina opposita, ad basin ità continua invicem, ut acervatis irrorantibus quandam, seu cavitatem pelvi aquæ continendæ similem, efformant.

TAB. LXXXVIII.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 5.

Tab. LXXXVIII.

1. 2. Eupatorium humile Africanum, Senecionis facie foliis Camij. P.B.P. Senecio Africanus Camij folio Acad. Reg. Paris. Senecio Americanus Camij facie, Schol. Botan. sertis Virgæ aureæ humilis Alpina Morif. Prælud. sertis tam Virgæ aureæ folio Veronicæ Mentzelij. Fasic.
2. Eupatorio hirsuto, Hyssopi folio rum. annua Virginiana, an Tlalchinol- Xochitl & Dmerca Medicina 2ª. Hernandez Hist. Mexic. p. 238. & 415.
3. Eupatorio Valerianoidi, floremino, Teucrij foliis, cum pediculis Americana.
4. Eupatorio Valerianoidi, Trifoliæ Virginij folio, abrotani pediculis, Virginiana, Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem sessilibus. Banister. Cat. Mss. an Tlacoxochitl Nov. Hispaniæ Recch. p. 418.
5. Evonymus Canellæ albæ foliis, Maderaspatan. D. Prideaux, Sloane favore, ad quem pendam accepimus.
6. Evonymo affinis Arbor Orientalis nucifera flore roseo. Styracis, Evonymo media affinis, The Sinensium, sive Tsjà Japonensibus flore simplici. Breyn. Prod. 2. Thea, frutex Bontij, hujus flores munere D. Petiver accepi.

TAB. LXXXIX.



Fig. 3.



Fig. 7.



Fig. 9.



Fig. 2.



Fig. 8.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 10.

Fig. 1.

Fig. 4.

1. Cornus Jamaicensis Arbuscula Buxi foliis spinosa flore luteo papilionaceo siliquifera.
2. Filix saxatilis, non ramosa, minima. Raij. Cal. Exter. ubi dubium movet an sit Dryopteris Dalechampij 1B.
3. Filix saxatilis omnium minima elegantissima Cat. Hort. Reg. Paris.
4. Filix Alpina Myrrhidis facie Cambrobritannica, an Filicula fontana Adianti facie latifolia dentata Schol. Botan.
5. Filicula pumila Lonchitidis Maranthæ species Cambrobritannica, an Lonchitis aspera Sinensis Hist. Lugd.
6. Filix parva Cambrobritannica pinnulis latis auriculatis, brevibus undulata, hastas novissime enumeratas Filices ab Inventore D. Lloyd. accepit insignis Botanicus D. Sherard. a cujus liberalitate ipse habui.
7. Filix minor Africana Lonchitidis folia pinnulis auriculatis planis. Filix Africana minor Lonchitidis facie P. B. P. in Hort. Regio Hamptoniens. longè celberrimo.
8. Filix Virginiana pinnulis ab longis angustis, auriculatis, tenuissimè crenatis, longè ab invicem distantibus, non spinosa.
9. Filicis folia 5. Polypodium tenuifolium minus Virginianum.
10. Fagi folijs alterno positis latis Arbuscula Binagovica.

TAB. XC.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 6.

XC.

1. Fœnum græcum Phaseoloides Virginianum flore amplo cæruleo. Secuvidaca trifolia flore patulo cæruleo, radice Glycyrrhizæ sapore Banister Cat. Mſs.
2. Fumaria Tingitana radice fibrosa gramineis floribus ex albo flavescentes, siliquis curtis. an Fumaria semper virens floribus ex Hortis Batavis Cat. H.R.P.
3. Fumaria siliquosa radice grumosa flore bicorne, ala labia conjuncto Virginiana. Fumaria siliquosa grumosa radice flore gemello monstroso. Banister Cat. Mſs. an Fumaria Canadensis radice tuberosa squammata Acad. Reg. Paris.
4. Fungi congener, Bulbulum petræum. 5. Fungus minimus petræus orbiculatus crustulâ compositus. D. Lloyd. Ray Synops.
6. Galega digitatæ folio singulari, floribus parvis herbidis muscosis. Galega unifolia flore herbaceo Cat. Hort. Patav. Georg. à Turre.
7. Gentiana Madritana tenuis folijs Asclepiadis gemellis amara.

TAB. XCI

Tab XCI.

1. Genistella Montis bentosi spinosa I.B. Hist. 1. 2. Genistella Mongediaca spinosa C.B. prodr.
2. Gramen cyperoides ex iquis seminibus bullatis. Raij Observat. 444. ex mente D. Shetardi. quinobis ad exsculpend. dedit.
3. Gram. Cyperoid. Americanum spiciis speciosis plurimis compressis summo caule absq; pediculis donatis. an Gramen maritimum Cyperoid. Curassavicum paniculâ punicante P. B. P. Gram. Cyperoid. minus, paniculâ sparsa spadicea. forte Jacapa Brasiliensibus Piseni.
4. Gram. Cyperoid. American. spiciis majoribus, oblongo rotundis Sparganij in modum echinatis ad summum caulem pediculis longis innitentibus.
5. Gram. dactylon Orientale majus frumentaceum, semine Napi. Cavacan Singalensibus D. Knox. Itinerar. p. ult.
6. Gram. parvum Sanguicum spica gemellâ habitiori. an Gram. Bursa Pastoris. Col. ecphr. 338. hujus spicæ Amaraci capitula squammata. quo dammodo exprimunt.
7. Gram. Cyperoid. foliis Caryophyllatis spicâ granis rarioribus & remotioribus, conflatâ Raij Synops.
8. Gr. Cyperoid. tenuifolium spiciis ad summum caulem sterilibus globulorum armatis. Gr. Cyp. foliis mollibus, tenuibus spicis brevibus, racematis tribus quatuorve in summitate caulis. Raij Hist. forte Gr. Cyp. minimum Ranunculi capitulo rotundo D. Bobart. ejusd. Raij Synops. Sherp. Britan.

TAB. XCII

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Gram. dactylon Siculum multiplici paniculâ, spiris ab eodem exortu geminis. Raij Hist. an Festuca juncea foliaspicâ geminâ C.B.P.

Gram. arenis alterum genus, stricta spica, spiculis magis sparsis. Raij Cat. Exter. gr. in Historia autem omissa est.

Gram. Americanum, spica obtusa, spiculis locustis Segal. Botan. forsitan Gram. aculeatum Curassavicum P.B.P. seminibus à D. Sherard communicatis, in Flora D. Dodart. ex quibus verisimile enatum primò observavimus.

Gram. Alopecuroides Indicum minus spicâ Seriseâ candidâ laxiori.

Gram. Alopecuroid. holosericeum majus spicâ longâ papposâ. an Gram. Alopecuroides Curassavic. spicâ longissimâ Seriseâ candidâ. P.B.P.

Gr. Miliaceum Americanum minus paniculâ parvâ.

Gr. Miliaceum Americanum, maximum paniculâ minore.

Gr. Miliaceum Americanum medium paniculâ magis sparsâ & speciosâ.

Gram. junceum latius, panicâ pisi ovatis Americanum.



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.



Fig. 6.

Fig. 5.



Fig. 4.

Fig. 7.

Xiii.
Hedera tellematis, Atragenes singulari folio splendente Virginiana.
Helleborine Virginiana Dioscoridis folio D. Bannister. hujus Exemplar pulchrè exsiccatum, nec non picturam propriâ manu, ad vivum
appositè delineatam Eruditissimus Inventor paniis quibusdam amicis suis in Angliam transmisit.
Hieracium foliis integris laciniis profundè sectis, flore luteo. Chondrilla lutea I. B. t. 2. Chondrilla Coronopi aut Cyani facie tenuifolia lutea
diversorum Adv. Sonchus lævis in plurimas laciniis divisus C. B. Pin. & Prodr.
Hypericum foliis orbiculato floribus amplis, pallidè luteis, petalis florum in ambitu crenatis. Hypericum Nummularia folio C. B. prod.
Hypericum Ericoides minimum, foliis cinereis ex Hispania, an Hypericum Francorum, non scriptum, tenuifolium Bellus. Ind. Hort. Pisan.
Inveni in Hispania D. Turnefort.
Hypericum Alpinum, magno flore, nigris punctis insigniter. Sch. Bot. forte Ascyron magno flore C. B. Prodr. Hactenus proximè antecedentes novas, aut
saltem minùs cognitas Hypericorum species, munere præstantissimi viri D. Sherard accepimus.
Jacea tenuifolia purpurea capitulo Calcitrapæ minoribus aculeato. Capitulis spinosis. Jacea Adv. Jacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia I. B. t. 3. lib. 25. an Stoebe squammis asperis C. B. P.

TAB. XCIV.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

a

...mum Bocconi. Park. an Jacea pinnatifida maxima, capitulo spinoso Neapolitana Rajj Cat. Exter.
...per graminea Napifolia hirsutis capitulis alata. è seminibus à D. Sherard, unà ab exteris in Anglia nondum aut rarò natis, secum allatis, ab ipso communicatis in ...rtis quibusdam Curiosorum apud Nostrates notatu est, quàm supervenientis succrevit in Hort. Acad. Oxon. sub auspicijs Dni Bobarti. qui hujus ...ginem nitidè exsiccatam nobis amicissimè transmisit.
...fruticans Pinifolia C. B. P. Stoebe capitibus Rosmarini folio Ponae 1. Chamaepitys frutescens Cretica Belli. J. B. 3. Stoebe frutices a angustifolia ...mus ...dica Park. an Chamaepeuce Pr. Alpin. ex Cl. 77. Illustrior is hujus Plantae nobilesprimùm à Ravendisc. D. Wheeler. adæsculpenda impetravi. ...um bulgò American. alterius Evonymo affinis Occidentalis, alabi Rusei folijs minùs fortibus adgeniculas fungosa. Ignaiacum Americanum. alterum fructu ...nymi Breyn. Prod. 1. Guaiacum folijs Centaurii Horto Fageliano. ejusd. Breyn. Prodr. 2. Packhout Belgarum sub Jasminitulo. in Hort. ...Hamptoniens. primùm nobis innotuit. a. fructum oclusum, qualuor obtusis angulis constantem, ostendit.

TAB. XCI.



Fig. 2.

Fig. 3.

a

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

latifolia floribus albicantibus odoratis Americana sub nomine Jasminii Amerii Aurantiæ folio collegimus in Hort. Reg. Hamptoniens.
oria Ranunculoides Africana gnaphalloides Laserpitij lobatis foliis rigidis margine spinosis Ranunculus per elegans D. Francisco Ille.
aculeata Lob. Illustr. tab. 115. Sphondylij 2. Panacis rigido, hirtoq; folio, Planta Africana caustica P. B. P. Nostra etiam folia sunt penitus glabra.
asplenantia, idq; ob totam plantam Laserpitio propius accedit quam Sphondylio, Umbelliferarum. Cap. Bon. Spei. bulbo. in Hort. Reg. Hampton. Observa
rotalis paniculâ spicosâ a Madagascar allata. Humanissimi Viri & Mercatoris Londinensis celeberrimi D. Hildard favore accepimus.
navium procumbens, foliis subrotundis P. B. P. 344.
addali (forte) Malabarica, ex Oris Coromandel. H. M. part 2. Frutex bacifer Indicus spinosus, trifolius, floribus spicatis, fructu plano, rotundo, tricocco. Ray. Hist.
m (forte) peregrinum, folia, solidioris texturæ in laciniis bariedissecto, à D. Edw. Morgan, jam olim exsiccatum accepi.
gantissimus capitulis pectinatis Prom. Bon. Spei. D. Sherard amicè nobis communicavit.

TAB. XCVI.

Fig. 4.

Fig. 7.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 6.



Fig. 2.

Fig. 5.

Caterpitium ex olicum, foliis longissimis, integris, Ammeos quorundam dictum. a D. Sherard habui.
Ligusticum humilius, Scoticum, a Maritimis: 5. Apium maritimum dulce, Scoticum. Apium Scoticum, vel Apium marinum quibusd. Newtono. Ray Hist. Imperatoria affinis, umbellifera maritima, Scotica, Sibbald. Prodr. & Cat. Hort. Edinburg. an Ligusticum quorund. foliis Angelicæ I. B. 1. 3. quod in Alpib. Liguriæ nasc. Imperatoria bocconi, utriusque Descript. notat Cæsalpinus. an Libanotis Apii folio semine aspero C. B. P. Rosmarinus foliis Selino similibus, quæ Libanotis legitima Theophr. Bolli. epist. 2. ad Clus. ὀροσελινον quod Bulgæ quidam induxerunt, dicatur, vix fallor (inquit Bellus) Siler Cretic. a quibusd. perperam vocatur. Siler marit. Scoticum. Imperatoriæ facie Breyn. Prodr. 2.
Cinaria lutea, flore minimo C. B. P.
Cinar. triphylla major, floribus parvis pallescentibus, ricti aurei, calcari subcæruleo, donatis. an Cinaria latifolia, triphylla major. C. B. P.
Cinaria Cretica, latifolia Clus. Hist.
Apio affinis, Corylifolio Acad. Reg. Paris. Anthyllis Ulmifolia quorundam.
Apium Italicum Bbd. a Stap. in Theophr. Lycium Buxifolium C. B. P. Lycium Buxifoliis rotundioribus, Syriacum, vel Persicum Breyn. Prod. 2.
Olivum Persarum, Rhamni species Adolph. Vorstio. Cat. Hort. Acad. Lugd.
Buxifolia fructu parvo, typhoide non papposo, gemello, siliquas æmulante, Arbuscula Madraspatana.

TAB. XCVII.



...vii.
...ycium minus cordatis Buxi foliis Maderaspatanum. forte Lycium Hispanic. foliis Buxi C. B. P. Tamaie. Lycium horum Fragos, an Lycium Buxi foliis angustioribus Syriacum. Breyn. Prodr. 2. Lycium Dioscoridis. Kadhad Arabibus, & Laroa Insulis Montis Libani. Rawolfij. Itinerar.
...cium Maderaspatanum, Indicis Alpino putati, æmulum, bijugis, & grandioribus aculeis horridum.
...cium Binagaricum, acuminatis, minus durioribus foliis, aculeis ex opposito binis. Tsjerou-Karæ Horl. Malab. simile, si non idem.
...cium guabuth Indiæ Orient. Capparis, rotundioribus foliis, aculeis ex adverso geminis.
...um Bdexylon binis aculeis in ramulorum fastigiis, Americanum. ex hujus ligno sagittas, e fructibus Atramentum conficiunt Indigenæ.
Darlwood, Sirke-berry à Nostratibus ingenue paturiâ D. Shyrard. specimen adæsculpendum datum est.
...cium majus Americanum Jasmini flore, foliis subrotundis luzidis. Jasminum spinosum Americanum foliis lucido subrotundo P. B. P.
...cium Mayk foliis subrotundis Americanum ladeens, limbis foliorum argenteis.
...cium (forte) non spinosum ramealis virentis foliis P. B. P. rectius autem, Cerasus Sebastenæ domesticæ folijs aliquatenus accedens Prosp. Bon. Spec.
Capsi Carsiboorn bulgò Bdegarum.
...midis, aut potius Alpinæ cognata dispermos; s. Chamæjasmes tetrapetaloides ino dora, quadrato caule Virginiana.

TAB. XCVIII.



Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 1.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8
Fig. 9.

Urticæ umbelliferæ Blattariæ accedens Virginiana major, repens. Pseudo-melanthii folijs pilosis, flore albo pentapetaloide, fistuloso.
Urticæ Blattariæ accedens Virginiana minor, repens, hirsutis Camphoratæ foliis, floribus fistulosis, in umbellam positis.
Urticæ Blattariæ accedens Virginiana Camphoratæ congeneris glabris foliis, flore ad summitates, ramulorum singulari.
Aestimachiæ purpureæ affinis Americana procumbens Anonidis bacas fructumque folio singulari glabro, Arabicæ affinis, rubicundis Americanæ folijs Agrestis
1. Veronicæ proboscidis facie. Prodr. 2. hanc plantam Capparibus apud Belgas laureolæ adjectas pro pabulo caprarum indè capparis fugatas affirmant.
vulgo P.B.P. quam D. Wheler, speciosiorem in Græcia observavit, ubi luxuriabat & Turcis meritò odiosa. Rarum habet nives esculentum capitis:
cloidem, caprulam, cylindricâ, figurâ hippocastani, quibus carnosioribus parvis turgidam.
aestimachiæ purpureæ affinis. fructu priori, sed duplo minori, singulari hirsuto foliis Maderensis.
folijs, ligneis Zeylanicis aculeata. Urentia. Malus Zeylanica spinosa P.B.P. an Rabu nigra quam H.M. vide in Hort. Reg. Hamptonc. collegium.
Asinus polytrichoides pellucidus foetidus, foliis denticulatis, ad margines deductis crispis ten. Ray. Synops. Surp. Britan. append. de Polytrichum
aureum medium, quod Ray. Histor.
Asinus denticulatus minor C.B.P. Park. Muscus terrestris Auritanicus I.B. t. 3.

TAB. XCIX.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

rubium aquatic. fol. integris longis per angustis Moderspatanum. an Marrubium palustre Canadense tenuius glabrum Sch. Bot.
mpyrum cristatum I. B. t. 3. an Melampyr. luteum angustifol. C. B. P. Park. quæritur ipse Cl. Raius.
mpyro affinis tetraphylla Cangetica, floribus inter folia sparsis, an Add. Odoam H. M. part. 9. hujus semen mellei coloris lucidum, singulare, nudum, gram
auricularis tricoccos hermophroditica. s. ad foliorum junctur as ex foliolis cristatis juliferâ simul & fructum ferens Banist. Cat. Stirp. Virg. a
Mercurial. Lugl. tricocco. cum octabulis Cat. H. Ac. Lugd. append. plurimum differt, ut ex utriusq; pictura cuivis patet.
ilus Virginianus spinis longioribus rectis foliis quo dammodo auriculatis.
fol. palustre galericulatum minus. Reverend. Vir & amicus noster singularis D. Dodsworth. in agro Eboracensi sponte natum, invenit, &
jampridem nobis benigne communicavit.

B. C.



Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4

Fig. 3.

Fig. 5.

…pilus Virginiano s. rosularia foliis.
…us rupestris, repens Virginianus, clavis foliosis, erectis quadralis Banister. Cat. Mss.
…cus filicinus elegans, Brownrigis Prom. Bon. Sp. Pulturjoory Kottentottorum à D. Sherard. accepimus.
…rrhis annua semine rostrato, Striato, Aspero, Inodora Morison. Umb. Myrrhis sylvestr. Cretic. nodosa seminibus asperis. Ray. Hist.
Sesili cretense, nodorum Park. Charophyllon alterum geniculis tumentibus. Cat. H. R. P.
…rrhis perennis lutea Daucoides Morir. Umb. & Prodrom.
…rhus Brabantica affinis Americana foliorum laciniis Asplenij modo divisis, juliferas simul & fructum ferens. forte Canambaya
Brasiliensib. Margrav. forte etiam Lardiaca Mulleriana Indica Bod. à Stap. in Theophr. 320. hujus semina singularia
capsulis bivalvibus, extra globum echinatum emergentibus sustinentur.
dem, cum ramulo coniss. mucamentis, onusto.

TAB. CI.



1. Sisymbrium aquaticum, sive Eruca nascens floridum, nostrum Rajj Synops. App. ...at minus incautis floridum pronunciavimus; capitula quidem hujus, pedicellis innixa, brevium ramulorum apices, quarum jam delapsis, flosculos tam pulchre aemulantur, ut primo intuitu nobis imposuerint, quo demum agnosco, nihil aliud esse quam Nasturtium palustre tetrachinis simile Rajj Histor. Pl.
2. Nardus Amariana provincialis foliis carnosis, huic proxime accedit Tragi Hist. Stirpium Nov. Germ. Ant. Recch. p. 412.
3. Nasturtium petraeum Carniolicum Cornubiense Iohnsoni Merc. Bot. part. alt. Passim in arvis rupibus Arvoniae. Nov. Invenit. g. Moelvr rhudhjeria. Plantarum g. Cloguen, duq; Cloguen, Carnuth prope Llandberys invenit Plantarum Britannicarum sagacissimus investigator D. Lloyd.
4. Nasturt. Bursae pastoris foliis Dioscoridis arum floreal bo siliqua compressa in Hort. Ups. Upsaliae D. Doody primo Observavimus.
5. Nasturt. African. floribus albis spicatis, foliis ternis Christophoriana facie P. B. P. in Hort. Reg. Hamptonicis. collegimus.
6. Mil. s. Anil spinosa Cynanchicae foliis Betae agericum. in Mauritii Hort. Malab. P. 9. quam Cynanchum historiae specimen fecit Commelinus in Not. super. loc.
7. Ninsin, s. Ginseng, e Ginseng Radix gemina Indiae Orientalis, apud Mission. Curios. Ephem. Germanicarum. 2. Ann. 5. p. 73. sub hujus titulo plurimae fuerunt videre, inter quas Ginseng Clavis Japonicus Terrae alumnae huic nostrae quam maxime accedit. Quum Ninsin in Bontij ab hac planta plurimum differt hujus radicem munere Amicissimi Viri D. Godley accepimus, frondium effigiem operae favore Cl. Viri D. Edwardi Robinson.

...brychis Madraspatana di bulbi ceiiculis asperis. huius vitia humanis. aquè ac Clariss. Viri D^ris Fredricii Slare sapori debemus.
...bilis, s. Hedysarum Lupinum Alpin. per omnia quasi labra. Ad alto Sch. Bib. Ondbrych. Cippata levis C. B. P. vir. Prod. ad. Sherard. habuimus.
...mogeito affinis Virginiana flore purpureo pentapetaloide Bonist. Cat. Mss.
...is purpurea Virginiana radice Cæpi more circulatâ, capitulis postquam defloruit bulbillis, ut in Allio corvino conflatis. Trifolium arvense hirsutissimum, radi...
...arva rotunda Cæpi more imbricatâ Bonist. Cat. Mss. a. capitulum bulbillis suis gnustum in digitat.
...ularis s. Cruciata gallo affinis Virginiana foliis multifido folio, spicatus capitatis coccineo floribus pallidis in spicam congestis. Euphrasia Virginiana
...cornis coccineis flore albido theca foliacea inclusa Bonist. Cat. Mss.
...asceoli, tuberes, Cap. Bon. Spei sub Balaustes Capensis trifoliatæ titulo asservimus.
...omogeito similis Graminifolia ramosa, v. adgenicula polycerata. Potomogeito affinis Graminifolia aquatica Raij. Histor. Plantar.

TAB. CIII.



Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 2.

Fig. 6.

Tab. CIII.

1. Palma Hayri Park. Theatr. Palma facie Hairi I.B.1.2. Palma American. spinosa C.B.P. Palma Brasiliana vi. 1. Ayri Pison. p. 129. Palmisti genus Rochefortij p. 60. forte Macoro Arbor Barbadensium Ligonis, hujus Arboris lignum marmori nigro simile, ferri modo in aqua fundum petit, ex insulâ Dominici asseritur quidam autumant. plurimas hasce ex Insulâ Jamaicensi allatas in Horto Comploniano aliquando conspeximus.

2. Palma Americana, foliis Polygonati brevioribus, lævitèr serratis, & nonnihil spinosis, trunco crasso Breyn. Prodr. Palma Americana non spinosa, cvasiis rigidiis, foliis caudicis scabro in capitis protuberante P.B.P. in Horto Reg. Hampton. bidimi, vix collegimus.

3. Periclymenum Virginianum arborescens accedens Arbuscula Virginiana siliquosa.

4. Pimpinella, Sanguisorba sylvestris minima, radice magna. hujus folia Pimpinellæ foliolis haud majora, à Cl. D.re Tournefortio in Hispan. collecta fuit, vâ D. Sherard amicissimi nobis communicata est.

5. Plantago Coronopus dicta maritima brevi, lato, & dentato folio pilosa. Coronopus Massiliensis hirsutior latifolius Sch. Bot. Coronopus foliis acutis in margine dentatis Raij Hist. Pl. Plantagini affinis Pinella, Siciliæ herbula I.B.1.3. Coronopus maritimus Arcbytæ Insulæ fol. angust. 258. non quidem est Coronopus maritima nostras, nec à multum similis ut Rerum Naturalium Viri peritissimi, & Botanices Scientia summus Arbiter & Præsidium singulare, D. Joh. Rajus rectè pronunciat. Cæs. Exper. quamvis Cæsp. Basilius eandem faciat. Plantago Apula bulbosa Park. Plantago Apula laciniato bulbosa Fab. Column. Plantago pilosa bulbosa C.B.P. huic nostræ persimilis esse videtur.

6. Polygonum Germanicum caule, foliosa, floribus in summitate. in Polygonum angustifs. quasto vel graminea folio mutatum Sch. Bot. sive Polygono angustissimo folio affinis C.B.P. Hæmorrhoidalis quæ ad Caryophyllorum sylvestrium classem referri debere Clusius putavit. Hist. app. altera. ad lib. 5. fortasse est Polygonum Polonicum coccifera I.B.1.3.



Tab. CIV.

1. Passiflora Vesicaria hederacea foliis lanuginosis odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. Hedera Mururuicæ species Vesicaria lanuginosa, odoris gravis Marcgr. 73. Flos Passionis Curassavicus, Hederæ hirsuto folio, flore purpureo variegato P.B.P.
2. Periclymenum herbaceum rectum Virginianum. D.r Linkarsweed. ibi vulgò vocatum hujus generis esse videtur illa Periclymeni species scandens & corticibus Arborum radices emittens, Itti-Canni Hort. Malab. dicta. part. 7.
3. Phaseolo affinis Arbor Indica Coral dicta polyphyllos, non spinosa, foliis mollibus subhirsutis.
4. Piperi longo similis Pistolochiæ foliis absq; pediculis Madera spatana. Jaborandi 4.a Pisonis huic multum convenire videtur Hist Brasil. p. 216.

CV.

Phaseolus unifolius Occidentalis Asari bmeis folio dispermos Orobus Americanus Asari folio singulari P.B.P. in Hort. Regio Hampton. nutritum observavimus.

Phaseolus unifolius Orientalis summo folio sinuato monospermos, an Phaseolus mihimus perennis Americanus flore luteo Meliloti, folijs Asari

sanguinarijs solitarijs Breyn. Prodr. 2.

Phyllitis Jacq. Saxatilis Virginiana per summitates foliorum radicosa Banist. Cat. Slirp. Virg. Herba dorsi, hujus folium Phyllitidis ramosa

vel alterum propagandi modum vivipara peculiarem, ruppe adhærens Naturæ.

Portulaca Lusitanica sanguinosa Asclepiadis folio Iradior, velatior fortibusque P.B.P. Portulaca Americ. rectalenuginosa foliis Phyllij, floribus in caulium summo

rubro obsoletis majoribus Breyn. Prodr. 2.

Portulaca lenuginosa procumbens Vermiculatis foliis Americana. Portulaca Americana procumbens Sedi terebinthi folijs, v faciesloribus in ramorum

summo pallide purpurascentibus Br. Prodr. 2. Baldrdgo seu Lusitanis s. Caagenge Brasilianes. Pisonis 244.

Portulacæ affinis Americana, tricapsularis recta flore albo sedi folijs angulosis. Portulac. Americ. 9. Caryophyllatæ. latifol. erect. floribus albis P.B.P.

et hujus reperta trigarbita diversa genera per maturitatem singulis Lilijsiens. hactenus novissime enumeratas plantas in Horto Regio

Hampton. oculis nativissimum Voluptatis hustravimus atq; collegimus.

TAB. CVI.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 7.

Fig. 3.

Fig. 5.



Fig. 6.

Fig. 4.

a Ranunculus Scorpioides 5. Heliotropium Palmitos spinosum. Polygonati anguſtifoliis Mader acpal. huc forte pertinet Asiatica Brasilianibus Marcgr. lib. 2. p. 64.
b Caule summitate floribus ornato, quando decrescunt ramuli, Scorpioidem caudas pulchre repraesentat, illum Heliotropio. favore Cla. D. Frederici Slare habuimus.
c Ranunculus Nemorosus Anglicus foliis Virginianus Banister. Cat. MSc.
d Ranunculus Nemorosus Anglicus foliis, Virginianus Asphodeli radice. Ranunculus Thalictri foliis grumosâ radice Banister. Cat. Stirp. Virg. nuper edit.
e Ranunculo affinis Umbelliferis accedens, Chelidonij minoris folio Leylanica minor. Ficaria minor Leylanica P. B. P.
f Ranunculo affinis Umbelliferis accedens Chelidonij minoris folio, tuberosa radice major Asarina major tuberosa radice P. B. P.
g Ranunculus Alpinus minimus foliis tenuioribus altius serratis, caulibus purpurascentibus. an Pentaphyll. fragariae minus flore luteo Clus. Hist. Cui forsan aliis dilucidè attributa nostra aequidem nobis hirsuta apparent. Illustrem amicissimus Vir apud Londinenses Pharmacopaeus peritissimus D. Philippus Schricker sauchen nobis comesait.

Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 4.

Cxu.

1. Pyrolæ affinis Virginiana repens frutiosa foliis rigidis Scabritie asperatis, flore pentapetaloide fistuloso. Pyrola repens foliis scabris, flore pentapetaloide fistuloso. Banister.
2. Reseda Linariæ folio Pyrenaica glauco folio Sch. Bot. an Reseda Linariæ folio C. B. P. item Reseda alba minor ejusd. C. B. P.
3. Rhamnus Maderaspatanus foliorum pallentib; foliis, spinis brevibus duplicatis.
4. Rhoi similis Tragodes. lepthiphyllos. Americana spinosa, rachi medio appendicibus aucto. an Coriaria Arbor spinosa Acaciæ foliis & facie P. B. P. inter Addend. fortè Quauhtesopalli Pitzahuac. Copallifera leptiphylla alia Hernand. p. 49. Fingrego. & Sabina arbor (ig) Savin Tree Barbadensib; nostratibus dicta.
5. Ricinus parvus rens. foliis Quercinis Virginianus Banist. Cat. Stirp. Virg. an Quercinis foliis Arbuscula spinosa lactescens Portoricensis P. B. P.
6. Ricini fructu parvo, frutiosa, Curaçavitta, folio Phylli. P. B. P.

TAB. CVIII.



Fig. 3.
Fig. 7.
Fig. 1.
Fig. 6.
Fig. 5.
Fig. 4.
Fig. 2.

...rtus.
...hamnus Maderaspatanus Hyperici frutex omnibus ...phia spinis brevibus duplicatis.
...hamnus angustifolius Fructu ...ragon / ...emicum quibus dictum fortè Rhamnus ...arus Wallis. H.M. spinarum autem positio huic parum congruit.
...ninus Maderaspatana alterna quinquefidis duris grib. foliis in margine spinosis humanilatex fauore Dni Fred. Slare Obtinuimus.
...ubus foliis Alquanto dissectis D. Ragon. in Hort. Reg. Paris. sollegit D. Sherard à nobis communicatus.
...anicula Alpina angustifolia. folio, flore carneo. Sedum Alpin. alterum Francisc. Gregory. Regiensis. Cappuriui. Fab. Columna. ecphr. p. 2. Sedum
Alpinum angustissimo folio, flore carneo C.B.P.
Sanicula Alpina angustissimis brevioribus, foliis per interualla consertis. Sedum Alpin. primum Column. ecphr. p. 2. Sedum Alp. exiguis foliis
C.B.P. an Sedum Alpinum minimum carneo flore, Sch. Bot.
Scabiosæ capitulo, Chrysanthemi Myconi foliis, alato caule Maderaspatensis.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 3.

Scabiosa Cornigeroid. Americana capitulis, floribus albidis parvis P. B. P.

Scheth album, s. Jasminum Indicum Laurifol. inodorum, umbellatum floribus albicantibus P. B. P. Born. Scheth. Hort. Malab. P. 2.

Serratula Novi Boracensis maxima foliis Dorsi leviter serratis P. B. P. inter Addend. Serratula Virginian. min. angustif. mollis Breyn. Prod. 2. fort. Alt. cujus Cortic. Yn Roderiq. Nov. Hisp. Rarib. 355. huic congener est Malli-yel Nov. Hisp. ejusd. pag. 423.

Sesamum alterum foliis trifidis Orientale, semine obscuro, in Cor-Ele. Hort. Mal. P. 9. Bidajam Hiton. s. Bidajam nigrum Malaccensibus Sesamum Indicum, folio amplo serrato, flore majore, semine nigricante Comelin. Annot. in Hort. Malab.



Tab. 8.

1. Scutellaria Teucrij facie purpurea minor, flore amplissimo. Teucrium Astragaloides Cassida minor Cat. H. R. P. 173.
2. Scutellaria major, Nepetæ foliis Virginiana. an Scutellaria aquatic. major Americ. Cat. H. Ac. Lugd. forte Tochomochitl. Nov. Hisp. Ant. Recch. 431.
3. Smilax Viticulis aspera foliis longis, angustis, mucronatis lævib; auriculis ad basim rotundioribus.
4. Smilax Viticulis asperis Virginiana, foliis angustis, lævibus nullis auriculis prædita huius radix geniculata crassa & intorta, inde suspicamur China næ Mexicanæ speciem esse, & forte Olacatzan Hernand. p. 312. & Joapecanga altera Pison. forte etiam Radix Chinæ Acost. Hist. Lugd. app. 10.
5. Smilax Virginiana spinis inno cuis armata latis Canellæ foliis; radice arundinacea crassa & carnosa forte China spuriano dosa C. B. P. Pinidochina radix ex Virginia Clus. Exot. China Michoacanensibus Phaco phila Hernand. 213. Pocayo Nov. Hisp. Ant. Recch. 398. Ipapecanga a Brasiliensib; Pison. 258. an Kari-Vilandi H: M. P. 7. Pockhout Belgis Orientalib; ubi ibidem habetur. apud nostrates Virginiam habitantes, ex hujus Stipitib; parantur Scipiones, ut nobis affirmarit Amplissimus & Senatoria Dignitate perhonorandus Vir D. Byrd. Utraq; hæc simul & proxime præcedens Ipecacuangarum species, fructum acinosum & racematim dependentem in summis caulibus copiose profert.
6. Smilax aspera Bermudensis granchorib; foliis cordiformibus, radice surculosa. forte Quauhmecapatli. s. Zarzæ species cujus radicem in Hispania tam transferri solebat ut a Francisco Ximene narrat Maregravius. p. 12. Quauhmecapatli altera, Zarza 4ª. Hernand. 290. forte etiam Smilax aspera Zacynthi Alpino I. B. l. 2.

TAB. CXI.



Tab. CXI.

1. Smilax folijs latis in margine spinosis Carolinienſis Stipite lemi quadrato, hanc Generoſiſſimus Dominus Courtenenobis benigniſſime donavit.
2. Smilax bifolia aſperis Dod. quinta folio hedera acuto lem. Zarza nobiliſſima nobis. Mexicanis Zarza-parilla Fr. Hernand. 288. in Hort. inſtructiſſimo D. Forterinus mimus.
3. Smilax Carolinienſis, Stipite quadrato lenis folijs angustis, asperis, aurinulis ad basim angulosis: ab illustri viro D. Gulielmo Courtenè accepimus.
4. Solanum Americanum, fruticosum, strychnodendro affine, fructum modo (non dum maturitatem) quasi ostendo. an Solan. frutesc. Brasilian. folio Capsico, bacis rubris P. B. P.
5. Solan. Curassavicum vesicarium Solano Antiquorum simile folijs Origani subincanis P. B. P. forte Solan. vesicarium Surinamense lanuginosum polyacanthum. Prod. 2.
6. Solanum triphyllum flore tripetalo, abro-purpureo, infoliorum sinu, abscediculo Sessile. Banist. Catal. Sisyp. Virginianum, folijs auctum, florem nobis dedit, sex foliolis, sive petalis constat, quorum tria subjecta tota viridia sunt, ubravia, tria vero superiora, longiora, albo-purpurascunt quemadmodum in Solano triphyllo Canadensi Cornuto. Cui haec est quam proxime cognata.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

mnio Americ. altissim. Blattariæ del Hier. folio Sch. Bolan. Senecio Americ. maxim. Dipsaci s. Virgæ Pastoris folio P. B. P. an Senecio Cichorii folio Virginianus flore sulphureo odore Pastinacæ Cat. Mss. H. Oxon.

Bolan. Barbadensis decimus tertius minus interius Cucubali folijs mollib. v. incanis. forte Heliotropium Curassavicum Scammonij folijs mollib. subtus subtis.

P. B. P. Heliotropium Americanum majus folijs Populi nigræ glaucum nostras. flore albo minimo. Breyn. Prodr. 2.

Spongia flaviatilis anfractuosa per fragilis ramosa sinuosa nostras. in loc. fluvio prope Oxonium inventa D. Sherard v. nobis munere donavit.

Spongia marina fistulosa maxima muricata. an Spongia ramosa fistulosa. C. B. P. dedit nobis D. Doody.

Syringa Volubilis Virginiana Myrti majoris folio, alabastro semine, flore, odorata, lutea. Gelsemium s. Jasminum luteum odoratum Raij Hist. Glem in s. Jasmin.

Vetonica scandens v. semper virens Park. Theatr. Pseudo-Apocynum Myrti-folium Virginian. Banist. Cat. Stirp. Virg.

Tithymalus Curassavic. Salicis v. Atriplicis folijs variis, caulib. viridantib. P. B. P. Tithymalus Indicus Salicis v. Atriplicis folijs Breyn. Prodr. 2.

TAB. CXIII.



Tab. CXIII.

1. Tithymal: exotic; Carobefolijs aliquatenus accedens. an Tithymalus Siculus polyaccios Portulacæfolio Bocc. 39. Tithym. baccifer Hyacinth. Ambr. 122. Phytolog. 532.
2. Tithym. Indic: annuus elatus. floribus albis, caulibus viridantibus P. B. P.
3. Thymelæa Africana Linariæfolio, florib; albis in extremo caulium odoratissimis. Thymel. Linifoliæ similis African. florib; pallidis odoratissimis P. B. P.
4. Trifolium stellatum glabrum Ger. emac. Trifol. capitulis Dipsaci quorundam. Ray. Synops.
5. Trifol. supinum cum glomerulis ad caulium nodos ex hiulatis floribus purpurantibus. Ray. Histor. an Trifol. parvum rectum flore glomerato cum unguiculis IBI. 2. meritò autem quæratur (inquit erudit. noster Raius) cur rectum dicat, cum in Descriptione caulem supinum ei attribuat.
6. Trifolium cochleatum mediolis spinosis Ray. Synops. Sherp. Britan.
7. Valerianella Curassavica semine aspero bisoso P. B. P. in Hort. Reg. Hamptoniens. legimus.
8. Trifolium siliquosum Leto affine Maderaspatan. siliquis longis, ex adverso binis propendentibus.

APPENDIX

ad Rariorum Plantarum Icones

LEONARDI PLUKENETij.

☞ Propter Literarij Sculptoris incuriam, aut saltem nostram in hoc opere properantiam contigit, Iconem Tab. 82. Fig. 5. adscriptam, absq; titulo exhiberi; hujus ergò Synonyma hic subnectere lubet, ut suo loco reponantur. Viz.

5. Cerasa Hottentottorum; Lycium Africanum fructu Cerasi rubro. Parad. Batav. Prodr. 349. Rhamnus Africana Cerasi fructu ejusd. P. B. P. 369

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 1.



Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 2.

1. Verbasco congener? Madr. aspalàn, murrenatis foliis, ovatis à parte lanuginosis, flore parvo purpureo.
2. Veronica adfinis Indica tenuifolia flosculis 2. alinulo barbatis, summo caulium fert umbellatis. a. vb. capsulam seminalem per Microscopium visam exhibet. & Madr. aspalàn ad Ornatissimum Virum D. Hill. ard allata est, qui nobis humanissimè communicavit.
3. Veronica 2. alibi passim a caulibus nudis Ray. Obs. pag. 442. muros D. Sherard accepimus.
4. Viburnum Americanum non spinosum Mobilis foliis floribus coccineis P. B. P. Camar. a flore rubro Märegr. p. 4. fert etiam Camar. a flore elatio ex ripa Fluvij S^ti Francisci, ejusd. in Camar. dub. a Pisone. Bacis quibusdam, v. calidum Hernan. 2. 115. nostrinum flores primum lutei, deinde ruborei, tandem nondum maturi, v. ultimo tanquam coccinei quinti floris, vin Hort. Reg. Hamptoniens. cum floribus & fructu conspeximus.
5. Viburn. Americ. odoratum folio parvo orbiculato, flore albo, baccis foliolis interceptis. P. B. P. 384.
6. Pisa Cathuroides 5. Cathartica Dioscoridis, vexillo rubro, labiolis pallidè virentibus ambientibus cæruleis Morif. Hist. 2. Cathartica 5. Cisti rubula Mostenensis Ray. Hist.
7. Viola Virginiana tricolor foliis multifidis caulículo aphyllo. Banist. Cat. Virgin. an Viola Alpina folio in plures partes dissecta C. B. P. Viola montana laciniato folio Clus. Hist. Viola montana folio multifido I. B. Hist.
8. Virga aurea flore albo spicato Breyn. Prod. 2. Virgâ aureâ Noveboracensis floribus albis, folio Bellidis ramosæ Canadensis Cornuti P. B. P.

TAB. CXV.

Ilmi folia Americana serrata flor. 5 pentapetalis albis in spicam dispositis.
eiusdem Spica florum, cum in majorem perfectionem devenerit.
Apocynum Virginianum Asclepiadis folio, erectum, floribus palladi coeruleis, radice crassâ fortè Moyothiyacatli Nov. Hispan. Ant. Raeh. 388.
Virginianum & Insulis Caribaicum cucorij inermis, & sericeis foliis argenteis crassis.
Chamaesyringus Virginianus, Pyracanthae foliis semper virens, capsulâ verrucarium instar asperatâ rubente.
Arbusculus Americanus cordatis foliis pentapetaloides, radice lignosâ.
Huic hanc congeneri Anapodophyllon dicta cuedens polyphylla. s. Dracontij similis herba Americana pusilla.

TAB. CXVI.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Hieracium magnum Virginianum Park. Dens Leonis latifolius caulescens C. B. P. vulgo in Prodr. Hieracium Pyrenaicum, Blattariæ folia minus hirsutum, Sch. Bol ubi pro nondum descripto ponitur

Coto affinis hirsuta flore subrubente C. B. P. Anthyllis leguminosa major purpurascente flore Clus. Hist. Coto affinis hirsuta herba flores suaves rubentes. Morif. Hist. 2.

Cathonica Malabarorum; Nieregahala Zeylanicorum Mus. Zeyl. Cat. H. Ac. Lugd. apud Mendoni Hort. Malab. Cidarum Zeylanicum, Superburn bulgò.

Thymus capitatus e Gibraltare à Solis minimis confertis, cum Thymis capitulis minoribus Massiliensibus Cat. H. R. P. à D. Wheeler habuimus.

Thymum majus longifolium Stœchadis foliaceo capite purpureo, apud nos Thymum capillaceis foliis hirsutis magno capite purpurascente D. Tournefortii, idem quod apud Colletianos Rorismarum quas Cl. Tournefortius ad D. Sherardi Lusitanicas animadversiones sub hoc titulo aliquando Conspexerimus.

Virga aurea Americana Tarragonensis, foliis serpere, paniculâ speciosâ storidâ, forte Tlalchichino a Plateolo Mexicensibus, s. Herba stella 3.ª Hernandi, in Oloxichuitl ejusd. Hernandi Hist. Mexic. de hujus stirpis genere & determinandi non audeo.

Fungus Virginianus ex Sterco Equino capillaceus, canus, capitulo viridi nigro punctulo in summitate notato Banister. Cat. Stirp. Virg. MSS.

TAB. CXVII.



1. Cupressus.
2. Taxoides s. Mesembrianthemum Africanum frutescens, floribus albis parvis umbellatis. an Mesembrianthemum Afric. frutescens minus triangularibus foliis viridibus, cornuum taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato glauco, pentagono, ligneo cinto Breyn. Prodr. 21.
2. Rosa solis Cunabinas maximus flore Asphodeli minoris D. Morison. Chamaelonti de Cridelij in Epist. Bachiat. ad Viridar. Lugd. munere D. Courtenii accepimus.
3. Serpentaria repens florib. Stamineis spicatis, Bryoniæ nigræ folio amplioribus pinguis, Virginiensis. huc etiam pertinet Metaxo chil; Mecicensib, Hernand 144.
4. Liriodendron, spica flosculorum, cum aliquibus ex plicationem assurgant.
5. Tulipifera Virginiana tripartito hedrisfolio, medio laciniâ obtusâ abscissâ Raij. Hist. Tulipifera arbor Virginiana Cat. H. Ac. Lugd. Populus, aut potius Alnus Tulipifera conis erectis. Bauhin. Cat. Morison. Virginiana.
6. Visum arboreum flore albo spicato Americanum foliis formâ silicuarum Nerij. Nerij siliquæ effigie. Kaye Bakel B. Hist. Fructus Nerij siliquæ figurâ C.B. Pro errorem.

TAB. CXVIII.



Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 6.

Tab. CXVIII.

1. Alsine, Sperulæ facie Maderaspatana. foliis lateribus seminis minutissimo nigro. an Trompilli Huizpatli Nov. Hisp. Recchij.
2. Amaranthus spicâ longâ candidissimâ. Spicæ foliis Maderaspatana.
3. Antirrhino affinis, pusilla planta foliis scabris Maderaspatana.
4. Cardiaca s. Lamium Hyssopi hirsutis foliis Maderasp. floribus dilutè rubris, unico tantùm barbillo in carnulorum Cymis.
5. Chrysanthemum Maderaspatanum, Menthæ arvens. folio & facie flore, bigemellis ad foliorum alas, pediculis curtis.
6. Tithymalus botryoides, serratis foliis, Indicæ Orientalis.

TAB. CXIX.

Tab. CXIX.

1. Gramen iuncifolium, brevi folium, crispum spicâ purpureo-sericeâ Madraspatanum.
2. Gram. dactylon Madraspatense, cum pluribus spicarum paribus ad summum caulis, velut in bracteillas positis. foliis magnâ suî parte, culmum cin vagina complectuntur, reliquam surriguntur brevior em, rigidam, margin ibus crispatam.
3. Gram. Aparoid. Madraspatanum Tuneli. Genera capitulis sparsis.
4. Cynanchi genus Saturejæ folio Madraspatanus. capsulis in summitate fere umbellatis.
5. Melampyro cognata Madraspatana spinis horrida, an Colotta-Vettla, Hort. Malab. P. 9. Eryngium Zeylanicum. febrifugum floribus latis Herbar. Vivi. Herm. Cingalensibus Kathu Karobili sortiebam his pertinet Bahel-Schulli Hort. Malab. p. 2. Genistæ spinosæ species satis, Commel. in Notis.
6. Phaseolus arboreus siliquis intanus, monospermos, siliquis, lenti-formibus, Madraspatanus.
7. Sinapi strum Indicum diphyllon, siliquis ad alas exuno pediculo binis. Cupa-Veela sorti Hort. Malab. P. 9.

TAB. CXX.

Fig. 5.

Fig. 8.

Fig. 1.

Fig. 7.

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 2

Mimosa pumila Madraspatana pinnis tenuissimis, ad foliorum ecaudatus innocuis spinulis obarmata.
Polygonum Solinoides Maderaspatanum. Thymi capitati foliis insanum.
Portulacæ affinis Polygonoides, Blitifolio vfacie Maderaspatensis.
Acharnus scordalis foliis subtus cæsis Maderaspatan.
Acharnus Althææ folio mollissimo incano Maderaspatens.
Acharnus urens Cannabinis foliis triphyllos & Maderaspatan. an Urtica Indica pentaphyllaea Clusii Mich. Nutt. catal.
Trifolium Maderaspaten. caulibus pilosis stantibus, Passiflorae modo trilobatum. an Com. s. Coimbi. Mexicensib; Hernand. 252. Apios American atriphyllos siliquis Orobi.
Cicer arietinum Maderaspatense, Cirri facie, rotundioribus imis foliis.

LEONARDI PLUKENETII
PHYTOGRAPHIA;

Seu

Plantæ quamplurimæ novæ, & literis hucusq; Incognitæ, ex varijs, & remotissimis Provincijs, ipsisq; Indijs allatæ: Nomine & Iconibus,

TABULIS ÆNEIS,

magno cum Industria, et insigni sanè in Successores beneficio, Illustratæ.

PARS TERTIA.

VICES DEDIT AEMULA VIRTUS.

I Collins fec:

Nihil vacat, nihil inane. Terra germinat, quod tibi putas inutile, alijs, immò tibi ipsi frequenter, alio usu est utile. D Ambros.

LONDINI MDCXCII.

SUMPTIBUS AUTHORIS.

Invictissimo, Potentissimoq.

GULIELMO iij.°

DEI GRATIA

MAGNÆ BRITANNIÆ &c. &c. &c.

MONARCHÆ semper AUGUSTO.

Leonardus Plukenetius Perpetuos Triumphos, Immortalemq. Gloriam. P.

Tu auspiciis, Augustissime Rex, prosperrimum Rerum Statum, & aurea planè Sæcula nobis pollicemur; eóq. certius, quo Te velutti fulgentissimo [illegible] Christiani Orbis cælum, Sacrilegæ quidem impietatis, ac inaudiæ rerum calamitatum Stygiâ caligine obtectum, undequaq. clarescere intuemur: [illegible] quo premi cæpimus Servitutis jugo, in assiduis cervicibus intolerando, avitam libertatem jam reddidisti, Teq. brevi, tanquam invictum Hercalem [illegible] infestæ Fidei nostræ Oppugnatorum Monstra, debellaturum, fore haud vanè speramus, Cum Prosperitas Tua divinâ quipiam Providentiâ indies magis, ma- [illegible] Strenuis enim laboribus Te consecuturum constat, ne quia vetustas obruere, aut Oblivio delere Tui Nominis amplitudinem possit: haud nemo censeri [illegible] illam unquam interiturum, quæ non lubricæ Fortunæ partus, sed constantis Virtutis est fœta, utpote Te verè propriâ. cadat illud

— famam extendere factis
Hoc Virtutis opus. —

[illegible] equidem fortunam expertum est, Virtus supra fortunam ponitur, imò fortuna tandem etiam virtutem adoravit, et dum virtuti [illegible] fuit, reddidit, reddidit et Imperio. Vidit Europa, Majestatem Tuam, maximis exercitibus, non per Legatos, sed Ipsam summâ [illegible] niâ Imperantem, & Gloriam sudoribus suis merentem, quàm alieno labore, alij sibi parant Principes; Pericula quæ [illegible] moribus subeunda relinquunt Ducibus, Ipsemet Strenuissime Rex, subire non dubitasti, nec sub alienâ latens forti- [illegible] tum celasti, ac ignaviam, sed contrà Tuorum (si quis in tanti Imperatoris militibus esse potuisset) timorem, invicto [illegible] bore et expulisses Tuis validissimis armis, Gentes bellicosissimas, celerrimè magnis atq. cruentis cladibus affectas, & [illegible] stern, aque ferro, ac prudentiâ non superatum, advertimus, quasi nulla Terrarum pars, Trophæis Anglorum vacare [illegible] Tanti referet, à subjectis populis, belli, gloriæq. studio flagrantem Regem pra oculis habitum perpetuo fuisse. Tu [illegible] rentum Tuorum, Avorum, Atavorum gloriam, quantumvis splendidam, ac Imperatoriâ Dignitate ornatam, longo superan- [illegible] tot inter Tuæ Illustrissimæ Familiæ sidera, clarissimum velut solis lumen, eminere aspicieris, Heroum hæres præclarissimus, [illegible] ipse omnium Maximus; Tuæ Hollandiæ, ut et Britanniæ nostræ, totiusq. Europæ sublevandæ, novus Atlas, cælitus [illegible] citer designatus.

[illegible] x, silentij hic ubi rerum magnitudo dicendi parvitatem infinitis partibus excedit, meminisse, & simul in præsentia, solam [illegible] re Clementiam, Hæc enim Maximos quoq. etiam Principes, maximè decet, utpotè quâ illi maximè ad Divinæ Naturæ similitudinem, [illegible] manæ eloquentiæ Principe judice, accedant. Hæc verò virtus eximia, à Tuæ Celsitudinis sole, lumen ducens, inter reliquas [illegible] ds, splendidissimè lucet.

— Velut inter ignes
Luna minores. —

[illegible] um, quo præfulges, præcellentium omnium Virtutum concursum, unde Tibi longè innatus, quàm Catoni Romano, ea laus ad- [illegible] nulas singulorum hominum virtutes, in Te unum ecornandum conspirasse. Innata Tibi est hæc regia Clementiæ virtus, Teq. [illegible] ut alterum Titum, amorem, & delicias generis humani per orbem celebrat. hâc arte Augustum imitatus, non tantum [illegible] tatâ licet feliciter ex usu Reipublicæ, Imperij formâ, sed et Vicinorum, cunctorumq. Exterorum benevolentiam & studium, [illegible] i, omniumq. linguas, & stilos, Terrâ Mariq. fecisti Tibi vectigales. Denique in Te, Regum Optime, Prudentiam, Fortitudinem, [illegible] aq. reliquas omnes dotes, quibus tum ad bellum fortiter gerendum, tum ad fructus Victoriæ uti decet colligendos, opus est, & nos [illegible] lima mirabitur posteritas: Hæc sunt enim verè quæ Principem evehunt, quæ conspicuum, & clarum reddunt, quæ Regnis aptant, [illegible] quamvis magna, præclaraq. sint, non in his tamen sunt oia, cum adhuc de Te plura, atq. majora supersint, quando quidem [illegible] decorum pulasti, ad immortalem bellicæ Tuæ virtutis gloriam, id quoq. laudis quasi pro coronide paucula indoctis accede- [illegible] in inter armorum sonitus, tubarumq. clangores, æquè liter as, ac arma tractantibus, multa, & non bulgaria [illegible] ta libentissimè præstitisse.

[illegible] maximè submissæ. Te supplex rogo, ut ad Regium Solium Amplitudinis Tuæ, me provolutum admittere, ne dedigneris, ut [illegible] est Operis, quod à nostrâ tenuitate, profectum est, serenâ fronte excipias, & clementer ignoscas. Res ipsa est quidem miranda,

Tuæ, fortè indigna. Ast etiam olim rebus minimis, rus incolentes, Offensas Deorum placasse, noturni satis. Argumentum
Operis, Tibi minimè indecens, non quidem Reipublicæ, sed singulorum, qui partes ejus sunt, salutem spectans; de Herbarum,
um, ac Plantarum cognitione agitur, Quarum adeò multiplex sil varietas, & ferè inexplicabilis, tot odores, sapores, colores,
nsibus nostris blandiantur; tot figurarum elegantiæ, quibus intuentes oblectent, ut Natura ipsa nos invitare videatur, ad eas
ndas; Quod, Opusculo hoc Botanicæ, locupletissimis Stirpium exoticarum Iconibus instructo, facillimè faciamus. Præstantiss:
ta, adeò Te dignum est argumentum, Rex Sapientissime: Stirpium enim Contemplationi deditos, ob ingentem bo:
m, pariter & insignem quam secum trahit utilitatem, olim fuisse Reges, & Principes, hodiè esse extrà dubium est, ut
n æquè celebratum monumentis, ac quotidiana, nullâ succedentium sæculorum interruptione temerata patet
a. Illud autem primò me adduxit, ut Hujus tertiam, maximam, et extremam Phytographiæ Partem, de quâ, quod
s olim in genere, Rei finem meliorem esse Principio ejus dicere ausim, omni cum debitâ submissione, Splendidissimo
Tuo dedicarem, quòd in Ipsâ, exhibetur Materia, cujus studio, complures olim Imperatores, ac Reges sunt magnoperè delectati
Regem omnium quotquot fuêre Sapientissimum, Salamonem, de Stirpibus scripsisse; Testantur Iubæ Mauritaniæ, Attali
norum, Mithridatis Ponti, Evacis Arabiæ Regum, de eâdem Re Commentarij; ut mittam Agamemnona, Masinissam,
um, Herculem, alios, & plurimos Viros, Majestate insignes; Rei herbariæ peritissimos. Ideòq; eò libentiùs ad faciendum
posui, quò certior sum, Majestatem Tuam, quoties à gravioribus Regnorum Tuorum Curis vacat, ex Plantarum dicere,
ione, plurimum capere voluptatis: Hortorum amœnitates adeò Serenitati Tuæ esse solet in deliciis, ut ausim
Botanicam, suo quodam jure, singulariter ad Serenissimum Regem pertinere; Argumento sunt, Tuæ Aulæ
osissima apud Hamptonienses Viridaria, berè Regia, ad prodigium usq; insignia, & voluptatis, amœnitatisq;
parata in Quibus Temet si reperis, nec credideris, Illa, vel India, felicitate superari; ijs enim instruendis Stirpibus
exoticis, huc, non dico ex Galliâ aut Hispaniâ, sed è Græciâ, Syriâ, Arabiâ, Persiâ, Ægypto, Barbariâ, imò Ultimis
ientis, quam Occidentis Populis, Indiâ, & Americâ, diversi generis Herbæ quotidiè advehuntur, magno quidem sumptu,
ram gloriâ, Aulæ, & Urbis Tuæ, imò Orbis Universi salute.
uidem, exemplo Romanorum Principum, haud minùs sibi gratulantium, ob raras peregrinis ex oris advectas
quam ob catenatam diversorum Regum antè Currus Triumphales seriem, Antiquorum etiam Regum ac
tum Corona, ac Diademata, ex Arboribus fuêre contexta, quibus se magis quam auro, quam gemmis, vel aliâ
q. repretiosiori, honoratos existimarunt. Triumphantium quoq. decus, Victoriarum gestamen, & in Sacris, ac
Certaminibus præmium, ubi his Victores insigniuntur, quod non Græciæ tantum, sed et cujusq. alterius Regionis
ac Reges ipsi non detractarant; Gratum proinde, ac jucundum, Tibi futurum spero hoc nostrum opusculum,
tum Coronarium est, eo quòd Stirpes quamplurimas, novas, & indictas, eximiæ pulchritudinis, & elegantiæ, in
prehensas, ex omni, ferè Terrarum Sinu, decerpsisse curaverimus, ut ubi Tibi semper concors Virtus, Tuos præcinit
hos, Coronam Triumphalem, ex Floribus undiq; rarissimis, Imperatore Triumphanti, haud indignam nectamus:
is ob causas Potentissime Rex Augusto Nomini Tuo, hæc depicta Botanices Pars offertur; Quo cum exordiens, per totum
ter Orbem, & Majestatem Tuam, inter Reges, et Principes cuicunq. Reipublicæ Mecenates, numerari valebit: Deus
x. Augustissime Rex. Majestatem Tuam, cum optatissima Tuâ conjuge, Mariâ 2.ª Serenissimâ nostrâ Reginâ, bonis
raq; Botanicis, Nobis, Patriæ, totiq. Orbi Christiano, diù servet incolumem, præclaraq. opera felicibus jam incep-
ijs, berè fortunet, Tuiq. Nominis memoriam, gestarum, gerendarumq. rerum magnitudine, Sacram esse
ÆTERNITATI, id ave o, id comprecor.

Sacratissimæ R. M. V. humillimus, et
Obsequentissimus subditus, & Servus.

Leonardus Plukenetius.

AD. STUDIOSOS. BOTANICOS.

...dem paucas hâc vice Vobis exhibemus Tabellas (benigni lectores) quæ γνῶσιν Βοτανικὴν Titulis & Iconibus. novâ supellectile plenioribus q3 ...ierunt. Hoc enim Studium, ut ab incunte juventâ mihi cordi fuit, ità ad hunc usq3 diem, prout Thema perjucundum nobis insenescit. ...ῶν τῆς γενέσεως ἕνεκα planè divinum est. Ità enim Veteres tam Hebræi, quàm Ethnici existimârunt; Isti, qui ut Deum ter ...πανλων ἐκόντων δωτῆρα meritò Statuunt, ità etiam eidem Salutarem hanccε Scientiam acceptam ferunt; Hi, qui ...herbarum q3 cognitionem ad ipsos Deos retulerunt, & delitarum Inventores, divinis honoribus dignos censuerunt, imò ipsis ...arum Deos Inventores opinati sunt, mutata ab ipsis nomina indiderunt. E'lucet enim in his omnibus Creatoris Majestas, Non ...ahamvictimam Antiqui, sed foliâ & flore primam pubescentis Naturæ lanuginem, manibus decerptam Dijs adurebant, quo ...m Creatorem lætabantur. à quo Herbæ, & quæcunq3 in Terrâ Ortæ sunt. Nec Stirpis ullius cognitionem, aut nomen contemnendum putes, dum ...arvis, quanta dei; quàm inextricabilis perfectio. mirabilis enim in minimis est Natura, & dives. Hanc itaq3 nostram Phytographiæ tertiam Partem ...ntas circiterreales, hucusq3 incognitas, & non omninò (aut alibi satis infeliciter) depictas, & annotatas Plantas continentem, ab amicis nostris Botano= ...ceptitam excipite, suscipite in quàm benigno & Sereno vultu, quoniam & varietate, & Novitate, Vos delectare mihi in animo fuit. Servantur autem ...hæc plura, quæ si hæc placebunt, Vobis communicare etiam brevi censemus. Nec id ægrè ferendum spero, quòd in Novis & inauditis Plantis, voces ...inusitatas Usurpare cogimur; quòd eò lubentius à me factum intelligatis, quoniam admonente Tullio, Aut Rerum novarum, nova facienda, aut ...ferenda Nomina. Inquit endum potius nam legitima videatur Vocum sumptio; Nolle autem ipse, seu singulares animadversiones in Plantas, earum ...ymbola genuinæ eis à Naturâ datæ, Conjugij ipsius Nominis, & Plantæ præcipua erunt Instrumenta, eòq3 potiora quò magis peculiaribus, ...identibus signis, Collecta sunt. Neq3 enim præcipui Naturæ Characteres obliterari facilè aequè possunt, ac nostri, & juxtà arbitrium vulgares ...Nominum, qui facillimè ponuntur, reponuntur, innovantur, alterantur, dum isti, Rebus ipsis inhærentes, æternum durantur i manent. ...ter nostræ Appellationes si quibus dam minùs arrideant, permittant quæso tales à Pluquentio Usurpare tam ipsi, do nec magis apta ...nerint. Omnes denig3 hujus Facultatis cultores, & asseclas officiosissimè rogamus, ut ubi in his planè Novis, & Incognitis, quarum partes magis ...varijs q3 nos latent, Nomina adscribendis, & ad proprias Classes relegandis; Nos lapsos animadverterint; amicè & candidè moneant, moniti, Ipsis ...mus, errores nostros libentissimè agnoscemus, & emendabimus; imò si quid erroris non moniti, in dictis nostris animadverterimus, ultrò fate- ...bimur. Divinum nostrum, Senem. qui (ut Celsi verbis utar) à Suturis se deceptum esse memoriæ prodidit, more scilicet Magnorum Virorum, & ...Ingnarum Rerum habentium, non levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt, Magno Ingenio, multaq3 nihilo minùs habituro. Convenit ...dax veri erroris Confessio, præcipuè in eo ministerio, quod Utilitatis causâ Posteris traditur, ne qui decipiantur eâdem ratione, quâ quis antè deceptus est.

Atq3 hilari vultu frondenti tempora ramo
Cingite —

...str. ad Palatium
...apud Westmonast.
...Mundi Salvatore

T. A B. CXXI.



CXXI. *fig.* 1. *Abies minor pectinatis foliis* **Virginiana**, *conis parvis, subrotundis. an Avevetl & Ahoehoetl. s. Tympanum aqueum, Abies Mexicana minor* **Hernand.** *Hist. pag. 92.*

2. *Abrotanum elatius subincanum, foliis creberrimis secundum caulem in meta formam fastigiatis. an Abrotan. mas. trifido Viridia folio,* **Lusitanicum. Parad. Batav. Prodr. 303.**

3. *Acacia* **Maderaspatana** *spinosa ramosior, cortice cinereo, ramulis plerumq; ex uno pediculo binis, aculeis brevioribus crassis.*

4. *Acacia* **Maderaspatana** *foliolis parvis, aculeis è regione binis pro grandibus horrida, cortice cinereo.*

5. *Acacia* **Maderaspatana** *minutissimis foliis, aculeis ferocibus alternis frondosa, cortice itidem, cinereo.*

6. *Acacia tenuifolia* **Maderaspatana** *spinis brevibus, recurvis, albicantibus cortice fusco. Hujus pinnulæ minimæ latæ, & obtuse pinguntur cæteras studiosissime celata. elegantior ejus ramulum in medio Tabellæ seorsim pictum vide an Mimosa arborea Javanens. spinos. tenuiss. pinnis &c. Breyn. Pr. 2.*

TAB. CXXII. 1. Acacia Americana grandibus aculeis ad ramulorum exortum cornua bovina referentibus, siliqua rostrata. Acacia Americana cornigera, siliquis in spinam abeuntibus. Parad. Bat. Prodr. 303. Hortmomaxalli. S. Arbor Cornigera Hernand. p. 86. Querna Lusitanis. in Horto Regio Hamptoniensi collegimus.

2. Acacia Maderaspatana spinosa pinnis reluti lunulatis scutioribus Myrti æmulis, nervo pinnularum ad unum latus vergente, siliqua latâ ad instar Malabarorum H. Mal. Part. 6. Pag. 7.

3. Acacia Zeylanica minùs spinosa, pinnularum costis, & caule, rufescente hirsutie, villosa. in Hort Regio Hampton. anno retroacto, hujus ramulum collegimus. nostra.

4. Acacia forte cognatus e Maderaspatan Frutex Vitis Idæa Bengalensis, foliis & ramulis alternis ad foliorum ortum Spinis exiguis asperatus. Hanc, & antepenultimam, cum elegantissimis Acaciarum speciebus, præcedenti Tabula enumeratis, necnon quamplurimis aliis Stirpibus novis, & exoticis quas nitidè exsiccatas, & inter chartas repositas, à Fratre Suo charissimo ex Orientali India sibi advectas habuit Ornatissimus & permunificus Vir D. Carolus du Bois Londinensis Mercator celeberrimus et Rei Herbariæ Cultor eximius, nobis ad exsculpendum benignè concessit.



CXXIII.

Acacia Africana, spinis candidantibus horrida, subrotundis foliis, odoratissima.

Acacia Africana, Abrus foliis, aculeata, spinis longissimis horrida. fortè Acacia Americana spinosissima floribus luteis, globosis, fructu teretiusculo, torioso, dulci. Breyn. Prodr. 2.

Acacia Zavanica non spinosa, foliis maximis, splendentibus. H. Bedum. Cadarvang - Indigenis dicta.

Acer maximum foliis trifidis, & quinquifidis, Virginianum. Negundo perperam dictis arbor. Virginiana Hort. Bedum. Raij Hist.

Ejusd. Arboris folium quinquifidum, cum seminibus alatis, maturitatem adeptis.

Adianthum Africanum, Rutæ murariæ æmulum, segmentis longioribus acutis; ab amicissimo Viro D. Patricio Adair nobis communicatum.

TAB. CXXIV



1. *Adianthum fruticos.* Bermudense, *summis ramulis erectis, et in metæ formam fastigiatis. a Peritissimo Botanico,* D. Iacobo Petever *habuimus.*
2. *Adianthum fruticos.* American, *summis ramulis reflexis et in Orbem expansis. Adianth.* Amer. Cornuti *de* Pl. Canad. *Adianth. fruticos.* Brasilian. CB Prodr. 150. *variis in Hortis circà* Londinum.
3. *Adianth. Calomelanos* American. *S. Ad. nigr. fol. pronâ parte candidissimis. an Adianth. nigr.* Americ. *pulvere candidiss. aspersum* Breyn. Cent. *forte! Conambai-Miri S Ad.* Brasiliam *Species* 2ª Pison. *p.* 234. *ex Insulis* Iamaicens. *et* Barbadens. *nobis advecta.*
4. *Ad.* Narbonense *foliis longioribus, et acutioribus, pulverulentis, pediculo nigro.* Sch. Bot. Paris. *munere* D. Sherard *accepimus.*
5. *Ad. maritim. Segmentis augustioribus* Charibearum. *hujus exemplar, nobis Vir humanissimus* D. Georgius London *primò concessit.*

Fig. 1. *Adianth. S. Trichomanes* Bermudense *maxim. serratis foliis auriculatum. ex dono* D. Petever *accepimus.*

2. *Ad.* Barbadense *auriculatum, ramosum, segmentis crassioribus, minutissimè denticulatum.*

3. *Alsine pentacoccos. Ranunculi auricomi folio, et facie* Maderas patensis. *hujus ramulo superiùs laudatus Vir,* D. du Bois, *munere nos ditavit.*

4. *Alsine Veronicæ affinis, Trissaginis folio, et facie,* Maderas patana.

5. *Alsine Indica polyanthos tenuifolia è* Maderas patan. *hanc, ut et proximè præcedentem, à spectatissimo viro, et celeberrimo Botanico,* D. Carolo du Bois *accepi.*



Tab. CXXVI.

Fig. 1. Alaternus Hysicanensis s. Africana, Lauri serratæ odoratæ Stapeliana foliis Cat. Hort. Beaumontian. pag. 3.

2. Alaterni Arbuti foliis lucidis, Promontorij Bonæ Spei.

3. Alaterni sempervirens Africana, foliis lucidis spinosa ē dicterijs Cl. D. Herman.

4. Alcea fruticosa Pentaphylloides æmula, floribus amœnissimè rubellis, calyce producto, è Madera, spatàn.

5. Alceæ affinis Indica Abutilon dicta, flore flavo, foliis mollibus profundè benosis, siliculis lanuginosis. an Althæa Abutilon dicta Indica, flore luteo minori, Hort. Lugd. Anoda Zeylanensium.



Tab. CXXVII.

1. Alcea moschata villosissima foliis in profundiores lacinias incisis, ab honesto viro Iacobo Reede, ex Insula Barbados allata est.
2. Alcea Madera aspataria, hastatis, foliis glabris, pericarpio tantùm villosa. e Collectaneis du Boisianis habuimus.
3. Alcea tibaria. s. Corchorus Americana Carpini foliis ex duplici capsulâ longiore ornatâ. an Corchorus Americanus minor, Carpini folio, siliquâ angustiss. ex lateribus ramulorum proveniente. Breyn. Prodr. 2. 36.
4. Alcea olitoria. s. Corchorus Americana angusto barbato folio, capsulâ strictiori.

TAB: CXXVIII



Fig: 1.



Fig: 3.

Fig: 2.



Fig: 4.

S:G: sculps:

Tab. CXXVIII.

Fig. 1. Almi facie Americana foliis non serratis. fortè Almi folio & facie Curaßavica P. B. P. 305.

2. Almo affinis Americ. Ligustri folio, fructu spicato, rubro. Breyn. Prodr. 2. Manghala arbor Curassavica foliis Salignis P. B. P. Frutex innominatus instàr Salicis pumilæ foliis Salignis Marcgr. p. 70. Utramq; primùm in Comptoniano deindè in Horto Regio Hamptoniens. observavimus.

3. Alsine Maderaspatana Gallÿ foliis, floscul is communi pediculo ternis. ab Alsine procumbente Gallÿ facie Africana Cl. Hermanni. plurimùm differt.

4. Alsine Caryophylloides Africana, radice magnâ Astragalite. ex Codice Comptoniano.

TAB: CXXIX.



Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

S: Gribelin sculps:

Tab. CXXIX

1. Aloe Africana bulbari similis floribus rubris, & paucioribus, è dicterijs Cl. D. Herman.
2. Aloe Africana foliis erectis, superficie spinosis.
3. Aloe caulescens foliis reflexis, margine spinosis Africana.
4. Aloe spinosa, arborescens, ramosa, Promontorij Bonæ Spei Harum omnium picturas, curiosissimè delineatas, & ipso Promontorio vivis coloribus illustratas, Nobilissimi, atq; Reverendiss. adhodùm Henrici Episcopi Londinensis gratiâ, ad exsculpendū impetravimus.



Tab. CXXX.

Alsine Indica Glaucis maritimæ folio, flosculis ex alis longo pedunculo innixis. ab Alsines fluviatilis Tabernamontani foliis haùd multùm abludit.

Alsine beronicæ affinis, Gratiola foliis Maderaspatana.

Alsine holostea olabra, s. Stramen Leucanthemum Ind. Orient. Anagallidis aquatic. quartæ Lob. foliis angustioribus.

Alsine holostea olabra, sive Gram. Leucanth. Indicæ Orientalis folio brevi.

Alsine Indica quadrifolia & quinq folia flosculis longiori pediculo insidentibus.

Alsine Holostea villosa foliis caulem ambientibus multiflora è Maderaspatan. Omnes has novas Alsinarum species à nunquàm satis laudato viro D. Carolo du Bois sæpius in his nostris Exoticorum Tabellis nominando accipiebam.

Huic ultimæ Schanganam pulla HM. Proprius aut alter videbitur.



Tab. CXXXI.

fig. 1 Althæa arborescens Americana ampliſsimis Verbasci foliis craſsis & incanis, an Althæa Americana fl. luteo ſpicato lanuginosa major ex Insulâ Curacao Breyn Prodr. 2.

2 Althæa Maderaspatana subrotundo folio molli, & hirsuto, multipilis sivè seminibus adapicem crinitis nobis communicavit Spectatiſs. Vir D. Carolus du Bois.

3 Althæa Braſiliana frutescens incarnato flore Fagopyri semine PBP. Alth. Braſilian Pisonis.

4 Althæa Americana incana frutescens flore coccineo Paradis. Batav. Prodr. in Horto Aulæ Regis nostri longe celeberrimo Hamptoniensi, cum proximè præcedenti sæpius Observavimus.

TAB: CXXXII.



Fig: 1.

Fig: 6.

Fig: 2.

Fig: 5.

Fig: 4.

Fig: 3.

S: G: sculps:

CXXXII.

Althæa Morisolia Ind. Orient. ad foliorum sinus, capitulis singularibus, parvis.

Alth. frutescens orbiculari sere folia flore luteo Ind. Orient. semine rostrato. honestus vir, & apud Oxonienses olim hortulanus ingeniosissimus D. Harrison communicavit.

Alth. minima surrecta Veronicæ villosis foliis è Maderaspatàn.

Alth. pusilla supina Geranij exigui maritimi folio & facie Maderaspatensis. huius autem pericarpium est verè capsulatum ideóq; rectius inter Alceæ genera adnumerari debuit an Malva altera repens Betonicæ folio Zanoni. Istor. Bolan.

Alth. Abutilia foliis, fructu hirsuto Americana ... in Horto. Reg. Hamptoniens. ex semine natam, supremo Vere, conspeximus.

Amaranthus ... Maderaspatanum. foliis angustis, ex adverso binis, floribus ad nodos verticillatis.

TAB: CXXXIII.



Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 2.

Fig: 5.

Fig: 1.

Fig: 6.

S. Gribelin. sculps:

CXXIII.

maranthioides humile Maderaspatanum. capitulis candicantibus. folio molli.

maranthioid. Indicum, globosum, ad caulium nodos floridum, foliis Solitarijs, summo apice barbatis.

maranthioid. Indicum, verticillatum. Parietariæ hirsutis foliis, spinosum.

nchus a angustifolia, verticillis longis, aculeis armata, è Maderaspatana. Hæ quatuor postremæ, ex Plantis siccis liberalitate humanis. Viri D. Caroli du Bois, nobis Communicatæ.

nagyris Africana, angustis siliquis, flore cæruleo.

nagyris flore luteo, angustis siliquis Africana, è Curiosissimo Codice Comptoniano Reverendiss. Dom. Henrici Londinensis Episcopi favore, in nostras tabellas transtulimus.

TAB. CXXXIV.



Fig: 2.

Fig: 1.

Fig: 3.

Fig: 4.

S. Gribelin. sculps:

CXXXIV.

Angelica montana max. floseculis candicantib; ad caulium nodos umbellifera, fortè Archangelica I B. Dod. Clus. an Ligusticum quorundam
folijs Angelicæ simile I B. Schol. Botan. Angelica Alpina ad singulos nodos florida Flor. Batav. huc etiam referendam puto
Angelicam Siliaicam max. s. Archangelicam Shwenckfeldij. Cat. Pl. Siles.
Anona Indica latifol. fructu squamato aspero seminibus ex flavo nigricantibus turgida, Araticu-apè Brasiliensium Pisonis. Anona
American. sylvestr. foliis & fructu maximis P B P. fortè etiam Fructus 1. Garth. s. Arguacou Clus. exot. Soortsack.
Belgarum. Nostratibus colonis Sowersop nuncupata fortè Guana-bana Nierembergij. p. 331.
Anona Indica fructu ex viridi luteo cortice squamato aspero nucleis nigricantibus parvis. Pyro similis fructus alter in novâ
Hispaniâ C B P. Guanabanus Oviedi. fructu squamato I B. Anona Curassavica fructu dulci P B P. Honig. appel.
Belgarum. Sappa quibusd. Sugar apple & Sweetsop. Nostratibus vulgo
Anona Indic. angustif. fructu cærul. cortice squamato glabro. Anona maram Kott. Malab. Ahate de Panuchos del Ate Pannicensis Terentij Hol.
in Rerc. Anon. Oviedi. Hispanis Mangier blanco Custar-apple Nostratib; dicta Supin. fructu purpur. Sinarum Mich. Boym. flor. Sinens.

TAB. CXXXV.



Fig: 1.



Fig: 3.

Fig: 2.

Fig: 4.

Fig: 5.

S. G. sculps:

Tab. CXXXV.

Fig. 1. Anon. Americ. juxta Fluviorum ripas innascens pyriformis fructu Sardinas muriâ conditas olente, semine ampliori pallido; forte Anona Americ. folio splendente ex Vera Cruce PBP. Nostratib; Anchovie & River Pear vocata: forte Aratica pana Pison. item Pyro similis fructus in Novâ Hispan. nucleo magno CBP.

Anona Indica fructu conoide viridi squamis deluti aculeato Alamaram Hort. Malab. Avaticu ponhe Marcgr. & Pison. forte etiam Vata Sinensib; Boyuuy Fl. Sin. Nostratib; Colonis the Prickley apple vulgò nuncupatur.

Anona (forte) Ind. Orient. fol. obl. ex adverso binis plurimis conspicuis venis in parallelos secundum latitudinem venulis discurrentibus. ejus d. Arboris folium (sitno bis existimamus) ex America delatum adpingi nos curavimus. forte Mongdiba Brasiliensium Pison. & satis propriè nominari possit Anona Fructus Indiæ lævis fructu Ovali aureo, parte Soli obversâ rubris punctis insignito.

Anonis non spinosa Cretica flore purpureo Hort. Patav.

Anonis lutea mitis ex tryphylla, ad florum pediculos capreolata, foliis lævissimè serratis ex Horto Patav.

TAB. CXXXVI.

Fig: 1.

Fig: 2.



Fig: 3.

Fig: 4.

S. Gribelin. sculps.

CXXXVI.

Anthobilithos Convolvulaceus American, Barbadensibus Colonis Wilde Slip-blossome nuncupatur. fortè Convolvuli Species Americana floribus deciduis è Calyce cito.

Synonymos Linaria folio Orientalis, Gallis luteiflore, Herba capsularis verticillata. à D. du Bois habui.

Synonymos baccifera verticillata folio molli subincano ex Americâ. hujus baccæ sunt latè rubentes ut quasi murice tinctæ.

Synonymos Americ. foliis Parietariæ scabris, floribus albis ad foliorum ortum bifè conspicuis. Fœnugræci flore Parietaria folio Planta Americana P. B. P. an Kali genus Americanum.

TAB. CXXXVII.

CXXXVII.
nitrhinum Saxatile fol. Serpylli CBP. quod in Prodromo describitur.
pocynum scandens Scammoneæ Monspeliacæ foliis Curassavicum ex Hort. Reg. Hamploniens.
pocyn. incanum Scandens Maderaspatanum Violæ martiæ foliis, floribus purpureis.
pocyn. scandens Americ. Convolvuli minoris folio caule hirsuto. Apocyn. Americ. Nummulariæ foliis quibusdam.
per. Portoricense frutiosè. fol. crassis. hastæ cuspidi similibus Hort. Beaumont. Tithymalus Portoricens. fol. crass. hastæ cuspidi similis PBP. in HRH. collegimus.
poc. tuberos. angustif. ereturi flore ex luteo virescente foliis hirsutis pubescentibus Africanum. ē Cod. Comptoniano.
norrodon s. Arbor Americana triphylla Allii odore poma ferens. Arbor Americ. trifoliata pomifera seminibus reniformibus Hort. Beaumont.
herebinthus Verè crucis. Satyrio folio, Arachi vulgò PBP. Arach. Symmaron (i.e) Aurantium sylvestre Indigenis audit. in Nyrovala HRH. part. 3. & Tapia Mar. regr.

TAB. CXXXVIII.



T. CXXXVIII.

1. Aphyllon aquatic. Virginiense petræum D. Banister.

2. Apocyn. rectum elatius Saliis angusto fol. immaculatis flosculis in umbellam, folliculis pilosis. an Apoc. Hysicarens erect Saliis folijs angustioribus, Hort. Beaumani.

3. Apocyn. erect. Saliis latiori folio Umbellatum, floribus aurantijs. an Apoc. Hysicarens. erect. Saliis folijs latioribus, Hort. Beaum. Apoc. Curassavic. fibrosa radice floribus Aurantijs, Chamænerij folijs latioribus. P. B. P. Hujus, ut et præcedentis ramulum floribus ornatum Cl. Vir. et olim condiscipulus noster D. Uvedal. C. D. ex qui Horto omnium stirpium exoticarum varietate, & copia instructissimo collatum, nobis amicissime communicavit.

4. Apocyn. scandens radice tuberosa Promontorij Bon. Spei. è Cod. Comptoniano.

TAB. CXXXIX.



Fig: 3.
Fig: 4.
Fig: 1.
Fig: 7.
Fig: 5.
Fig: 2.
Fig: 6.
S: G: sculps:

TAB. CXXXIX.

Apocyn. Afric. tuberosum labore folio erectum folliculis hirsutis flore pallidè punicante. ē Codice Comptonian:

Apocyn. Curassavic. triphyllum floribus albis P B P. in Hort. Reg. Hampton.

Arbor Virginiana Pisi amplis folio baccata Benzoinum redolens. fortè Balsamum ex Peru I B. tom. 2. an Benjoinum cujus Arbor folio Citri ejusd. I B. Benzoinifera, aut Arbor Benevisera Garciæ. Horti Comptoniani est singulare Ornamentum.

Aliud ramulus sub Verni temporis exortum flosculis hinc inde alis muscosis ex lubo hirsutis, plurimis simul ad fabor mortē emissis: quos sequuntur baccæ,

Frutex Indica siliquosa Coryli folijs parvis serratis, summa parte sinuatis. an Uxana P. Ammān. Charact. Rarin Tagera HM. part. 6.

Arbor Americ. baccifera Myrtifolia viminalibus virgis, s. Flagellifera major. Barbadensibus Rodwood dicta.

Eadem longius mucronatis, s. cuspidatis & punctatis foliis, s. Flagellifera minor.

TAB. CXL.



Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

S.G. Sculps.

CXL.

...or Bitinagarica Myrti amphoribus fol. per siccitatem nigris Cubebæ sapore. àn Myrti danum Hippocratis; fortè Comacum Antiquorum. s.

...Cumuc lavanensibus moderns, quo nomine & Cubebæ ab ijs insigniuntur.

...or Orientalis baccifera Cauli folijs crassis & venosis & siccitate nigrantibus quasi Derris tinctis polypyrene. àn Perin Pand. Hort. Malab. P. 5

...or Americ. pinnatis fraxina foliis fructu reniformi Phaseolum exprimente Spanish Ashe (i.e.) Ornus Hispanica Barbadensibus nostratibus ...icta; est Balsamifera fortè, àn Hortar. Mexicensibus Hernànd. p. 51.

...or Americana baccata cujus baccæ Crapularia (i.e.) Tipple-Berrys Barbadensib; audiunt; eō (fortè) quòd in potu aliquando infusæ crapulam in- ducunt.

TAB.ª CXLI.

Fig: 1



Fig: 2

Fig: 3



Fig: 4

S. Gribelin. Sculps.

CXLI.
Frutex labiosus Elæagni folijs late virentibus Americana tricoccos; alias Ricini fructu Arbuscula Bermudens. folijs longioribus bicoris Nostratibus
Colonis Brogmuncupata; an Saponaria tricocca minor Americana.
Arbor siliquifera Faginis fol. Americ. fl. comosis. an Arbor Sinus S.ti Augustini Fagi species quæ fructum Fabæ similem fert. Lonst. Dendrolog. p. 209
Arbor quam Frutex innominatus ligno saligno, folijs ad Myrti folia accedentibus; sed longe majoribus Marcgr. p. 82. Spanish Oake
(ie) Quercus Hispanica Barbadensibus dicta.
Arbor Americ. Lentisci folijs ferrugina. an Mologuahuitl. s. Arbor Chilli Mexicensium, Hernand. p. 50 Fustick wood Nevisensibus perperam dicta.
Arbuscula Arbuti alatis folijs Africana, fortè Pambolivis Park. p. 1636. hujus exemplar apud Promontorium Bon. Sp. collectum singulari amicitiâ
nobis communicavit Ornatiss. nec non Clariss. Vir D. Patricius Adair. Medicinæ & Chirurgiæ facultatibus exercitatissimus. an Caranda
Palma CBP. 460. Aruba Oviedi. &c.

TAB. CXLII.



Gribelin sculps.

XLII.

bor Lonchifolia Ind. Orient. comantib; floribus, et fere Corymbosis. an Arbor Laurifolia Chinensis Marliny.
bor Indica Mali aurantiæ foliis obtusioribus ē Madera ap atan. an Akar à Patsotts Hort. Malab. P. 5.
bor Americ. Oleomelliflua cuspidatis foliis crenatis, & dilutè viridib; polypyrene. Wilde Honey-Tree (ie) Agriomelidendros Barbadensib; dicta: ab (forte)
quòd in hujus Arboris ramos, sylvestres Apes pro mellificij suis, favos construunt. an Thiata, ante Camunia apud Nov. Hisp Recch. p 333.
bor American. Mancinello dicta, fructu Pomi venenati, multis septerus & pluribus in Osiculo muricato, tubidon bubi dispartito ibidem est. Monard
Ligonis. nostri in Hist. Barbad. p. 68. an Arbor venenata fructum ferens pilæ magnitudine visu specie tum sed venenatum Thevet. Hist.
Lugd. 1834. fortè. Juglandis fere facie, Fructus exoticus sulcatus tuberosus IB. l. 1. l. 3. p. 399. fortè et iam Fructus peregrini, orbicularis -
novem nervis distinctus minor cum Osiculo angulosa ejusd IB. Fructus Orbicularis minor novembris. id est similem distinctus
CBP. Fructus Orbicularis peregrinus 2.is nervis distinctus Clus exot. lib. 2. cap. 10.

TAB CXLIII

CXLIII.

Fig: 1 Frutex Madraspatens. Ligustri facie Vitis arboreæ color ev. consistentiâ; an Coddam-pulli Hort. Malab. P. 1.

Fig: 2 Arbor Bismagarica Tiliæ foliis Canschi Malabaricæ aliquatenus accedens.

Fig: 3 Frutex Veladagū Malabaricæ similis ē Maderaspatan.

Fig: 4 Arbor Maderasp. Galactoxyli Americani foliorum æmula. fortè Tsjola Malabarensium Hort. Malab. P. 3.

Fig: 5 Javanica Persicæ foliis Herm. Cat. Mſs. ē Maderaspatan. fortè Curutu-pala Hort. Malab. P. 2. an Arbor Indica Mali Persicifolio Hort. Beaumont. p. 10.

TAB. CXLIV.

Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

S. Gribelin sculps.

CXLIV.

...r Sirinamensis Lauri deniorib; fol. quinis ab uno ecortu prodeuntib; hujus ramulum humanissim; vir D. Geo. London nobis ...mice communicavit, qui a Reverendiss. viro D.no de Mareeus Hagæ Comitis in Hollandia, rerum Botanicarum æstimatore insigni, ...um alijs quamplurimis reliccatis plantis Sirinamensibus adhuc incognitis accipiebat.

...or Ingæ Brasiliana foliis Africana tricoccos; Mehenbethene Cortusi Clusio accedentis ex Codice Comptoniano.

...or benenata Cyrimachiæ luteæ in modum trifoliata. aut Tangaracat. Pison. pag. 301.

...uscula Barbadensis Cisti foliis ferrugineis, hirsutis, circa caulem ad intervalla confertis.

TAB. CXLV.



CXLV.

Arbor Americana alata foliis succo lacteo venenata (forte) Ahoay-miri Pisonp. 308.

Arbor lactescens aculeata foliis Quernis Americana. Bdellifera (forte) s. Arbor Bdellium ferens in Americâ. Arbuscula Portoricensis lactescens foliis Quercinis, spinis geminis ad singulorum foliorum ortum exasperata Hort. Beaumont. Quercinei foliis Arbuscula spinosa lactescens Portoricensis PBP.

Arbor aculeata Barbadoi Insulæ ramulis incurvis, sem am topiariam efformans Lactary missa. forte Arbor Staticefolia s. Myrrha liquidam fundens Americana. Nostratibus Colonis Weeping Bower nuncupata.

Arbuscula Barbadensis amplexi caulis triphylla, Mail-clou Malabarica foliis tenerioribus et petiolis alatis.

TAB. CXLVI.



Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

S. G. Sculps

CXLVI.

Arbor Americana convolvulacea Broad-leafe(ie) Platyphyllos Barbadensib⁹ dicta: foliis serratis.

Arbusculum Americanum amplexicaule Cerasi folio corymbosum.

Arbuscula dolubilis Americana subrotundis Cassiæ siftulæ foliis latè virentibus. Barbados Insulâ in sepibus frequens. an Colubrinum lignum 3.m Garciæ foliis Centisci IB. an Caure saue Curassavica dolubilis fructu Moriradice crocea &c. Hort. Beaum. Rubi vel Mori fructu Americana Arbor foliis Laurinis Morillie vulgò PBP. hujus ramulum ex Insulâ Barbadensi modò cum aliis compluribus exsiccatis Plantis ab honesto viro Jacobo Reede in Angliam primò allatum Observavimus.

TAB CXLVII

Tab. CXLVII

Fig. 1. Arbor Maderaspatensium Pavetta s. Malle-amoltho Malabarorum v. Vasavedi quorund. haūd abludens foliis autem alternis. ān Arbor Malabarensium fructu Centrici C.B.P. & Joh. Nieuhof. Itiner. fol. 167.

Fig. 2. Arbor Indica Tsjocatti Malabarensium haūd abhorrentis ē Maderaspatān foliis autem non crenatis.

Fig. 3. Arbor Indica Mali Medicæ amplioribus foliis Maderaspatana; fortē Pomas. Pomamaram Hort Malab. P. 4. cujus Lachryma resinosa, an ut species Gutta Gambi quæritur ā Comelino in Not.

Fig. 4. Arbor Americana teneriori folio floribus circā ramulos velut corymbosis ex Insulā Jamaicensi.

Fig. 5. Arbor Jamaicensis denseriori Ilicifolio triphyllos floribus Coactūs s. spissis dispositis.

Fig. 6. Arbor Americana triphylla numerosis staminibus purpureis apicibus præditis floris umbilicāi occupantibus. huic fortē respectat Nyrvala Hort Malab. P. 3.



TAB. CXLVIII.



CXLVIII.

Arbor spinosa rigidioribus Fraxinella fol. in aculeum abeuntibus Madera spatana.

Arbor Indica Lauro-cerani foliis ē. Madera spatan. fortè Kopang arbor Novanglicana antiarthritica PBP.

Arbuscula Ind. Orient. hexaphylla flosculis exiguis in spicam positis folio teneriori.

Arbuscula Ind. Orient. hexaphylla foliis firmioribus, spicatis floribus, calyce amplo.

Aristolochia Pistolochias. Serpentaria Virginiana caule nodoso D. Banister Cat. Mss.

Arum humile Ari sarum dictum Virginiense triphyllon. an Arum triphyllum humilius et minus Parad. Bat. Pr.

TAB. CXLIX.



CXLIX.

Arum polyphyllum Dracunculus & Serpentaria dictum, Sirinamense caule atro-rubente glabro & elegantèr bariegato. Hort. Becum. an Arum polyphyl. Dracontium et Serpentaria dictum folio ramoso Peonia instar caule levi. Par. ad. Bat. Prod.

Arum minus Sagittaria ſtyliſ ex Insulâ Barbador. an Arûminus? Zeylaniam Sagittariæ folio PBP. fortè etiam Arum montanum Prosp. Alpin. exot. p. 335.

Asperula forte congener. Planta peregrina; Hujus picturam Illustrissimi Comitis Portlandiæ favore, ex Hortis suo pluribus rariorum & exoticorum Plantarum Iconibus bivis coloribus elegantissimè manu pictis instructo accepimus.

Aster Conyzoides Ind. Orient. ramosior caulibus sparsis.

Aster Sirinamensis rubro rotundis foliis integris laruugine obductis, sub nomine Tra ad humanissimū virū D.nū Georgiū London primo nitidum et

Auricula Ursi montana angustis & leviter crenatis foliis floribus purpureis. in Horto Patavino collecta.



Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

TAB CL.

Fig. 1. Bellis ramosa Umbellifera Cornuti. Bellis major ramosa Umbellifera Americana Park. semina sert longa, minimè papposa, utrumq; Cl. Morisonus flores in papposa abire scribat in Prælud.

Fig. 2. Bellis Myrtifolia humilis, caulículo ad florem foliosa. Promont. Bon. Spei. ex Codice Comploniano.

Fig. 3. Betonica Virginiana elatior Scrophularia folio flore ochroleuco Hort. Oxoniens. Betonic. max. Scrophularia fol. flore tubo pallescente Sch. Bot.

Fig. 4. Betonica Alpina latifolia major villosa flore luteo Hort. Reg. Par.

Fig. 5. Betonica arbor Maderaspatensis villosa foliis profundè venosis. à D.no du Bois habui.

Fig. 6. Eadem à seminibus ex Insulâ Barbados allatis, in Horto Reg. Hampt. [illegible] nata.

TAB. CLI.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Collins. fe:

CLI.

Betula arbor Americana, seminibus Lithospermi frumentacei annulis. Birch Tree Barbadensibus dicta.

Bistorta media folio minus rugoso IB. Bistorta major radice magis intorta CBP. Bistorta magis intorta radice Park.

Blitum erectum Barbadense megasporon. an Cararu Brasiliensium Pison. p. 243. Wylde-Spinach Nostratibus nuncupata.

Bryonia Americana fructu aureo Cerasi parvi magnitudine, tetrapyrenebenenato, Barbadensibus nostratibus Poyson-Wythbocata. in Hort. Reg. Hamptoniens.

Bryonia Africana foliis Lupuli scabris. in Horto Comptoniano ex seminibus à Cl. Hermanno transmissis, enatam conspeximus.

TAB. CLII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

...ll.
...ryonia Sideritidis folio multiplici, dispermos flore cæruleo. Prom. Bon. Spei.
...ryonoides trifoliatum Indicum, foliis succulentis, crassis, sucrenatis. an Bryonia Curassavic. folio dentato Crasso et succoso caule PBP. append.
...forte, Trifoliata Portoricensis. Planta caprea lata foliis crassiusculis serratis, Hort. Beaumont. p. 45. in Hort. Reg. Hampt. succrescit.
...cane phyllon elatius Virginianum. s. Limonio congeneris alter a species elatior, foliis triplo longioribus.
...alabura alba PBP. forte Sebestenæ simulis Americana ejusd. PBP.
...mpanula Alpina Sphærocephalos CBP. Trachelio majori petræo Ponæ simile, si non idem I B. t. 2. Trachelium majus petræum Ponæ Descript. Hort. Baldi.
...mpanula Sphærocephalos, pervenusta foliorum ad oras insigniter denticulata forte Campanula Alp. Sphæroceph. cærulea, magno flore Schol. Botan. 76. hæc elegantiss. Campanularum speciem Dr. Doody nos ditavit.

TAB. CLIII.

LIII.
talica Africana Promont. Bon. Spn. ab amicissimo viro Dn. Doody communicata.
mintha montana longiori folio, glabra, floribus pallidè violaceis. Montastrum glabrū. floribus violaceis Hort. Blés. cūMentha sylvestr. longioribus,
igrioribus & minùs incanis foliis. CBP.
panula hirsuta folio angusto tenuiter serrato, floribus parvis spicatis. fortè Trachelium altissim. hirsutum, asperius, foliis angustis, floribus parvis. IB.
mpanula minor hirsuta Drabæ folio. cūCampanula Drabæ minoris folio CBP.
mpanula hirsuta Bellidis folio. fortè Trachelium parvum folio Bellidis subrotundo Raÿ. Cat. Stirp. Exter.
mpanula Alpina asperior. foliis Echÿ, flore magno villoso. Rapunculus (fortè) montanus foliis Anchusæ Moris. Hist. Pl.
part. 2. Rapunculus montanus 1. Trachelium montan. IB. tom. 2. fortè etiam Campanula minor foliis Succisæ flore magno Raÿ.
ppa arbor ex Curaçavia PBP. inter exsiccatas in Americâ collectas inscriptione Sideroxyli aliquandò conspeximus. Hort. Reg. Hamp. alumna.

TAB. CLIV.



CLIV.

Cirsium alpinum Carlinæ vulgaris folio, caule alato, spinis rigidioribus armatis. an Carduus dictus Cirsium folio laciniato nigreus,

idem cum Asphodeli radicibus bulbosis B. tom. 3. hujus exemplarinos ditavit D.r Sherard.

Cirsium maxim. profundè laciniatum in folior. ambitus spinis mollibus hirtum. an Carduus pratensis folijs tenuibus laciniatis CBP.

Eryithales Plinij. Hist. Lugd. nostri tamen flos non luteus est, sed purpureus.

Cirsium minus, Cambro britannicum floribus pluribus sessilibus summo caule Coaggestis. Cirsium humile, montanum, Cynoglossi folio

polyanthemum. Rajj. Synops. 53. an Carduus mollis folio Carpathi. Clus. Hist.

Cirsium minus, angustifol. capitulis pluribus amplioribus sparsis. in Madera sponte.

Carduus tomentosus Acanthium dictus Arabicus. Hort. Oxon.

Carlina Chrysanthemos, Africana humilis ex Codice Compton. fortè Carlina Chrysanthemoide: flore luteo Capit. Bon. Spe. Breyn. Prod. 2.

TAB. CLV.

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 3

Fig: 2

Fig: 1

J. Gibelin sculps:

…phyllus aromaticus Ind. Or. fructu clavato, monopyrene. Caryophylli aromatici fructu oblongo C B P. Caryophylli Indici I B. tom. 1. Think a Moluc-
…uum Pis. & Mant. Arom. hujus fructus maturus & tumidus Medicis & Pharmacopolis Antophyllus nuncupatur, qui in Arbore remanens in sequente anno, ponte cadit, &c. lanquiescente licet di aromatica, in pretio habetur, et loco seminis Plantationi dicatur; et lunæ Matrum fructuum vulgo appellatur.
…phyllus aromaticus Americanus folio & fructu oblongo, polypyrene, acinis angulosis Uvarum binacæis similibus, forte Aubuiba-thirt
…silem Pison. Laurus odorata Lidonis. Sweet-Bay Barbadensibus dicta.
…ph. aromatici Ind. Occid. folijs & fructu Potentillæ dipyrenis semenibus ferè orbiculatis planis. Caryophyllon Plinij C B P. Amomum quorundam
…e Caryophylli I B. tom. 2. Amomum aliud quorund. & Caryophyllon Plinij. Clusio suspicatum Pack. Lobel. ic. 1. Hyp. Tavasin Fr. Hernand. p. 30. Hyp.
…atum Tamdiosmis e Nostratibus. Raij Hist. Amenta de Chaya Hispanis Fr. Redi Exp. Nat. 168. Caryophylli folio et fructu rotundo Breyn. Prod. 2. Alypice Barbadensibus.
…ph. aromat. Americ. Cajuri aliquantulum folijs, fructu ovi figulari. Myrtus arborea folijs Laurinis aromatica. D.ni Sloane: forte Caiperyba Pis.
…urus Mechoacanensis Fr. Hernand. 93. Amenta & Jamaica Pepper-Nostratibus nuncupata: hanc autem ab Icone Lobeliana apud
…rac. Philosoph. exhibita depingi nos curavimus, ut ob oculos exposita diversitas facilius dijudicetur.
…plus Regius.

TAB. CLVI.

CLVI.
Virginiana florescens. Fagus florescens Virginiana Carpini folijs: Hort. Bedum. ex seminib: ā D. Banist. 2 Virgin. trans miss. in Hort. Camp. aspiss. *prouent.
Castanea Americana foliis ex viridi parte, argentea lanuginebillosis. ām Caucoma Park. 1638. Castanea Novæ Angliæ Mus. Soc. Reg. à Castaneâ pumilâ
racemo: o fructu parvo, in singulis capsulis echinatis unico D. Banist. the Chinquapin-bush. Virginem ibi nostrâ sententiâ plurimum differt.
Arachidea arbor pilulifera, fructu tuberculis inæquali, ex granulis conformibus; in orbem glomerato, non capsularis, forte Ytz. amátl. s. Papyrus
novacularis Nieremb. cap. 360. forte etiam Gácuma arbor ejusd. 295.
Arachidea foliis arboris folio, capsulari fructu cornaceo, parvo, ex bivalvi, compresso, quinq; seriatim dispositis granulis Fructum similibus, referto.
forte Amatequiltl. s. Ulmo papyracea. Nieremb. cap. 360. Barbadensibus Bastard-Cedar (ie) Cedrus spuria bulgo mercantibus.



CLVII.
[C]edrus Barbadensium alatis Fraxini foliis, ō. crenatis, fructu singulari, quinis involucris crassis, validis, cochleato-cavis, totidem semina membranis
adnexa, et Columnæ canaliculatæ, pentagonæ, prægrandi adnata, occludentibus, ornato.
Conchramidea arbor Saxis adnascens, obrotundo, pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capsulas, granula Ficulnea, Stylo Columnari, hexagono, prædito,
adhærentia, continentes, diviso, Balsamum fundens. an Ribahaya, quæ Saxorum Scissuris nascitur Nieremberg. 306. forte Amaxtli ... s. Papyrus Indica, s.
Tepeamatl, Sycomorus Saxatilis Mexicensium Hernand. apud Recch. 87. quæ adhæret Saxis non mediocriter spectando miraculo, (ut ipse loquitur) an
hujus sit Bdellij fructus apud. Lob. Icon. part. 2. Balsam Apple (ie) Malo balsamum Barbadensibus vulgò. in Hortum Regium Hampton. curâ
et industriâ Jacobi Reede, hujus arbor bipedalis, cum frustulo petræ cui adnascitur, nuper invectaest.
[G]erani Africana racemoso fructu rubro, ab sin pediculis foliis longioris, et latiori. ex Codice Comptoniano.
[...]eras. Americ. Myrti conjugatis fol. fructu acerbo ... ex Cod. Curassav. fructu ... Indigenis Simmerguda Hort. Beaum. Sour Cherry Barbadensibus dicta
[...]eras. Afric. fructu caruleo ex Codice Complon. forte Cambuî Brasiliensis. Myrtus Americana sylvestr. Pison. Cambuí. Pernambucens. arboreus. Jonst.
Dendrograph. Blacke Cherry (ie) Cerasus nigra Barbadensibus dicta.
Ceraso affinis C.B.P. Mahaleb Matthioli. Hist. Lugd. et Aliorum.

TAB. CLVIII.



CLVIII.

Arbor Americana rugosis foliis fructu viscoso. an Copalxochitl Tepeacensium de Laetio. Ind. Occid. lib. 5. Copalxochotl, s. Arbor gummosa Pruniformis Hernand. lib. 3. Barbadensibus Clammy-Cherry dicatur

Arbor Africana fol. plerung. in summo sinuatis; fructu rubro, ex Codice Compton iano.

Arbor Afric. fructu rubro multiplici, folio longiori angusto. fortè Cambui Pernambucens. frutescens Jonst. Dendr. 243. item Copalin Mexicensibus s. Cerasus dulcis Indica Nieremberg. quoad Iconem 344.

Arbor racemosa foliis Amygdalini Americana. Copalin Nieremberg. quoad Descript. 344. Copalin s. Cerasus dulcis Indica Hernand. pag. 95. Cluster-Cherry Barbadensibus dicta.

Cerasus Africana, fructu rubro, simplici, folio breviore, monococcos. ex Codice Compton iano.

Arbuscula minima serpens Americana. in Horto Reg. Hampton. collegimus.

TAB. CLIX.



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

S: Gribelin Sculps:

CLIX.

Christopheriana Americ. Malabathri foliis acuminatis, nervosis, dentata, forte Caaphiyayo Rheed. p. 227. forte etiam Manna Brasilions. Marcgr. nostratibus folia subtus virentia, glabra. à Coll. Arboris similitudine ut suspicor. Nettle-Tree Barbadensibus nostratibus nuncupatur.

Chrysanth. Americanum Heleny Indicum max. folio & flore. Flos solis perennis. Helenium Indic. flore & semine maximis, perenne. Hort. Acad. Lugd.

Chrysanth. Virginianum, caule alato ramosius flore minore.

Chrysanth. Maderaspatanum latifolium Scabiosæ capitulis parvis. à D. du Bois habui.

Chrysanth. Virginian. datuis angustifolium, caule hirsuto viridi. arbuscam quorundam; s. Helenium Canadense altissim. H.R.P.

TAB. CLX

CLX.

Chrysanth. frutescens, Chrochryson dictum, foliis molliorib⁹ odoratum; Chrochryson foliis Abrotani. CBP. Helichrysum quorund. foliis Abrotani.

IB. Chrochryson, s. Coma aurea Ger. emac. 645.

Chrysanth. Persicum Abrotani semine foliis, umbellatum Helichrysum Abrotani fem. foliis P. Bocc. 4. Abrotanum fem. verum Dioscoridi. Zanon.

Chrysanth. Americ. Ciceris folio glabro flore Bellidis majoris PBP. 323.

Chrysanth. African. ad radicem Umbelliferarum more, comosum. in Mexicanibus. Hernand. p. 33. è Codice Complutano.

Chrysanth. parvum ramosissimum, membranaceo caule Maderaspatense. à D. du Bois.

Chrysanth. Maderaspatanum, Oxyacantha foliis, carnis, ad marginem spinosis, calyce argenteo. à D. dubois communicata est.

Chamæmum sylvestre Barbadensium. Arbor baccifera fructu calyculato, tetrapyrene, foliis oliveri.

Fig: 2

Fig: 3



Fig: 4

Fig: 5



Fig: 7

S: Gribelin Sculps:

CLXI.

Chrysanth. Americanum frutescens Balsamina latra foliis, nigris maculis punctatis. Chrysanth. Curassavicu frutescens foliis Hyperici nigris punctis notatis. PBP.

Rhus Chamaerhodo dentibus, s. Cedum Orientale Napifolium dentibus foliis breviori bus ferrugineis, molli lanugine, villosis. an Datura a Indica foliis Malabathri.

Breyn. Cent. Stramonia s. Datura Cistoides frutescens hirsuta major. Indica quae d. Prodr. 2. sortis Katou-Kadalé Hort. Malab. Part. 4. Zeylanensibus

Ka-moy. et Mahabotha a Cingalensibus dicta. ā Cl. viro Dᵒ Tancredo Robinsono. habui.

Rhus sempervirens, Cauri folia, floribus elegantèr bullatis Virginiana. D. Banister.

Rhus Virginiana sphære, & cobre Periclymeni. D. Banister. Qui ultrama, propriâ manu, accuratissimè ad vivum delineavit, & Nobilissimum Patronum,

Episcopum Londinens. in Angliam transmisit, cujus favore Nos obtinuimus.

Rhus coriifolium Americ. alterum foliis ad marginem dentatis. ab honesto viro Iacobo Reede, ex Insulâ Barbadensi, in Hort. Reg. Hampt. prater legem anni alicubi est.

TAB. CLXII.

…n.
…har xylon Arbor Americana foliorum bonis latè candicantibus. ex cujus ligno Citharæ v. Panduræ fiunt. fortè Cacopia
…asiliensib. Pison. Lusitanis Pao de Lacra. Fiddlewood Nostratibus Insula Barbados habitantibus dicta.
…har xylon. s. Lirio dendros ἐνυν Arbor Americana materialis triphylla, è cujus ligno Fidicula fiunt. an Tapia
…Mar: gràv. Barbadensibus nostratibus Timber Fiddle-Tree nuncupata.
…yli, s. Avellana folio oblongo & acuminato Frutex Convolvulaceus, caprifolatus, Americanus P. B. P. an Hopwood Barbadensibus dicta.
…matis Peruviana, Digitalis floris folio Fraxini. Paradis. Bala v. Prodr.

TAB. CLXIII.



III.

...tilis triphylla, arborescens; e Madera patalon. forte Tijori-Valli; Hort. Malab. Part. 7. an Colubrina genus triphyllum, Ind. Orient. inter avicularia D. de Bois ex...

...dia mas, inveni.

...i; Myrsinites, amplioribus foliis; Americana forte Tety-pote-iba Brasilien; bitis arbustiva Pis. an. p. 250. an Tepabaila Capitzxochitl, Mexicanis; Serpyllum Verum ali...

...ibi: novum genus. Cucumeribus foliis, Virginianum. Planta peculiaris pappescens, non lactescens Banisteri.

...dium Graecum, Pulegij odore, &c. Horto Patavino. HRP. radicis autem (meâ sententia) Calaminthae Clinopodij Austriaci, foliis, odore Pulegij, sub priori tamen titulo, notis...

...munivit D. Sherard, qui in Horto Triumfetti, apud Bononienses, collegit. an Calaminth. Cattaria humilis, Polij folio, Pulegij odore PBP. append.

...odium Alpinum, hirsutum. CBP. item Teucrium Alpinum, comâ pulpureo-caeruleâ. ejusd. CBP. Chamaedri Vulgaris subspecies elegantissima affinis; Alpina, &c. Clus...

...dium Alpin. Pona IB. tom. 3.

...odium Pulegij Cervino folijs; Madera patalanum, Verticillis parvis, caulem per interualla arcte cinctis.



CLXIV.
Pallus minor. Indiæ Orientalis. apud Exsiccatas du Boisianas invenimus.
Lapodium Hyssopi latioribus foliis. Madera atp alarum.
apodium angustifolium, non ramosum, flore caruleo, labio trifido, ab oppurpureis maculis notato. ex Virginiâ D. Banister.
apodium fistulosum purpureum. Ind. Occid. summo caule floridum.
Lutea exotica angustifolia, floribus lutis, averså parte, elegantèr punctatis. ex Cod. Bentingiano.



Fig:1

Fig:2

Fig:3

Fig:4

Fig:5

Glina Iavanica foliis oblongis Parad. Bat. Prodr. Hamptonia in Plantarum rarissimum dilectissimo Horto Regio collegimus

Colutea Seiban. Æ. gyptiaca foliis accedens Maderaspatana.

Colutea Veraerussis besicaria Par. Bat. Pr. in Horto Regis nostri longè celeberrimo Hamptoniensi Observavimus:

Colutea minima species dispermos ex Indiâ Orientali.

Colutea siliquosa Maderaspatana ad nodos caulium siliquis bigemellis. fortè Colutea foliis Anil. nominatum I B. t. 2. pro adeptâ hujus ut

ad succedentium notitiâ, Rei Herbaria cultores unà mecum Spectatiss. viro. D. Carolo du Bois summas debent gratias, utpote qui has quatuor

elegantiss. Colutearum species simul cum plurimis alijs vesicatis; quarum copiâ ejusdem humanitate nos quidem potiti sumus, præ-

terito anno primùm in Europam deferri curavit.



Tab. CLXVI.

1. Colutea siliquosa glabra ternis quinisve foliis, Madera spatana, semine rubello. an Ustacpalli 9. Teren. apud Recch. 451.
2. Colutea enneaphyllos Coloides Ind. Orientalis siliculis conglomeratis.
3. Colutea siliquosa enneaphyllos Ind. Orient. siliquis & foliis aversâ parte pubescentibus.
4. Convolvulus monococcos Virginianus D. Banist.
5. Convolv. Madera sp. purpur. Viola Martia foliis, floribus plurimis simul junctis.
6. Convolv. Madera spatanus billorus, quinquefidis foliis, capitulis Scabiosæ quodammodò mentientibus. an Convolv. Zeylanicus billorus pentaphyllus et hexaphyllus minor Hort. Acad. Lugd. Bat. 187.

TAB. CLXVII.

Tab. CLXVII.

1. Convolvulus Americanus Vulgaris folio, capsulis triquetris, numerosis ex uno puncto longis petiolis propendentibus, semine lanugine ferrugineâ villoso. fortè Fructus 3. Simon Tovar. Clus. ex ot. (ie) Buenas noches Hispanorum. ejusd. hujus Convolvuli species est fructus major e. Mock-Climber Barbadensibus nostratibus dictus.

2. Convolv. cæruL Myosotis Indicus erectus Passerinæ minoris folio ramosissimus.

3. Convolvuli (fortè) Species Platani Occidentalis folio Prom. Bon. Sp. ad D. Patricio Adair. communicata.

4. Convolo. Jamaicensis tribobatus foliis tomento ad lanugine densiori et lanissimâ, ac Velluti. adinstar utrinq; obductis, flore peramoenè purpureo.

5. Convolvulus minimus procumbens Acetosellæ foliolis, barbulis ad virium quaternis, summo apice tricuspidatis.

6. Convolvulus quinquefolius glaber Americanus, in Hort. Complonidan. ex seminibus natus.



CLXVIII.

Compra major capitata, seu globosa. Paul. Boccon. p. 14.

Compra Sicula, annua, lutea, foliis atroviridibus, caule rubente. Boccon. p. 62. Comp. caulibus rubentibus, tenuiorribus, flore luteo, multo. Botan. Mons p. 77.

Coralllina muscosa, s. Muscus marinus tenui capillo Sperinophoros. ad maritimas nostras inventi. D. Iacobus Petiver. & amicè nobis communicavit.

Coralllina geniculata, mollis, Americana, sequentis latior & compressis. ex Insulâ Jamaicensi.

Cord: Indi folio, & facie, frutescens, Portoricensis. PBP. Siliquosiarum est dè genere, ut audio.

Cord: Indi folio, et facie, frutescens, Curassavica, latifolia. PBP.

TAB. CLXIX.

...rum lignum. PBP. Glycyrrhiza, vel Glycyrrhizæ affinis arbor erescens Americana, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato, siliquâ latissimâ. Brit. Prod. 2

...drum minus testiculatum. CBP. Coriandrum minus odorum. IB. tom. 3.

...us Americana sylvestris, Domesticæ similis, baccâ cærulei coloris elegantissimâ. Amomum Novæ Angliæ quorundam.

...mum maritimum Eryngij capitulis foliis ex uno pediculo multis. Githmus sativa, Asperagus Gallicus, Tabernæmont. Githmi species.

...Matthiol. Hist. Lugd. ex Oris Mediterraneis, à Dno. Fishwicke ad nos transmissa est.

...laria Benghalensis, foliis Genistæ subhirsutis. PBP. Kalou-Tandale-Cotti. Hort. Malab. P. 9.

...laria hirsuta, minor, Americana, herbacea, caule ad numerum sagittato. Hort. Acad. Lugd.

...laria Americ. triphylla, foliis sirmioribus, glabris, frutescens, flore purpureo. an Crotalaria Americana trifoliata, rotunda, glabra. PBP.

TAB. CLXX.



CLXX.
Cucumis Mader aspatensis fructu minimo. alter hæc una ex Plantis siccis humanitate D.ni Caroli du Bois. communicata.
Cucumis sylvestr. Americ. Anguriæ folio, fructu Ovi figura, & magnitudine, ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis, Momordicæ instar muricato.
Cucumis quarervoba, s. Cucumer Asininus. Pison. 264. in Hort. Comptonian. ex seminibus natum invenimus.
Arbor bitifera arbor spinosa, fructu mali aurei facie, aromatica, Barbadensibus, à similitudine fructus sitius Ind. Orient. suavissimi, Mangostanas dicti.
Mangosfor bi & Algate nuncupatur. in Chirogr. Thevet. lib. tom. 2. forte etiam Arbor fructum Melonis facie proferens. quis d. lib. in Calaba, sive D. Rochfortii.
Arbor bifera a trifolia, spinosa. Indica, fructus pulpâ Cydonij æmula. Raij. Hist. Plant. tom. 2. Covalam Hort. Malab. P. 3. Cydonia ex etica CBP. Malum Cydonium indicum Bontij. Belis s. Serifola Bengalensium. Cydonia eorundem Garciæ Clus. in Not. ad Arom. Hist. lib. 2. c. 24. Cydonium Bengalæ Acostæ
Mala Cotonea, s. Marmelacta, ex quo fructus quem Capobos, s. Chicos tapetes nominant. Part. 9. Ind. Occid. lib. 4.



...bifera arbor Americana, foliis longo, mucronato, fructu orbiculari, grandis cordiformibus, pulpâ nigrâ, intus lutea. Arbor Cucurbitifera, folio longo, mucronato, 1.
...rine Raij. Hist. Pl. Laurifolia Guianensis. CBP. Arbor foliis Lauri, fructu Cucurbitæ ex Guinea. IB. lib. 1. Arbor peregrina ex Guinea Clus. exot. item Macopovr Virginis.
...uam forte quod. Clusij. Fructus Orbicularis, grandis Cordis effigie. CBP. 434. hic item gratia Tampappayma Brasilianorum. Clus. exot. Tampa. D. Rochefort. usurpat. Theveto.
...bifera arbor, rubro tund. foliis conforti, fructu Ovali, seminibus cordatis, massulâ nigrâ, arctatis, Americana Arbor Cucurbitifera Americana, foliis rubro tundis
Raij. Hist. Laurifolia Americana pomis Capitis magnitudine CBP. item Arbor Indica fructu Cucurbitæ formâ & Sapore eiusdem. forte idem Ficus Nigritarum
...ilis, fructu magno Malorni pari, quod. CBP. Cujetes Marcgrav. & Pison. vulgò corrupte Cochine. lib. 4. Chayne Americana, capsulis litteris non malè similes.
...ne quadrare Clusio videbatur, - Higüeros Oviedi ejusd. IB. Cohyne Hieronymi 320. Cohyne Americana. Theod. Tres, (ie) Arbor Dai. Park. cujus fructum Morales & Lemery
...foliis appellat: vel Clus. in Not. ad Garciæ Arom. Hist. lib. 2. cap. 11. ad quam ibidem quam proximè accedit & ego eandem refero, Arbor Laurifolia, fabaceum ferens, de Laet. Ind. Occid. lib. 17.
...Malabaricæ accedens, Arbor Laurinis foliis, Maderaspatana.
...mi (forte) prima species, 1. Carirri-Laurini Hort. Malab. P. 2. à Maderaspaten.
...ini species Maderaspatana, capsulis in vesicam, Dictamni Græcis foliis, villosa. Ultramq; nos à D. du Bois impetravimus.

TAB CLXXII



CLXXII.

Cucumis Indic, striatus, operculo donatus, cortiroso putamine tectus. an Picinna Hort. Malab. P. 8. Cucumis sylvestr. Malabaric. fructu striato amaro Comb. in Not. ex seminibus in Horto Comptoniano, successit praeterito anno.

Solanum fuscatum baccifer a Barbadensium. à maritimis. fortè Acatsja-valli Hort. Malab. P. 7.

Cynoglossum procumbens, glaucophyllon, maritimum, nostras, floribus purpureo-caeruleis, semine laevi. Echium marinum Phytolog. Britan. Raij. Hist. Bogbs -sium dulce, ex Insulis Canariis Park. an Cynoglossum African. Myrtifolium Breyn. Fascic. fortè etiam Cynoglossum marinum Hort. Malab. à Turre.

Cynophallophoros, s. Penis Caninus. Cheiri arborei, Arborescentis subrotundis, rugosis, clavos pulviferos phalloides, prosiliquis gerens. Dog pricks Barbadoes dicta.

Eadem mucronatis foliis, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis.

Cynoxylum Americanum, folio crassiusculo molli & tenaci. fortè Mangaiba genus Americanum. an Kada-Kandel. Hort. Malabaric. Part. 6.

Cynoglossum nigrum Americanum. nostratibus black dogwood bocatè.

CLXXIII.

Daucus montanus Pimpinellæ Saxifragæ hirsutæ folio nostras Dubrienses. an Apium petræum s. montanum album? IB. tom. 3. Daucus montanus Apii folio minor CBP. vix prod. satis.

Daucus Pyrenaicus tenuifolius, foliis Citri odore lucidis Dod. Fagon. Schol. Botan. à Dn. Sherard accepi.

Ebolium s. Adhatoda Zeylanens. Mus. Zeyl. Hort. Acad. Lugd. app. Wamapala Malabarorum.

Echinophora Maderaspatana, Sideritidis non serratis, nervosis foliis, fructu capsulari, Caucalidis cæmulo. hujus fortè sunt genera Codivoli apud Hort. Malab. P. 10. Tab. 8. & 9. ut et Tab. 59. Ingeniosiss. vir. Dn. des Bois. nobis communicavit.

Elæagnus Orientalis arbor. PBP. ex sententia D.ni Sherard fortè Sarabi Mauror. Rawolfii Hist. Lugd. append. Garb Arabicæ Dodonæi. Salix Arabica foliis Atriplicis CBP. Horti Reg. Harript. alterna.

Helichrysum latifol. villosum alato caule, odoratissimum cujus autem est hæc elegans Helichrysi species, nobis nondum innotuit in Hort. Reg. Harript. præterito anno florentem.

invenimus.

TAB. CLXXIV

CLXXIV.

Phalangio affricto Africana arborescit. floribus purpureo-violaceis, Salviæ foliis, odore Rosmarini H. Ac. Lugd. Comp. 2 Asr. arborescit. Salicis caprææfolijs, odore Rosmarini. Pr. 2.

Liliomerum Zeylan. Alsines medijs folio, procumbens Parad. Bat. Prod.

Phalangoides Madera aspalathi minimum, secundum caulem quasi ex utriculis floridum, huic fortè spectat Asir-pullu Hort. Mal. P. 10.

Phalangoides Virginiana major erectum. Pseudo-phalangium ramosum majus erectum. D. Banist. Cat. Slirp. Virg.

Phalangoid. Virginianum floralis Arbutei bullatis aureis in spicam dispositis. Phalangium spicatum flosculo Arbuteo, bullato, aureo. D. Banister.

Phalangoides erectum, foliis Ericaceis, bulbosum, flore flavescente. Cap. Bon. Spec. ex Codice Comptoniano.

Asphodelo-narcissi flore. Africanum ex Codice Comptoniano. Huic plurimum accedit Anna Ouero Ana Varuca Zanon. Islor. Bot. nostra tamen caprolis dent: Banister.

TAB. CLXXV.

Fig. 2

Fig. 6

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

TAB. CLXXV.

1. Cruciata. Rosmarini fol. Unedonis flore. capitulis Cistride. Lecken palustre nostras Arbuti flore Ray. Synop. Stirp. Brit. Rosmarinum syl. minus nostras Park. Vitis Idaea affinis Polifolia montana IB. tom. 1.

2. Erica tenuifolia flosculis racemosis pendulis Prom. Bon. Sp. an Mustelack-Peho ectli Nov. Hispan. Tes ecli apud Recch. 386. quae primo ad amicissimum virum D. Patricium Adair deinde a Doctissimo nobis communicata et

3. Cruciata Hort. Malab. P. 2. Apocynum latifol. Aegyptium minus erectum, floribus magnis pallide violaceis. PBP. Bridelia or Alpini s. Apocyn. Syriac. IB. tom. 2. Capathum Aegyptiacum lactesc. siliqua Asclepiad. CBP. ad Apocynum relegatur.

4. Eryngium Americanum Yuccae folio, spinis adoratis molliusculis. Eryng. campestr. Yuccae foliis, spinis tenellis hinc inde mar ginib; appositis D. Banist. Cat. Stirp. Virg. an Ocopiatzli Mexicens. s. Scorpij spina Hernandi p. 222.

5. Erythroxylum American Hydrolapathi foliis, ramulis pyramidalis filamentis corticeincluses, nucleo hypericolore praeditum, foris Brasilio simile Lignum Vernambock Germanis dictum. Redwood Barbadensibus vulgo. Ubrifera arbor Orientalis folio longo PBP. haec valde similis est, si non idem.

6. Cichar ocephalum s. Lignum spicatum Americanum, quod in locis extremis maxime viridetum, cui fructus Pyriformes octoni striati, Oxyacanthae Virginianae magnitudine per maturitatem lignescens. an Lignum ferreum Indicum praebens Clus. exot. l. 1. c. 8. Fire-Sprigg Barbadensibus dictum.

TAB. CLXXVI.

CLXXVI.

Lauxylon, s. Lignum odoratum American. folio amplo, subrotunde profunde denteo fructu glandiformi Berckii instar, nullo calyce donato. Santali forte genus, aut Agallochi Barbadensibus nostratib; Sweetwood nuncupatur. cujus folia à Guajeri Brasilensium Marcgr. haud multum abludunt.

Lauxylum Americanum folio magis mucronato; Samborana forte Malabarica Garcide apud Rajum. Hist. 1804. Sweet-smelling-Wood tie

Lignum odore fragrans, Barbadensibus dictum.

Euonymo affinis Æthiopica semper virens, fructu globoso scabro, foliis Salicis rigidis, serratis Hort. Lugd. Laurus non odorata fructu globoso.

Africana, Stavbeck. Citriculi Lauro serratæ odoratæ Stapeliæ similis inodora. Capitis Bonæ Spei. Breyn. Prodr. 1.

Euonymus; Margaritifera pentaceros Americana. Margaritifera arbor Surinamensis. PBP.

Fig: 5

TAB. CLXXVII.

CLXXVII.

Eupatoria Conyzoides, integro Tussilaginis folio molli & incano. Ind. Or. forte Tussilaginis Serratulæ affinis Breyn. Prodr. 1.

Eupatoria Conyzoid. Maderaspatanæ foliis glabris summo caule ramosiori. in Mari-patiæ Hort. Mal. Part. 10. Conyzæ Malabaricæ Camij folio, flore purpureo. Comelin. in Not.

Eupatoria Conyzoides folio molli & incano, capitulis magnis, Americana. Arch-angel. Barbadensibus dicta.

Eupatorio affinis Americana bulbosa, floribus stellatis, calycibus, contectis. Huic in capitulis saltem per similis ex hibetur, in Hist. Mexic. Recch. sub nomine Xaxaro ut videris pag. 196. Planta pappescens non lactescens Virginiana D. Banister.

Euphrasia annua foliis tricuspidatis, foliis flore albo & purpureo. in Euphragia Cinisbia Fab. Columna. ephras. Part. 2. p. 68. Euphrasia foliis Cimi angustioribus, C.B.P.

Euphrasia perennis Satoreæ foliis scabris, è Maderaspatan. in Euphrasia frutescens Coridis foliis flore albo spicato. Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.

Lagebiticum de lubile majus Virginianum. Convolvulus niger Virginianus major Hort. Oxon.

TAB CLXXVIII



Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Tab. CLXXVIII.

1. Ficus Americana, latiori folio denso & Curaçao. in Ficus arbor Barbadensium Ligonis pag. 69. Tijabala (forte) Horti Mal. Part 3. in Hort. Regio. Hampt. Observavimus.

2. Ficus Malabarens. folio cuspidato, fructu rotundo, parvo, gemino. D. Syen. Arcala Hort. Malab. Pi. Gingalensibus Bogah. est 3 ex religione ipsorum, hanc arborem adorare, quamobrem ab Fructi Christiani, Arbor Diaboli, nominatur.

3. Ficus Indica Tuba folio, subtus albo, & villoso, polyrhizos, i. filamentis è summis ramis ad terram missis, radicosa, à Plinio. Theophrasto. et Strabone. descripta. Ficus Indica Clus. exot. Ficus Indica foliis Malo Cotonea similibus, fructu ficubus simili. in Goa. C B P. in Ficus arboreis. Bengalensis folio subrotundo, fructu orbiculato. Pi. al Bengalensibus. Hort. Bodum. Broad-leafed Mangrove, Barbadensibus nostratibus, dicta.

4. Ficus arbor Americana, Arbuti folijs, non serrata, fructu Rosa magnitudine, funiculis à ramis ad terram demissis prolifera. forte Ficus arborescens, Africana Arbuti folijs non serratis. Hort. Bodum. in Katou-abu Hort. Malab. P. 3. quæ ipsissimam Ficum Indicam Clusij facit Celeberrim. Cornelius, in Not. nostræ tamen folia, omnino sunt glabra, inferne quidem albicantia, non lanuginosa. Beard-ed-Fig-Tree, (sic) Ficus barbata Barbadensibus vocata.

TAB. CLXXIX.

...Africana maxima Polypodij facie PBP. sorti etiam Filic. African. lobis profundè incisis & mucronatis, ejus d. PBP. inter Addenda, primùm in Hort. Reg. Hampt. Observavim...
...ma, Vulgari similis, pinnulis amplioribus, planis, nec crenatis, Virginiana. Consummatissimus ille Botanic. D. Banister, manu suâ, accuratissimè delineavit, & in...
...plum transmisit, quam Reverendissim. Dom. Episcopi. Londinens. gratiâ accepimus.
...Sexatilis folijs non serratis. CBP. Filix minor non ramosa. IB. t. 3. Filicis genus parvum primum in Montibus Cæsalpin.
...arborea s. Dryopteris Fragi. Hist. Lugd. 225. Filix quarta. CBP. Filicis genus parvum alterum in Montibus Cæsalpini.
...pumila Sexatilis altera. Clusij. Park. Filix non ramosa, nigris maculis punctata. CBP.
...ma non ramosa, pinnulis latis, auriculatis spinosis. Ger. emac.

TAB. CLXXX.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 6.

Fig. 4.

Fig. 5.

XXX.

mas aculeata nostras, alis expansis, musco à lanugine aspersa. an Filix aculeata maj. CBP. Filix Conchitidi affinis IB. forte etiam Filix mas non ramosa,

nuli, lati, densis, minutim dentatis. Ger. emac. 1129.

Africana humilis, spinosa, pinnulis latioribus, minus patula. in Hort. Reg. Hampton. digat.

aculeata Conchitidis amula nostras.

mas non ramosa, pinnulis angustis, rarioribus, profunde dentatis. Ger. emac. 1130.

Saxatilis caule tenui fragili. Ray. Adianthum album folio Filicis. IB. Filicula fontana major s. Adianth. Filicis folio. CBP. Dryopteris candida Dod. Hist. Lugd. 1227.

ula fontana latiori folio, ad imum solummodo ramosa. an Filicula fontana Adianthi facie, latifolia, dentata. Schol. Botanic. pag. 3.

TAB. CLXXXI.



Fig. 2.

Fig. 5



Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

XXXI.

Filicula fontana Rutæ muraria facie, tenerifolia. an Filicula fontana minor. CBP.

Filix mas ramosa, pinnulis dentatis. Ger. emac. 1129.

Filix exotica, prælongis, & angustis ramulis, denticulata.

Filix Virginiana non dentata, florida, foliis alternis, & in summo caule, seminibus occultatis.

Filix Africana, floridæ similis, in ambitu foliorum, argutè denticulata. an Filix Africana, vel Monomotapensis, ramosa, semina. Hort. Beaumont. pag. 21. ab amico nostro, D. Patricio Adaire. communicata est.

TAB. CLXXXII.

CLXXXII.

Filix sexatilis ramosa maritima nostr. a. Raij. Hist. Pl. 151. Filix Orubia ramosa PBP. app. in Hort. Reg. Hampton.

Filix sexatilis ramosa major. ex Horto Patavino inter Collectanea sua, ostendit nobis, Cl. Vir. D. D. More, annis & Scientiâ gravis.

Filix Acaciæ Corniger a foliis peregrina nobis communicavit. amicus noster integerrimus, Dn. Tancred Robinson.

Fraxinus Alpensis. Hort. Acad. Lugd. Fraxinus (forte) rotundiore folio. CBP. Ornus Galli Pressani, lib. de re rustica.

Frutex Guineensis, Zyzyphi foliis, leviter serratis, & odoratis. Hort. Beaumont. pag. 22.

Fucus s. Alga viridis capillaceo folio. CBP. rectius autem Conferva marina, s. Museus marinus, bir en is tenuifolius.

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 6

CLXXXIII.

Frutex Africanus ambram spirans, in Hort. Comploniano. ex seminibus oritur, & in Codice Comploniano depingitur.

Frutex Maderaspalan. Hyperici frutescentis facie, cortice cinereo. an Frutex Guineensis Hyperici arborescentis dicti foliis majoribus. Hort. Beaumont. 22.

Frutex baccifer Pruniferus, non serratus, è Maderaspatan.

Suffruticulus capsularis, hexapetalos, Cassiæ Betularum foliis, è Maderaspatan. Frutex baccifer foliis Lini vel Cassiæ Baticæ Maderaspatensis, nostr. Phytograph. t. 2. Tab. 31. an Evonymo affinis, alatis foliis, alternis, pericarpio in Sex loculamenta diviso.

Frutex foliis brevioribus subrotundis, & densius stipatis. in Hort. Reg. Hamptonc. è semine natus. forsit Kirganeli. H. M. P. 10.

Frutex brevioribus foliis & angustis. ex Plantis siccis du Boisianis hos Fruticulos excerpsimus. an Tjeru-Kirganeli. H. M. P. 10.

TAB. CLXXXIV.



Tab. CLXXXIV.

Fig. 1. Frutex Capparis facies, spinosus, foliis parvis acacium referentibus; forte Arbor spinosa ex Java, unde Cale. s. Cycium exprimitur. Bontij. Hist. Plant. Copal-quauhtic ab Mexicensibus. Rzch. 247. an Vty Brasilianis Arbor. Marcgr.

2. Fucus trichoides noster, aureicoloris, ramulorum apicibus furcati. an Coralloides tenuifolia, obsequiosa, minima. IB.

3. Fucus fruticosus, teres, setam pisca bria am referens. Longissimus.

4. Fungus arboreus Virginianus, plabyceros, parvus. D. Banister.

5. Fungus pulverulentus, Virginianus, cauda e Cori allino, tapetis operose contorta. D. Banister.

6. Fungus phalloides, parvus. Penis caninus Virginiae. D. Banister.

7. Fungus pulverulentus, granulatus, Virginiensis. D. Banister.

8. Fungus pulverulentus, Pyriformis, fuscus, spongiosus, ex Virginia. D. Banister.

9. Fungus campaniformis, niger, parvus, multa semina plana in se continens. Dni Morrel. Pinax. Fungus minimus ἐν ἀγρῷ μυκὸς. Clus. Fungus minimus, hyemis tabulis arcularum hortorum adnascens. CBP. Fungi Calyciformes, seminiferi. Mentz. el. hujus Gabinodinem Celeberrimi; ille Botanicus D. Banister de Virginia transmisit.

10. Fungus Virginianus barbatus, fetidus. D. Banister.

CLXXXV.

Ostruthium, s. Arbor Americana, baccifera, lauteum liquorem, ex ligno fundens; qui durat, instar Gummi exudat. in Mauritiana arbor. de Cast. Milk-wood Barbadensibus.

Ilicibus arborescens, Styracis folio major; flore caerulo. Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. Grossularia arbor Africa, Styracis folio molli incano, flore caerulo. Amm.

Char act. Pl. Arbor siliquosa. Africana, Genistae semine. Bartholin. Act. Hafn. Anno 1673. Obs. 133. Hort. Comptoniani, insigne constat Ornamentum.

Genista similis; Frutex foliis cariis (triphyllis) PBP. in Hort. Reg. Hamptoniens. colitur.

Genista Oleastri Germanici, foliis singularibus, Madera patavina.

Genista Capensis, spinosa, Ligustri folia, quinquephyllos, floribus spicatis, rubricā Cl. D. Patricio Adair accepi.

Genisto-Spartium, baccifera, Ericae foliis, Africanum. ex Codice. Comptoniano.





Tab. CLXXXVI.

1. Gentiana major, Virginiana, floribus amplis, Ochroleucis.
2. Gentianella Ultrajectina, Indica, impatiens, foliis Ageratis; hujus caput radix aquâ abigendis immersa, cum ut plurimi dissolvunt, & tamen maturum, excitando vibrant. V. in Oratio nominis, Snap-grasse Barbadensibus vulgò.
3. Geranium argenteum, Alpinum. CBP. Geran. argenteum, Mordis Baldi. IB. Geran. argent. Alpin. longiùs radicatum Pona. Park.
4. Geran. African. tenuifolium, Robertiani dibisuris, flore magno striato, ex Codice Bentingiano.
5. Geran. African. noctuolens, flore rubarrimo, Anemones folio latiore.
6. Geran. Africanum, noctuolens, flore rubro Anemonis folio angustiori. Ultramag. ex Codice Compboniano. transtulimus.

TAB. CLXXXVII

Fig. 6

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

LXXXVII

ranium African. rochuolens; Aquilegiæ folio, flore incarnato rubente. ex Codice Comploniano.

ladiolus Phalangoides Æthiopicus. floribus parvis, flavescentibus. ex Codice Beckingiano. Sisyrinchij (forte) spec. Africana.

ladiolus Phalangoides Æthiopicum (forte Sisyrinchij genus) flore pentapetalo, obsolete coloris. ex Cod. Beckingiano.

ladiolus Africanus angustissimo folio, dibuti pauca puncta cum ex Cod. Comploniano an Gladiolus pumilus Africanus angustissimo folio. PBP.

naphalium latifol. minus, ramosum, capitulis parvis rubentibus Maderaspatan.

naphal. supinum, echinato semine, Lusitanicum. Grisley. Viridar. Lusitan.

naphalio Americano affinis, planta, capitulis conglobatis. Hort. Reg. Paris.

CXXVIII.

...ssypium frutescens annuum foliis trilobatis Barbadense. Gossypium frutescens, semine albo. CBP. Xylon s. Gossypium herbaceum. IB. an Gossypium Brasilianum flore flavo; Amiriqui Indigenis, Algodon Lusitanis. Marcgr.

...ssypium frutescens annuum, folio Vitis amplioris quinquefido, Insula Providentia. an Bombagia arborea ab Pernambuco. Z. anon. p. 40.

...ssypium herbaceum s. Xylon Madraspatense rubicundo flore pentaphyllum. an Cudu-pariti Hort. Malab. P. 2.

...ssypium s. Xylon arbor Orientalis digitatis foliis, laevibus, fructu quinq.-capsulari, alba, & nitenti lanugine farcto. Gossypium Panamense, foliis folio, CBP. Lanifera arbor, s. Gossampinus Plinii. Bonly. Panja Panjala Hort. Malab. P. 5.

...mini folia aquatica, Thlaspeos capituli, rotundi, septo medio, sibi invicem decurrente. a D. Sherard Pruno ambr. ex Hibernia in Anglium, reperrimo nobis transmissa est.

CLXXXIX.

...rum: Xylon arbor Occidentalis, foliis digitatis, per marginem crenatis, fructu conico quinq; capsulari, lanugine leucophæâ, referto.

...pium: Xylon arborem duas vel tres ulnas altam, foliis digitatis, per marginem crenatis, fructu conico quinq; capsulari, lanugine leucophæâ referto, ...

...huius tantum fructus Icon. exhibetur, quem ab Insigni Botanico D. Gulielmo Courtene habuimus.

...ramen paniculatum, foliis brevibus, aculeos mentientibus, Madera aspatanum. forte Arundo graminea, aculeata. B. Alpin. exot.

...gram. miliaceum, latiori folio, Madera aspatanum; apud exsiccatas du Boisianas. Observavimus.

...gram. paniceum minus, spicâ divulsâ, Insulæ Barbadens. Pipiter Grasse. & Pestis Coloni, nostratibus nuncupatur.

...rami, juncoide, glomeratis capitulis, Madera aspatense.

...gram. dactylon Americanum, cruciatum, Barbadense; nostratibus, Dutch-Grasse, dictum: an Gramen Stellatum, Æ. gyptiacum Vesling. in Vlot. ad. Alpin. Gram. Javanicum. cruciatum. Iac. Bonii.

TAB. CXC.



Tab. CXC.

Fig: 1. Gramen dactylon, arenarium, multiplici paniculâ, spiciis brevibus, tormentè canticantibus, ex eodem pedunculo binis. Schoenanthus s. Juncus odoratus. IB. Juncus odoratus aromaticus.

2. Gram. dactylon, maximum, Americanum. Hort. Reg. Par. Gram. dactylon, Indicum, aculeatum, spicâ articulatâ. Ambrosini Phyt. Saccharum perenne, Indic. Zanoni, pag. 181.

3. Gram. amoris, Indiæ Orient. paniculâ sparsâ, glumarum pedibus, huic illud undabim inflectis.

4. Gram. Maderaspatanum, paniculâ spicatâ, longâ, speciosissimâ.

5. Gram. Maderaspatanum, spicâ interruptâ, brakt. e pluribus spiciis parvis villosis, elegantissimè constructâ.

6. Gram. Alopecuroides Maderaspatanum, spica quasi geniculatâ, molli.

7. Gram. hirsutum, Indic. glomeratis capitulis, Cagopi arvalis, glumâ, è squamulis plurimis, purpurascentibus, aristâ unicâ ornatis, compactis.

8. Gram. Capperid. latiori folio, paniculâ ex summitate caulis, Conglomeratâ, Horum plurium, novæ Graminum speciei, Indicarum, ex siccis suis Plantis, elaboratissimis

D. Carolus du Bois. Stirpium rariorum, Collector, & Cultor præstantissimus.

CBP.



.CXCI.
Gram. paniceum, multiplici spicâ, Madera spatarium.
Gr.
Gram. multiplici spicâ, Madera spatarium, Calamo, secundùm longitudinem, aculeis horrido.
Gram. avenaceum, Madera spatarium, paniculâ sparsâ, aristis longioribus, ornata.
Gram. avenaceum, Madera spatarium, locustis rariorib⁹, turgiduli, aristis, brevibus, donatis.
Gram. Secalinum, Tradicum, spicâ, gracili, tomentoso, aristis longioribᵒ, adse invicem intortis.
Gram. Caliacum, majus, spicis in verticillas, multiplicatis, Madera spatarium.
Gram. Cyperoides India Orient. altius, paniculâ sparsâ, pallescente.
Gram. Cyperoides, pumilum, elegans, è Madera spatan.

TAB. CXCII.

Tab. CXCII.

1. Gram. Cyperoides rarius, et tenuius spicatum, è Madera spatan.
2. Gram. Cyperoides Madera spatarum, paniculâ magis sparsâ, & speciosâ.
3. Gramen. Cyperoides, elegans, paniculâ, spicis mollibus compositâ. Madera spatarum.
4. Gram. Cyperoides, Madera spatarum, spicis pluribus, summo caule, in orbem congestis.
5. Gram. Cyperoid. Madera spatarum caule compresso, sparsâ paniculâ Juncei.
6. Gram. Gr
7. Gram. Juncum, minus è Madera spatan; s. Juncus pumilus, capitulis in summitate, aphyllos, plurimorum variorum Graminum genera, ex Plantis
iussi, liberalitate Spectatiss. Viri, & Botanici Celeberr. D. Caroli du Bois. nobis communicatis sunt.

TAB. CXCIII.



CXCIII.

Gratiola Indica minor vera s. Hyssopoides è Madera patan. inter Collectaneas du Boisianas invenimus.

Gratiola affinis Chamædryoides, Madera patensis. ibidem.

Gratiola affinis Madera spatana, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capsulis in verticillas positis.

Guaiava alba acida, fructu rotundo, Ind. Or. Guyabo pomifera Indica C B P. Guaiava Indica, fructu Malifacie I B. tom. 1. Xalcocotl Mexicanis 3. Pomum arenosum Hernand. Araca-Guacu Brasilien. Piso huius alter a species, viz. Guaiava rubra fructu itidem rotundo.

Malacka-Pela Malabarenibus nuncupatur, de qua consulo Hort Malab. P. 3.

Heliotropium Gnaphaloides laterum, frutescens Americanum. Sed Lavender Barbadensibus dictum.

Hippuris muscorum sub aquâ repens in Hibernia, ubi insignis Botanicus, D. Sherard invenit, & Angliam adnos transmisit.

Hippuris exigua fluviatilis, post ea nuda Virginiensis D. Banister. à Musco marino Equiseti formi non ramoso D. Ray. haud multum abludit cujus Icon exhibetur, Phytogr. P. 1. T. 48.

TAB. CXCIV.



TAB. CXCIV.

1 Hieracium Alpinum humile, Doronici facie, Schol. Botanic. pag. 190.

2 Hieracium Alpinum latiore folio pilosum, flore majore. an Hieracium Alpin. latifol. villosum, magno flore. CBP. an Pilosella, 5. Pulmonaria altera angustiori folio, valde pilosa. IB. tom. 2.

3 Hieracium pilosissimum parvo flore non amoene. an Pilosella Syriaca CBP. Pilosella maxima, Syriaca. Lob. Hist. Lugd. sub quo titulo in Herbarijs Viris apud Patavinos compilatis, sapius invenimus. in app.

4 Hieracium latifolium pilosum, coccineum, umbellatum, Indicum. Hort. Acad. Lugd. Pilosella Indica Cornuti. Canadens. Plantar. Hist.

6 Horminum rugoso, verrucoso, folio, cornu Cervinum exprimente. PBP. Horminum Syriacum, Aremonium, folijs Orvalæ, profunde laciniatis. Breyn. Prodr. 2. Horminum rarium, foliis laciniatis. Rawolfij. in Herbario suo.

5 Horminum Arabicum, alatis, foliis, flore rubello. Hort. Oxonien.

7 Hormino accedens, angustissimo folio, glabro, Maderaspatensis. ex Plantis siccis de Bosianis habuimus.

Fig. 5
Tab. CXCV.
1. Hyacinth
2. Hyacinth
3. Hyacinth
4. Hyacinth
5. Hyacinth
6. Hyacinth

Tab. CXCV.

1. Hyacintho affinis; tuberosa radice, Africana, umbella cærulea, inodora. H. Ac. Lugd. 327. in Hort. Reg. Hampt. florui & elegantissimè depingitur in Cod. Bentingiano.
2. Hyacinthus Africanus; foliis Colchici, floribus coccineis, major. ex Codice Bentingiano.
3. Hyacinth. Coccineus, Africanus, minor, flore longo, cornuto ex Codice Bentingiano.
4. Hyacinthus stellatus; spicatus, floribus incarnatis, caule v. folio Orchidis, ex Prom. Bon. Spei. Codic. Comptoniani.
5. Hyacinth. Africanus; Orchioides serpentarius, foliis irregulariter undatis, pilis cilioribus, fimbriatis, floribus ex aureo punicantibus. Codicis Comptoniani.
6. Hyacinthus Africanus; Orchioides, triphyllos, flore croceo, Colchici Fritillarici foliis undatis, capsula inflata. ex Codice Comptoniano.

TAB. CXCVI.



Tab. CXCVI.

fig. 1 Sacculatus, Cichorei foliis, minùs laciniatis, Americana. ex seminibus è Virginia missis, in horto nostro per biennium floruit

2 Jacobæa Africana, frutescens, foliis Abrotani, s. Crithmi minor. PBP. hujus ramulum, à Prom. Bon. Spei. absq. ullis allatum, à Botanico exercitatissimo D. Samuele Doody. accepimus; cujus varietas major, in Hort. Reg. Hampton. nunc colitur.

3 Ilex folia Agrifolij, Americana, fortè Agria, s. Aquifolia Glandifera Anguillar & IB. quale autoris sit, hoc ejus Aquifolium ingenuè fatetur se ignorare Bâuhi ILL.

4 Ilex aculeata, sanguineis baccis, radicibus tuberosis, Americana.

5 Ilex foliis majoribus, leviter aculeatis, è Madera spatâ. fortè Arbuscula Tiliacea fl. Hernand.

6 Jacobæa quriana pumila, s. Chamæiris verna, angustifolia flore purpureo-cæruleo, odorata. D. Bâni sler.

TAB. CXCVII.



Tab. CXCVII.

Fig. 1. Olea aculeata foliis nigris amplissimis; forte Phallodrijs nigra latissimo folio Hist. Lugd. 2. 6. Phallodrys nigra IB. in Horto Comptoniano, successit.

2. Jujuba. s. Zizyphus Zeylanica rotundifolia crenata, minor, foliis subtus lanuginosis, in Hort. Regio Hampton. Observavimus.

3. Jujubes. Zizyphus Africana, mucronatis foliis, spinâ gemellâ. forte Jujube Africana longissimis, & acutissimis spinis horrida. Hort. Beaumont. 25.

4. Juniperus Barbadensis, Cupressi folio, ramulis quadratis. Savin, or Cypresse Tree, nostratibus dicta. ab honesto viro Jacobo Reede, in Insula Barbados collectum, & siccatum nos accepimus.

5. Juniperi foliis Frutex Africanus. PBP. in Hort. Reg. Hampton. conspeximus.

6. Juncus conglomeratus Maderaspatensis, acumine geniculato.

7. Sanctellus Maderaspatensis, capitulis compactioribus, acumine bifido, longiori.

8. Juncus minor Barbadensis. paniculâ compactiore, acumine bifido, brevi.



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

CXCVIII.

Lamium purpureum, fœtidum, folio parvo, acuminato, flore majore. Galeopsis s. Urtica iners, flore purpureo elato, majore, folio non maculato. IB. tom. 3.

an Lamium, folio oblongo, flore rubro Park. 606.

Laserpitium majus, segmentis longioribus & indivisis. fortè Laserpitium angustifolium non sinuatum. Schol. Botan. 167.

Laserpitium lobis angustioribus, & dilutè virentibus, conjugatim positis. Moris. ch. Umbel.

Laserpitium tenuifolium, lobis obscurè virentibus, Laserpitii Lobelij simile, angustifolia IB. tom. 3. Laserpitio Massiliotico simile, angustifolia planta Clusii

an Laser pit. angustifol. semine crispo, D. Fagon. HRP.

Laserpitium lobis angustioribus lucidè & saturatè virentibus, pluriseriam divisis. Laserpitium Gallicum CBP. Laserpitium Massilioticum Lobelij.

Laserpitium è Regione Massilia allatum IB.

Laserpitium lobis angustioribus, longioribus, & dilutè virentibus, pluriseriam divisis. Moris. Umbel. 64. Cl. Hermann. & Sutherlandus noster in suis Catalogis, hanc speciem, pro eadem cum Laserpitio Gallico. s. Massiliotico ponunt. Atipse Moris. in Prælud. clarè pronunciat illam ab hac distingui, quòd folia producit dilutiùs virentia, quam Gallicum, cujus folia sunt lucidè atro-virentia. an Laserpitium Dauricidus, Pluk. Virosi semine Breyn. Cent. 2.

TAB. CXCIX.



CXCIX.

Laserpitium angustiore folio, umbella concavâ, & contractâ. Schol. Botan. 36.

Laurus Madrensis angustifolia pallida, odoratissima, venis foliorum, aversâ parte, magis extantibus.

Laurus America pallidioribus, & latioribus foliis, inodora.

Laurifolia Arbor, foliis supernâ parte, saturatè viridibus, subtùs candore nitentibus, Americana. an Laurifolia arbor Americana PBP. in Mort. Reg. Hamps. inter

Laurifolia Arbor, gravelens, foliis pallidioribus, foliaceis pedicellis, Americana. an Arbor Indiæ Mexij foliis splendentibus, ex Alexter ijs D. Herman. sub eodem enim titulo aliquandi Observavimus.

Laurifolia Arbor, bonustissimè venosis foliis, lactè turgens. Americana. an Mangaiba Brasilianis cognata. nonè.

Laurustinus floribus albidis, elegantèr bullatis, Virginiana. D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.

TAB. CC.



Tab. CCC.

Fig: 1 Leucadendros Africana, arbor tota argentea, sericea, foliis integris. Atla's Tree. D. Herman. hujus ramulus ex Brom. Bon. Spei. ad D. Doody Botanicum acerrimum, allatus est, qui nobis ad exscribendum communicavit.

2 Leucadendro simili: Africana arbor argentea, folio summo, crenaturis fibride. an Leucadendros Africana, foliis serratis, D. Herman. à Promont. Bon. Sp. sibi allatum, ad me misit amicissimus Vir. D. Patricius Adair.

3 Leucoum African. flore lini cæruleo. Mollugini folio. D. Herman. forte Chichinecapatli, seu Chichimeca Simili. Medicina Hernand. è Codice Complutiano

4 Leuoxylum arbor siliquosa, grani foliis, floribus Nerij. dilute semine Asbericana. Pseudo-Apocynigenus, quinq; foliam Barbadensib; notis abibus, Whitewood. Tulip flower. al aliquando Trumpet Flower, nuncupatur.

5 Limonium fruticosum, minimum, glabrum. forte Limoniastrum maritimum minimum C B. prodr. cujus semen subris agrum Boccnianas

6 Leucoxylum arbor pumicatis foliis, & bacis Americana, fructu quasi ex Prunifer uvi. osseculo sulcato. Barbadensibus Bastard-Cheus, vocata forte Frutex arborescens, innominatus foliis oblongis, acuminatis, dentib serratis, alternis, v. bubsi per serratis. Marcgr. p. 81.

7 Lebus Madera patanus & illosus, Ornithopodij siliquâ singulari.

TAB. CCI



CCI

Lotus πολυκέφαλος Cincana flore majore viridi. Morison. Hist. 2. p. 178. Lotus pentaphyllos incanus. CBP. Dorychnio congener

Planta I.B. tom. 1. Dorychnij congener planta. Clusij. Hist. Lugd.

Lotus tenuifolius Maderaspatanus, siliqua singulari glabra. Mannela. Hort Malab. huic proprius quam Anil sylvestri Bisnagarico hujus

Phytograph. Tab. 101. accedere videtur.

Cacinium Tiliæ foliis minoribus Americanum forte Curupicaiba Brasilianis. Marcgr. p. 132. an Arbor Populo similis, racemosa. CBP. Tocot

Guaot (ie) Arbor dendritij forte etiam Arbor lucens Jamaicensis nostras. Raij. Hist. app. Arbor muscarum splendentium. Jonston. Dendrolog.

p. 471. Barbadensibus nostratibus, quibusdam Light-Wood, ab alijs Lignum Rhodium nuncupatur.

Lupulus sylvestris Americana claviculis donata. Wilde Hop-seed. Barbadensibus dicta.

Lupulo buglossi similis India Orientalis, floribus in spicam ex origine foliorum prodeuntem disporitis. an Urtica agnus Indianum,

minime pungens forte Balli-Schorigeanum Hort Malab. P. 2.

Ricinum maximum, cordatis foliis. Mad. Papabarum, hamatis spinis floriculis ex uno pediculo racemosis.

471. Barbadensibus nostratibus, quibusdam Light-Wood, ab alijs Lignum Rhodium nuncupatur.

Lupulus sylvestris Americana claviculis donata. Wilde Hop-seed. Barbadensibus dicta.

Lupulo buglossi similis India Orientalis, floribus in spicam ex origine foliorum prodeuntem disporitis. an Urtica agnus Indianum,

minime pungens forte Balli-Schorigeanum Hort Malab. P. 2.

Ricinum maximum, cordatis foliis. Mad. Papabarum, hamatis spinis floriculis ex uno pediculo racemosis.

Ricinus cordatis foliis, majoribus ramulorum spinis [illegible] Maderaspatanus ex Plateis siccis. Ubi ag. liber admodum Spectatissimi Viri D. Caroli du Bois [illegible]



Fig. 5
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 8
Fig. 7
Fig. 2
Fig. 3

gycium ternis spinis, simul cum foliis, ad genicula prorumpentibus, forte Lycium Creticum Prosp. Alpin. ex ol. Lycium Cretense s. Berberis Cretica. IB. Berberis Alpina Cretica. CBP.

ycium Madera spatanum, Indici Alpino rubenti amulum, bijugis, & gracilioribus aculeis, horridum.

ycium Arboricans e Bacis oblongis anguloris. Hort. Bedum. an Berberidis facie, Arbuscula Americana spinosa, foliis Lycio nonnihil similibus. PBP.

ycium cordatis Buxi foliis. Madera spatanum, ad singulos ortus foliorum sedem, spinula ornatum. e Hu Boisianis.

ycium Pyracantha foliis latioribus an ipsa Pyracantha e Madera spatana. ex Herbario vivo du Boisiano.

ycio accinatus Frutex. Polemonij facie triphylles e Madera spatana. ex Herbario vivo du Boisiano.

rimachia alba, cornicultata, anguste folia florentiore an Lysimachia angustifolia Canadensis altera, caule rubro, flore minore Schol. Botan. 44.

rimachia non papposa Virginiana, Tuberaria foliis hirsutis, flore tetrapetalo rubello. D. Banister.

CCCIII

chnia viscosa Virginiana flore amplo coccineo. s. Muscipula Regia D. Banister.

Harcyn 20.

ginachia non papposa flore luteo majore, situquâ Caryophylloide minore ex Virginiâ D. Banister forte Camaranbaya altera Brasiliensium;

ginachia cerinthoide, maritima, sinuatis, & rubescentibus foliis Virginiana D. Banister.

ginachia viscosa glabra Parietaria foliis Virginiana. Hort. Oxon.

ginachia non papposa humilis, Maderaspatana. Chenopodij lutei foliis non crenatis, fructu Caryophylloide parvo.

ginachia spicata purpurea assirus. Hyssopi folia è Madraspatan.

anga sylvestris Indiæ Orientalis. Hort. Reg. Hampton. forte Cat. Ambalam. s. Be-Ambalam. Hort. Malab. P. 1. absq; Figurâ.



CIV.

Malus Persica, dilacerati folijs, & veluti circumrosis, Virginiana. in Hort. Comptonian. per multos annos exculta.

Nux arbor Indiæ Occidentalis, Juglandi folio vinifera. Marnaya. IB. fortè etiam Arbor vinifera. Coutou Juglandi similis quid IB. tom. 1. Arbor Indica Mamaia dicta. CBP. Manee, Momin, & Toddie Tree Nostratibus appellata.

Mangle arbor Pyrifolia, salsis, & uliginosis locis in America, proveniens; fructu oblongo, teretiusculo, summis ramis radiosa. Mangles Pyrifolijs cum siliquis longis, Ficui Indicæ affinis. IB. Manques 1. Mangles 3ª species, Guapara iba dicta. Piso nis. Paretuvier Rochfort. Arbor de Raiz. Linschot. Ind. Or. P. 4. Ostreifera arbor quæ in Sierra Lionia provenit. Purchasÿ. Navigat. tom. 2. forti Kandel Kari-Kandel, vel Pee-Kandel. Hort. Malab. P. 6. Swamp-Mangrove-Tree, Nostratibus dicta et aliquando, Oyster-Tree.

Mangle alba, Coriaria, folio densius cubi subrotundo, glabro, fructu forma Caryophylli aromatici majore. Mangues 2ª species. 3. Coreiba na Brasilianum Pisonis. Peru-Kandel fortè Hort. Malab. P. 6. White Mangrove Barbadensibus dicta.

Halimi tifolium Alpinum. tenuissimè divisum. IB. tom. 2. CBP. Thlaspi montanum minimum. Hist. Lugd.

TAB. CCV.



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 6

Fig. 7

M. v. G. fc.

...det Indorum. Yuca foliis Cannabinis. CBP. Manihot Theveti. Iucca. v. Cassavi. IB. Hiuca s. Mandioca ex quâ Cassavi fit. Park. Hiuca s. Miamaitl. Nov. Theveti apud Herrand. Manihot v. Mandioca Brasiliensibus ejus radix Mandioca. Pison. v. Marcgr. Iucca Brasiliana v. Americana, stellatis foliis, muricatis [Morden] ...edryon Arbor Americana. Prunifolia, baccas ad amentarias, prosser en, ad ortum solarem, spinulis barbatis. Tuckernood & Tuckeburry. v. Barbadensis dicta. ...mma et Melarezylon. Arbor Lauri folia. Nucifera, amygdalis nigricantibus. Americana. Nostra (sorte) s. Angelina Pisonis. Black-bird. v. Black-wood Barbadensis dicta. ...riatis. Maderaspatensis, tricoccos, acetabulis dilatatis. foliis Pee-Cupparneri Hort. Malab. P. 10. ...terrestris, repens, clavis singularibus, foliosis, erectis. Raij Hist. P. 221. ...ceranodes, albus, succosus, aquosus, insipidus. Nucifera. ...ti foliis subrotundis. Herba Indica Orientalis.

TAB. CCVI.



Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 2

M. V. G. scul:

n.

agrum monospermum minus CBP. Park. 826. an Myagro similis flore albo. IB. tom. 2.

rbis Cicutaria. Tabern. Ic. 98. Cicutaria bulbosa CBP. Bulbocastanum coniophyllon. Camerar.

urtium Alpinum insipidum. CBP. Cardamine Alpina insipida, Column. rectius tamen, Brassica Alpina, sperica, foliis Bursæ pastoris insipida.

urtium, petræum, annuum, nostras. an potius Thlaspeos, genus, circa Bristolium. an Nasturt. petræum, foliis Bursæ pastoris CBP. Nasturt. petræum Tabern.

gundo-mas Garciæ & Acosta. Negundo arbor mas, & femina IB. Frutex Indicus baccifer, fructu calyculata monopyreno, Negundo dicta. Raij. Hist. Pl. Rom.

similis, Fructus striatus. CBP. Bemnosi Hort. Malab.

ait potius Olea, Laurino folia. Portoricensis, summo in margine, crenata, nomine Amygdali Brasiliani, à Cl. Herm. aliquando recepta, ut audio, his fortis, peculat. Cori. Batt. Hort. Mus.

TAB. CCVII.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

M Vander Gucht. scul:

VII.

ium Americanum maximum foliis obtuso P.B. Prod. an Nerium Americ. lactescens, longissimo folio, flore albo, odoratissimo Hort. Beaum. in Hort. Reg. Hamp. succrevit.

io affinis Barbadensis Arbor latifolia, flore purpureo, Jasminio odore: Jessemyn Tree, Nostratibus dicta.

io affinis angustifolia lactescens, flore luteo, Americana.

Americana, costis foliorum appendicibus aucta. Nux Americana foliis alatis bifidis: Knippa. PBP.

phea Madera spatana, Nastur-tij Indici scutato folio, solidiori, venis atris, pediculo spinulis asperato.

phae minima Madera spatana foliis alis Papilionum, referentibus. huic forte Raij-alsin-d-marri, e. Semperviuum aquaticum. P. Alpini, v. Strabo

Egyptia. Dioscoridis. Vesling: in Not. ad Alpin. de Pl. Egypt. 44. Ista omnia è Collectaneis du Boisianis accepimus.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

M. v. G. scul.

CCVIII.

Nux Benzaria Oleosa, foliis umbilicatis, ex Insula Barbadensi, Nux Zeylanica, umbilicatis foliis. Hort. Bedum. Arbuscula exotica, foliis umbilicatis, maculam, nucula Indica Jonarae lb. similem ferens. Breyn. Prodr. 2. Althaea arborea Indica, folio, umbilico rubente. PBP. Tacke in a boxe, nestratibus dicta.

Nux Portoricensis, amplissimis foliis, venosis, & late virentibus.

Nux Zeylanica folio multifido, digitato, flore merdam olente, Tolabo Zeylanensium Parad. Batav. Prodr.

Ocimum Madoraspatanum, frutescens, gratissimi odoris, flore parvo, caulibus villosis. an Ocimum frutescens perenne flore parvo. Breynij. Prodr. 2.

Sorbetum Xicoxiheitl. Nov. Hisp. Tevenij. apud Recchum. an Herba Cidreira Lusitanis. Marcgr. 32.

Ocimum odoratissimum, calycibus, ad verticillas deorsum tendentibus, abrupte petiolis, à Madoraspatan.



Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 4

Fig. 5

M. Vander. Gucht

CIX.

ux rosulata fructu rotundo. CBP. Nux aromatica, ferraria. IB. Nux Myristica. Matthioli. hujus fructus, cortice denso, ultin mostris nucibus tegitur; cui alter
tenuior, reticulatus, rubescens subest, quis Macis dicitur.
Nymphæa Indica minor floribus cum petiolis, ex folior um pediculis nascentibus. à D. du Bois communicata.
ta sylvestris Barbadensium, folio anguste pinnati, leviter crenato. hujus Arbor gummi instar Elemi (ut audio) fundit.
rbana, s. Orellana, s. Urucu Marcgr. & Pison. Orleana, s. Orellana, folliculis lappaceis. Hort. Lugd. Bat. Achiotl, s. Medicina tingendo apta Hernan. Hist. Mexic. Clus. ex gl.
robanche Verbasculi odore. D. Plot. Hist. Nat. Oxon.
robanche Virginiana, radice fibrosâ, summo caule, foliis subrotundis.
robanche Virginiana, flore pentapetalo, cernuo. D. Banister. Cat. Mss.

TAB. CCX.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 3

M. V. G. sculp:

CCX.
Ophioxylum Americanum, foliis oblongis, mucronatis, leviter serratis, Bardanæ instar subtus lanuginosis. Lignum Colubrinum. Barba-
denium. Snakewood libi nunc dicitur.
Orobus Pyrenaicus, latifolius, nervosus. Schol. Bot. 1. p. 242.
Latifolia s. Flos Passionis Curassavicus, folio glabro, trilobato, & angusto, flore flavescente omnium minimo. PBP. in Hort. Reg. Hampton. hujus
speciei cortice admodum fungoso prædita est.
Latifolia affinis, Hederæ folio, Americana. Nhanglir-Oba Brankensib. Pisonis. an Plantæ Scandens, hederaceis foliis Zeylanic. Breynij. Eph.
Germ. Ann. 4. 5. Obs. 137. forte Hederæ foliis Guineensis frutticosa scandens capreolis. Hort. Beaumont. p. 24.
Pentaphyllo-ides erectum lutenum, Alchimilla Alpina effigie, glabris foliis incanis, ad summitates trifidis.
Pentaphylloid. frutticosum, Alpinum, argentei foliis flore purpureo. tri-foliatum. Trifolium argenteum Alpinum Pona Ital. Trifolium Alpinum argen-
teum. Pertici flore. CBP.
Americana Maderæ patana, longiore folio, hirsuta forti Belutta-Modela-mucu Hort. Malab. P. 10. forti etiam. Phinzoba Brasiliensium. Pisonis.

TAB. CCXI.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

M. V. G. scul:

CCXI.
Phaseolus Orobanche Autumnalis, Virginiana radice dentata. D. Banister.
Phaseolus Orobanche Vernalis radice dentata Virginiensis. D. Banister.
Arbor Siliquosa arbor ea Cassinii fol: Americane. Cucumis. Flos Passionis dictus Quajavas foliis majoribus. Hort. Lugd. Clematis Americana. Digitalis flore
Siliquosa, monophyllos major. PBP. Arbor verius. Muraltia 2da Barbadensibus. Pisonis.
Leguminosa similis Mori. Cytisus arbor. Madagascariensis. Nov. Nepal sorti Malabaricæ cognata; à Viridario sicco du Boisiano.
Phaseolus, arbor cui. Astragalus Zeylanicus. Horti Reg. Hampton.
Phaseolus Novi Orbis. Faba purgatrix, sive Fraxinaco distegra. IB. dem. 2. Fabas. Phaseoli purgantes. Park. Faba purgatrix Indiana. 2. Insulæ
D. Thomæ. CBP. Cor. 3tia. Fabæ, v. Phaseolus major, Faba purgatricis nomine missus. Clus. Comment. ad. Monard.
Phaseolus D. Thomæ quo dammodo accedens. Frutex virginius. Hort. Reg. Hamp. an Cytiso quodammodo affinis arbor quadrisiliquosa. Americana sphæro fusca
obtrahs; siliquæ planè membranaceæ per medium planiusculæ secundum longitudinem (sere leguminosis dictum modum) sese aperientes: Bryon. Rud. 2.

TAB. CCXII.



CCXII.

Fraxinifolia semper virens, Americana, tripartita. ex Codice Benningiano.

Pentaphyllum palustre rubrum serratis, v. villosis foliis Suecicum. v. Hibernicum. hujus exemplar ex Suecia nobis allatum, nobis dedit Reverend. D. Stonestreet. quod plurimi ornati sumus Vir D. Gideon Bonavert ex Hibernia (qua invenit) redimus, nobis amicè semel communicavit.

Pentaphylloides, fruticosum minimum procumbens, flore e dilute, foliis sericeis, Fragaria ternis. Fragaria affinis sericea incana. CBP. Fragaria sterilis, sylvestris, sericea, s. incana Morison. Hist. 2. Sacraria Pentaphylli effigie, an Leucas Dioscoridis. Adv. Lob. Pentaphylli effigies. Leucas quibusdam. IB. tom. 2. forte Fragaria Hybridica nana. Park.

Periclymenum Americanum. è cujus radice fit Atramentum. Lauri facie Carolinica, cujus radice Atramentum conficiunt Americani. PBP.

Periclymenum surrectum Persica foliis Maderaspatanum, forte Itti-Caubi. Hort. Mal. P. 7.

Periclymenum Zeylanic. herbaceum foliis variegatis diversicoloribus maculis ornatis. PBP. Clematis Indica foliis Persica, fructu Periclymeni CBP. Cignum Colubrinum Garrite ab Hort. ex eadem insulâ Ceylon. & Rauwolfia Zeylanicum. an hujusmodi sit? Hort. Mal. P. 6.

Pelasites minor folio Tussilaginis. Hort. Blef. Pelasites minor alter Tussilaginis folio. H. R. P. pag. 139.



Fig. 1

Fig. 6

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

M. V. G. scul:

Phaseolus. Pericarpium hirsutum foliis pluribus ex albo viridi, et luteo elegantèr adumbratis. Pericarpium parvum foliis variegatis D. Marer. Hort. Lugd. Bat. Pericarpium foliis elegantissimè variegatis, variegatis, v. tricolor. Ray. Hist. app. in Herb. Commeliniano ita dictum.

Phaseolus Americanus frutescens, foliis glabris, bifloribus, siliquis, pumilionibus, fructu orbiculari, plano, bilobo nigro, tenuissimè arenoso, et tum fere ambiente; Mauzuna Brasilensibus. Marcgr. & Pison. Phaseolus Brasilianus Moreirna dictus Clus. ad Monard. item Phaseolus Niger teres qui Clus exot. Phaseolus Niger tetragonus Brasilianus TB. tom. 2. forte etiam Phaseolus Brasilianus Mulis, sp adiectus magnus, cum magno hilo nigro plurimum ambiente, quid TB. ibidem. Nostratibus Oxe-eye minor dicitur. huic valde affinis Kaka valli Hort. Mal. P. 8. quo forte, idem cum Lobo peregrino Garidelli Provinc. Clus. Exot. lib. 3.

Phaseolus erectus incanus siliquis teretibus Kayan dictus. Cajan arbor Indica, foliis Trifolii fructiferi, siliquis Orobi Bocyn. Prod. 1. fortè Tabern. icon. Cajan Indica TB. tom. 2. Thora Pairou. Hort. Malab. P. 6. Adaggris Indica leguminosa siliquis teretibus. PBP. Kajanus. Katjan Zeylanensibus. Castanea Chinensibus, ut à Barbadensibus Nostratibus Pigeon-Pea (ie) Pisum Columbarium nominatur.

Phaseolus Mader arboreus, Caplab effigie, flore parvo ochroleuco, siliquis falcatis gemellis.

Phaseolus arboreus è Madera, patens, foliis parvo molli vincato, flore ruffo coccineo.

Phaseolus arboreus è Madera patens, foliis parvo glabro, floribus binis venusti rubellis. ex viridario ticio du Bois Sitano Tempestatum.



CAB.CCXIV.

1. Phas. Amer. fol. molli-lanugine obsitis, sicis, g-bus in hir-sutis quangonatibus, semine fusco, punctato, oblongo diversis et hac Phaseoli genus, à Zea at-tamen Ind. Or. s. Nai-Corana H.M. P.8. cujus semina per potum sunt ad nocumenta, ob quæ propter eà ab Indis nostris ingravandus. Cowhage vulgò.

2. Ph. subhirsutus Americ. exiguus, siliquis longis cauliculis, in iisdem locis fere Guianæ. Fonsbo Brasilianis ib. Piso. Barbadensibus ib. Trivenich. et quibusd. Trifolio similis nunc cognatur.

3. Phaseolus Maderaspatanus; foliis glabris tribobatis, floribus racemosis, longis, patulis ex eodem puncto germinatis.

4. Ph. alatus Arbor siliquosa Tupinambis, folio Brasiliana bobo similis. Acacia siliquis insidet distincte C.B.P. Cobus Brasilianus ingens Acaciæ formâ IB

5. Ph. arborescens alatus, viridis. Ind. Or fructu coccineo, nitido, nigro, notato. Phas. Ind. ruber Bontij. Arum Ind. minus, coccineum. C.B.P. Abrus Alpin. de PÆ. Ægypt.

6. Ph. arborescens alatus, viridis. Ind. Or fructu coccineo, nitido, nigro, notato. Phas. Ind. ruber Bontij. Arum Ind. minus, coccineum. C.B.P. Abrus Alpin. de PÆ. Ægypt.

fructus Ind. Or. Africanus Park. Kenni. H.M. P.8. Glycyrrhiza Ind. siliquis, pyri minibus, Pisi coccineis, nitidi nigro notatis. P.B.P.

7. Ph. alatus, viridis Americ. Glycyrrhizæ sapore, siliquis Orobi, seminibus nigris, nitidi coccineo notatis. Cyamus Trifolie Glycyrrhizæ arbor Jamaicensibus et quibusdam Monkey Veriyes Barbadensibus nuncupandus.

TAB. CCXV.



Tab. CCXV.

1. Myrtus de Americanorum flore albo tetrapetalo, staminibus rubris, foliis ternis seu quaternis, per internodia verticillatis. Iamaicensibus Sweetwood dictum. Forte Tupicaiva Brasilianis. 2. Scoparia. Pison. Bà, sourimbà Castilianis. ubi dicit, Inter plantas manifeste reperiri videtur, quæ dubium reddit, an ea, quam describunt Americani, ejusdem generis sit, an alia. Certe descriptionibus nostratibus adaptari non potest, cum antistipam, quod scopas ex eâ conficiunt Americani, glabras habeat.

3. Piper frutex Americ. spicâ longâ gracili. Nhandy Brasilianis Pisonis. Analogo. H. M. P. 7. Piper ex Florida. IB. tom. 2. Planta peregrina Clus. exot. Periclymenoides Indica Castilianis, vulgò an Tlalquezquez apud Nov. Hisp. Hern. & Nieremb.

4. Planta insignis à hucusque proditis omnibus valde diversa, siliquis quadrangularibus, siliquis ensiformibus, stellatim sessilibus, foliis ternis, quaternisve, sessilibus, oblongis, acutis, Cristam imperialem imitantibus, quandoque verò ad mucronatis. à Madagascar allatam.

5. Planta Americana Arbor Balsamifera, ulmifolia, tetrapyrenophylla, foliis Americ. Barbadensibus, Spirit-wood. Jocante.

6. Perdicium Americ. hastifolia, hamuginibus obducta, longissimis aculeis horrida.

Portulaca Curassavica, angusto, longo, lucido, folio, procumbens, floribus albis. H.R. Hampt.

Portulaca, angustis Teloe Rium Asiaticum. Herman. antiquo. è Cod. Bentinginno.

Portulacastrum similis, Plantæ Ind. Orient. in Breyn. Mals. arrum HM. Piso. Glinus Indica, Portulacæ folio, flore majore albo, carnulo albicante cobro. Commel. in Nol.

Portulacastrum fruticosum, Sarmentosum similis buxi, foliis margine dentatis. Fluviatilis Piscina, foliis dentatis. IB. tom. 3.

Portulaca folium maritimum grandius, caule capitato, foliis capillaceis nostras, sed tenuibus. Pentaur. pusillum maris, foliis graminea Raij. Synop. in Polem. minim.

Portulaca, capillus, fol. CBP. ut Prodr. Portulaca quinquefolia fruticans. Boccon. p. 42.

Prunus Zeylanica, spinosa, longioribus, foliis viridi, fructus ofsiculo orbiculari, carnosa circumligatus ofsiculo. H.R.H.

Prunus Virginiana, fructu rubro rubello, acerbo, vix edulis, Ofsiculo lato, & compresso. in Macaxocotl. s. Prunus Cortbinus Nieremb. 318. Mexicano

Hernand. 384. Pr. Curassica. Macaxocotlin. PBP.

Prunus, cortice albicante punctatis, foliis Americana. White Plumens Barbadensibus dicta.

TAB. C CXVII.



Tab. CCXVII.

1. Prunus sylv. Insula Barbados Myrtifolia, fructu acerbo, v. nigrato sapore.

2. Prunus Sebestena Matth. Hist. Lugd. Sebestena domestica subr. Rhand. foliis, an Quisqualis Athenar. CBP. Sebesten domestica. Pr. Alp. de Pl. Ægypt. Myxa domestica s. Sebesten. lb. 6. m. 1.

3. Prun. Sebestena longioribus foliis Madera aspalathis. Sebestena sylv. CBP. Sebesten sylv. Pr. Alp. Vidi nec dum HM. P. 4. Prun. Malabarica fructu racemoso cubico ex cinereo Ray. Hist. an Sebestier de Insula Solar. Zanon. Hist. Bot.

4. Prunifera Fagoi similis arbor, Gummi e lomi fundens. figura, et magnitudine Oliva ex Insula Barbadensi. an Icicaraiba Brasilianum. Pison. lib. 4 huius. Jucundum Veneri: immunda vernula venerida a Natura aperitiva figuram antea.

5. Prunifera Nucifera s. Nuci-prunifera arbor Americana praecedente angustis Cauri foliis, lati virentibus. Mastichen odoratam fundens. Cortices arbor Barbadensium Ligonis an Tamboloriffera Garc. Tambolini. Acost. Hist. Arom.

6. Prunifera s. Nuci-prunifera arbor Americana Cauri subrotund. densioribus foliis, apicibus tantum mucronatis. Damarun-Tree Barbadensibus dicta. Icicae forte de Laet. lib. 15.

7. Prunif. Nuci-prunifera fructu Stapharia, or bicalabo, monococcenigro, Americana Quisqualis Brasilian. Pison. Tequitinguaeu arbor Laet. Ind. Ccc. lib. 15. forte Nebo Arabum a Conar. Persarum apud Oglebeium. Aizapatzi.

CCXVIII.

Prunifera arbor. Nuci pruniferæ, folio deorsum latiusculo longitudine, lævi mollis, gracilis, Barbadensibus, Bully Bay nuncupatæ, fortè Kabu Tupinambis. Cherau.

Prunus Iavanica Atriplicis folijs. Commelin. Kakowa Iavanis. H. Becum. Elemnifera nostra Shrubr dicta Mysteriorum Tab. 173. exhibita, quam proximè accedere videtur

Prunus Americana annuo osseculo magno & filamentis lignosis reticulatim compacta. Sul. Hughes p. 88. Acajá Brasilianis. Piso. Acajá quæ & Shenatera Brasilianis. Marcgr. Prunus Brasilianis fructu racemoso, ligneo intùs pro osseculo. Raj. Hist.

Prunus pentaphyllos. Malabarica fructu calycibus insidente. Raj. Hist. Kæmpf. Hort. Mal. P. 4.

Prunus sylvestri affinis Canadensis C B P. app. Hyperici cum fructu e. Americanum flore albo Park. Theatr. 576.

Rhamnus fortis Arbusculæ spinosæ Euonymi folio, spinis singularibus Virginiana. ab amicissimo Viro & Pharmacopæo Londinensi peritiss. Dr Charlwood communicata. nobis.

Rhamnus fortis Arbusculæ spinosæ Euonymi folio, spinis gemellis Madera patana.

TAB. CCXIX.



Tab. CCXIX.

1. Ptarmica Virginiana Scabiosæ Austriacæ foliis, inciso-crenatis. accuratâ per Icon quàm in Phytogr. Tab. 93. exhibere curavimus.
2. Ptarmica Virginiana similis. Plantæ Amœnitatem, sibi visus sparsis, hexapetalis. ex Cod. Bobartiano.
3. Rosea lutea flore minor Asiana, flore albo fluorescente forte Rhadiolæ folio, flore flavo Moris. H. Blès. forte Sedum trifidum Sedum trifidum folio Asiaticum palustre.
4. Rhamnus Maderaspatana, foliis perennibus, spinis longissimis nullis.
5. Rhamnus Maderaspatana dependentibus foliis spinis longissimis foliosis.
6. Rhus Africanum trifoliatum majus foliis sublus argenteis, acutis, & margine incisis.
7. Rhus Afric. trifoliatum majus foliis obtusis, vix hirsutie publescentibus.
8. Rhus Afr. trifoliat. majus foliis subrotundo integro, molli & viridi.
9. Rhus Afric. trifoliat. minus glabrum, splendentibus foliis subrotundo integro. forte Cortex Africanus Asiaticus triphyllus quorundam.



...ria Malabarica Mail-arschi dictæ similis è Madraspatan. deq; vid. H.M. P. 2.
...us superior Alsea Venatis foliis; aliquatenus accedens Madraspatanus ex Herbario Vivo du Boisiano.
...us lactescens, Ficoidis Gis, spinulis inordinatis armatus. D. Bonist. Ricinus Tithymaloides Americanus lactescens, xuræ floribus albis. PBP. Frutex
...nominatus; purgans; et urens. Marcgr. Brancamos Lusitanis.
...Madraspatanus, fl. purpureo trilobato folio, mitibus; denticellis, ornato. an Ricin. Americanus lactescens trifido bato folio perennis flore nigricante. H. Beaum.
...dulis. Arbor ex Americanus Populneæ fronde argentea; fructu Populi nigræ ac gentes Breyn. Prod. 2. Ricini fructu Arbor Curassavic. foliis Ziziphi Margentes Zeylanis. PBP
...bor ex Indica Bryoniæ nigræ similis; ad folior usq; ortum per totum ex H.R.H. sorte Kalu Kattajil. H.M. P. 7.
...taria foliis Planta glabra ex alata fructu monopyrena Gloriana; ipse è figura. Ricinocarpos fortè genus è Madraspatan.
...taria aquaticæ dameriodes similis; Planta Madraspatana, floribus medio caule, quasi ex latitudine proruentibus; ex Herbario Vivo du Boisiano.

CCXXI.

Salix arbor folliculifera obtusis foliis candicantibus, Americana White-Willow, Barbadensibus dicta.

Salix arbor folliculifera tot-dy'llos luridè atrovirentibus acutis foliis Americana blacke Sallow, Barbadensibus vulgò.

Salvia Barbadensibus dicta spicis florum compactiori.

Salvifolia Arbor Orientalis, foliis tenuissimè ir enatis.

Sambucus humilis, s. Ebulus mexicana Marrubij aquatic. laciniatis foliis H. Pat. à D. Doody. accepimus.

Sambucus Barbadensibus dicta, foliis subincanis. forte Arauja a Peri Brasilensibus. Pison. p. 228. forte etiam Xuxnatl Mexicensibus. s.

Sambucus Hernand. lib. 3. c. 81.

Scabiosa Graminifolia mollicaulis, capitulis argenteis. s. Statice minima Madera spadana, ex Herbario Vino du Boisiano.



CXXII.

…nunculo montana crenata folio longiori & caule folioso. Schol. Bot. pag. 27.
…nunculo Alpina 1. Sedum Alpinum 3. in Fr. Ger. oper. Rhegium. Column secunda varietas.
…nunculo Alpino 2. Sedum tridactylites Alpin. majus album. CBP. Saxifraga petræa à Pona.
…nunculo Myosotis floribus albicantibus foræ umbellatis. Phytogr. Tab. 58. febrior Icon.
…nunculo Virginiensi alba folio oblongo macronato. Phytogr. Icon accuratior.
…ssafras arbor Monardi Hist. Lugd. Sassafras 5. Cignum Pisonianum. IB. tom. 2. Arbor ex Floridi Ficulneo folio. CBP. Anhuiba
…rasiliensium 5. Sassafras Pison.
…abinia affinis, Chrysanthemi facie, Laricis folijs Americana. Archangel Barbadensibus dicta.
…rtanea arbor Americana, angustissimis foliis, ex ramis pertenuibus extendit sese hirsutis ferrugineis floribus. Leatherwood Tree Barbadensibus nostris.



CCXXIII.

1. Sedum Africanum ter etiſolatum, flore Hemerocallidis. ē Codice Compton.

2. Sedum palustre ter etiſolatum Virginianum D. Banister.

3. Senna humilis Americana foliis herbæ Mimosæ, siliquis erectis. à Chamæcrista Pavonis Americana siliquâ multiplici Breyniana admodum diversa.

4. Senecio foliolis Africanus perennis, foliis confertim nascentibus D. Syen. Conyza Africana Senecionis flore, retusis foliis H. Ac Lugd. in Conyza Matritensis retusis foliis Boccon.

5. Senecio perennis latiori folio Prom. Bon. Spei. quo loco ad se missum nobis communicavit D. Doody.

6. Sideritis ryhum Africanum, s. Lignum ferreum duritie foliis oblongo, Lignum ferreum vulgò. PBP. in Hort. Reg. Hampt. colitur.

7. Sider Aquilegiæ foliis Moris Umbel 7. n. 8. Listeranis latifolia, Aquilegiæ foliis CBP. Lignum ferreum Rarvolfii foliis Aquilegiæ. IB. tom. 3.



Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 3

Fig. 8

CCLXIV.

1. Sideritidis facie Thlaspeos siliculis. binis seminib. R. schyzomenes in modum arcis circulariter pendentibus. septo membranaceo interjecto dispertitis. ē Mada-
2. Sideroxylum Americ. s. Cignum durissimi ferrum aemulans. Ironwood Barbadensibus dictum Ligon. p. 74. forte Thora-Pathrena. Brasilien. Marcgr.
3. Sinapi ibrum Indicum triphyllum tenuissimis foliis. ē Madagascar allatum.
4. Stigmaticum Africanum flore amplo aurantiaco. forte Stigmaticum flore aureo R. Aethiopicum PBP.
5. Stigmaticum Africanum. fl. pentapetalo obsoleti coloris. forte Stigmatich. R. Aethiopic. flore pentapetalo obsoleto. PBP.
6. Stigmaticum Aegyptiacum flore caeruleo, parvo, gramineis foliis. PBP. ex Cod. Bentinq.
7. Stigmaticum Africanum tricolor, caule nodoso angulato & folium ex Cod. Compt.
8. Stigmaticum biperennans Capitis. Bon. Spei. ē Cod. Comploniano.



TAB. CCXXV.

Tab. CCXXV.

1. Physalis Africana. trianthephorum ē Codice Compton.

2. Physalis minus polyanthemum, fore parvo luteo, radicis aurantijs (seu phaniceo-aureis) elegantissimè striatis. Capit. Bon. Spei. Breyn. Prod. 2. hanc Ipse dissimam, plantulam in Hortulo D.ni Doody, alijs fore entur rarissimā unam & hanc tantū conspeximus.

3. Similis clarissimo Rodor. a folia, tota loris è Tor. á Mariana.

4. Solanum racemosum Americanum. Raij Hist. Solanum racemosū luteoviride, Americ. folijs Staminijs, Amaranthi. H. Ac. Lugd. Solan. magnum Virginianum rubrum Park. forte Cerasifera Tomat. Mexicanis, Hernand. Pecan Virginianis, ex monitu Cl. D.ni Lister.

5. Solanum Spinosissimum fructu cerasi, spinis ignis Americanum. forte Husto-Tomatl in, s. Tomat spinosa Hernand. 106. nostri tamen ramulis minā tantum, parte spinosus ex adit, superna mitis est.

6. Solanum Americanum pomiferum sublanatum fructu Pyriformi longiore, spinis pluribus armatum.

Fig. 3



Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4



Fig. 6

Fig. 7

Fig. 1

...num Barbadense spinosum, foliis villosis, fructu aureo rotundiore, Pyri parvi inversi formâ & magnitudine. an Cucurbitacei generis, Fructus pretiosissimus, à Francisco Peninzio missus. Clus. exot. Fructus Indicus Pyriformis granis intùs nigris Cucurbitini generis I.B. huic forte etiam spectat. Malum mal. Nov. Hispaniæ Torentij apud Recch.

...num pomiferum, fructu inverso. CBP. Curti Solanum Prine. Frid. Cæs. in Tab. Phytoscop. quod à Melongena vulgò, (sic) Mela-barudena Mala-...arorum. HM. ...pecie non differt. illius est tantùm varietas. Politijon Hortulanis nostratibus dicturi. Fockÿ

...num pomiferum magno fructu ex albo & atropurpureo mixto, foliis & calyce spinosis. Solanum pomiferum fructu nigro spinosum CBP. Solani species Fockÿ.

...dis Lorentinus Bonÿ. 123. Melongena, ana nigra Rawolf. Hist. Lugd. Brounpollij nostratibus bulgò.

...num pomiferum, fructu rotundo striato duro CBP. Mala Æthiopica. Dod.

...num pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans foliis profundè dentatis. H. Ae. Lugd. Solanum spinosum arborescens. Cap. Bon. Spei. Breyn. Fascic. 28.

...num Zeylanicum spinosum, fructu amplo & in carne, ad pastinacum usque stricturi, forti Solanum spinosum pomiferum Indicum album, foliis Hyosciami albi majoris Breyn. Prodr. 1.

...num baciferum Americanum fructu corymboso, ex Insulâ Jamaicensi.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

CXVII.

...um mor dani : Capsicum latifolium. Mali Æthiopici fructu magno, striato, compresso, Americanum; Bonnet Pepper Barbadensibus vulgò.

...m Radicum Laurinis angustioribus foliis maximum. Hort R. Reg. Hampt. ubi datur et hujus species alter a multò latioribus foliis ex Americâ.

...is brevis Maderæ palustris: forte Muel-Schroÿ. HM. P. 10.

...ulmonaria maculosum : Pulmonaria maxima, foliis quasi Saccharo inter ustis. an Symphytum Alpinum latifolium maculatum asperius, flore cæruleo HRP.

...phytum non maculatum asperius; per elegans, flore multiplici.

...mphytum : Pulmonaria non maculata foliis glabris Americanum, flore patulo cæruleo.

...mphytum minimum Acini foliis bijugis : Maderæ palatanum.

...ga Babylonica indivisis denticulatis, foliis centenis vel x. minus acutis. sub Ligustro Orientalis dicto in Hortis Patavinis siccis haud semel Observavimus.

Fig. 6

CCXXVII.

...ringa jeandeg; Madera esp. alterna Fraxini foliis denticulatis, clarius serratis denata.
...tachaca foliis ternatis, Saddlewood. Legrelori ad gr. hippia conferenda apium PBP. Teiomahaca Mexic. Hern. an Tacamahac. Populo similis.
...fructu cubebe Reynie IB. Arbor Populo similis resinosa alterna CBP. à from. Bon. Spei. accepimus. vim HRH. antea collegimus.
...lium max. Africanum flore aur. antiaco. ex Cod. Benting.
...ori foliis Frutex Caroliniensis. PBP. Teucrio similis Indica frutiosa, foliis ex ossiculis. H. Beaum.
...mulatori folio bilosissimum, calyce amplectente à Madera esp. alterna.
...ubinthus Americ. polygonifolia, Palma dactylifera dicta. PBP.
...ondens Americ. Sorbi aucupariæ foliis, costulis medio appendiculatis alata Arbor Americ. resinosa, foliis ad Rosarum folia accedentibus H. Beau.
...pi chalycinis Cornutia foliis siliculis hirsutis.
...rmelos Africæ. Senamundæ facie, Ericæ fol. angustiss. PBP. idem Erica Afr. arbor ex Corisfol. fl. flavesc. quod PBP. in HRH. collegimus.

Fig: 3

Fig: 1

Fig: 2

Fig: 6

Fig: 8

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 7

CCXXIX.

Thymelæa Africana, tricoccos humilis, Polamalatta vulgo. PBP. ain Myrsine varia. H. M. p. 3. Pomifera Indiæ. trifol. fructu Pruni fol. caudato Raij. forte Tapria Brasiliens. Marcg. Thymelæa Alpina glabra flos cœlestis: subalbidis ad folierum ortum insidentibus. ain Sanamunda glabra. IB. tom. 1. Thymelæa fol. Polygalæ glabris. CBP.

Thymelæa incana Marantæi fol. viscosis, surculis adnodosum fragilibus. Thym. quædam inclyta Genevensis. Raij. Ext. proxima illius, si non eadem est Chamelæa

Myrsine nigricans. CBP. Charmelæa hirsuta nomine data. IB. tom. 1. Charmel. Alp. incana. Adv. & Icon. Lob. Bellue. Ind. Pis.

Thym. Capitis tericeis longioribus vacuis fol. cauli quaquiculato pilose. ain Thym. Æthiopic. Passerinæ fol. Br. Cent. 1.

Thym. Capensis Nepæ Theophr. fol. aculeatis, flore purpureo purpureo forte Thymbra Africana peregrina. Barthol. Act. Med.

Polygala arborescens fruticosa. Thymbra facie & foliis floreminore purpurascente, fructu cornuculato. Cap. Bon. Sp. Br. Prodr. 2.

Thym. capitata angusto Salicis fol. Prom. Bon. Sp. ain Salix conopherea angust. mucronat. fol. glabra. PBP. forte Frutex Æthiop. conifer fol. Cassiæ, Salicis

cornutis Br. Cent. 1. hastæ nobilissimæ recensitas Thymelææ species D. Patricius Adair Vir. sanè humanissimus & Reipublicæ barbadensis assiduus, sine nobis amicissimè dimissus

Milk-weed Barbadensibus & Bermudensibus. Thymelæa maris. Barbadensibus & Bermudensibus. vulgo

Thym. arbor Americana. Malo Medicæ fol. amplioribus tenuissimè crenatis, succo maximè venenato. sub foliorum ortu ad pediculos binæ spinarum insidentes, nascuntur appendices. quod quis Arbori peculiare videatur. Tetlatia Mexic. Nieremb. Tetlatia arbor. Turnms. & Hailini s. Hyas Rava. Pogotonus Barbadensibus, vulgo Aulæ Hamptonicæ in Plantarum rariorum dilectissimo Horti Reg. collegio, unde Insulæ Barbadensis transmissum accepimus.

Fig: 4

Fig: 6

Fig: 7

Fig: 3

Fig: 5

Fig: 1

Fig: 2

CXXX.

Tithym. arborous Æthiopicus Mauritij Germanicus foliis, flore pallido. H. Am. 1. an Tithym. Monomotapens. Myrtbi folijs angustioribus floribus rubpurpureis H. Beaum. forte Tirucalli H. M. p. 2. in H. R. eg. Hamp. succrescit.

Tithym. Curassavicus Myrtifolius flore papilionaceo, cocineo parvo. PBP. ex Cod. Bending.

Tithym. Curassavic. folio lotini triphylles floribus serratis. Thasicula sylvestris vulgo. PBP.

Tithym. Ceylanic. spinos arboresc. PBP. in Ela-calli H. M. part. 2. in H.R.H. floribus, insigne prabet Ornamentum.

Tithym. Afric. arboresc squamato caule spinosus. ex Cod. Comp. Tithymali for tigonus, Planta lactaria Afric. Pini fructum facie. Br. Prod. 2.

Tithym. Afr. arboresc. spinos, & folios as lactes c. et Euphorbium ferentes s Euphorbium Africanum arborescens, foliosum & spinosum H. Beau.

Arbor Americ. baccas ferens tetragonas uteris singulis capsulis bina semina includentibus. Shagbarke Barbadensibus dicta si quis dirhac arbore. Cortex scabritie valde asperatus est.

Tithymalus alter Americana foliis longis mucronatis.

Fig: 4.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 5.

Fig: 6.



Fig: 8.



Fig: 7.

Fig: 1.

Savage sculp

Tab. CCXXXI.

1. Tribulus Africanus spinosus, Cerei effigie ex Cod. Compton. an Tribulus Asricus Mauritanicus aphyllos, angulosus & spinosus, ex quo Euphorbium Officinarum. H. Acad. Lugd. Euphorbium. Dod. Lob. CBP.

2. Trifolium purpureum montanum adscendens glabrum capitulo magno compresse ovato. Trifolium Hybernicum. Park. Trifolium dalea montanum Monspeliense. Ray Hist.

3. Trifol. Campestre majus hirsutum, capitulo brevi. Lagopus Hispanicus major. Cluss. Hist.

4. Trifol. spicatum rubens glabrum, glabrum, floribus dubiis an Maderaspatan.

5. Trifol. vermiculatum minimum, supinum & incanum siliquâ singulari Maderaspatanum.

6. Triticum Polonicum. H. Oxon. ab ingeniosissimo Horticulore D. Harrison accepimus.

7. Valeriana Alpina minor, planta palmaris. CBP. quoq. in Prod. in Montana Nordus. Lob. Icon.

8. Valeriana Alpina minima, planta ad spithamam tenuis & biuncialis. ex H. Patavino collecta.



Fig. 2



Fig. 1



Fig. 3

Fig. 7



Fig. 6

Fig. 4

Fig. 5

M.V.G. scul.

XII.
riana mas Cacalia folio D. Fagon. Schol. Botan. Valeriana Cacalia folio Alpina D. Fagon. Raij. Hist. app. in Hortulo Villari cultissimo D. du
ii. ad Milchamiam Vicinæ Agri Surrinensis collectam habuimus.
riana Alpina parva Nardo Celticæ similis inodora. Nardo Celticæ similes inodoræ. CBP. hanc in Baldo & Alpibus Sumano. contra minus
ul Sup. Bauh. in monte Drawenstein. Austriæ D. Burserus collegit. & Valeriana Alpina parva latifoliæ titulo ad Bauhinum misit.
riana rubra angustifolia & longioribus foliis Valeriana rubra angustifolia. IB. tom. 3. à Valerianâ rubrâ angustifoliâ CB. Pin. & in
od. descript. plurimùm differt. Cichoracei rubra. Valeriana rubra dicta alterum genus oblongo & angustifolio. CB. Phytop. an Valeriana
artina angustifolia, s. minor rubra. Moris. Umbel.
ma hederæ flore ariana. Cura sagica latifolia. PBP. Hort. Beaum.
nica Alpina frutiens Serpyllinæj folio longiori. Veronica Alpina frutescens. CBP. Veronica saxatilis IB. t. 3. Veronica frutiens. Park. Clus.
nica frutiens Serpyllo minoris folio circinato flore. Veronica Alpina minima Serpylli-folia Pona. Descr. Mont. Bald.
nicæ affinis Indicæ Orientalis Pulegij facie, caulibus tomentosis.

TAB CCXXXIII.



Fig. 1

Fig. 3

Fig. 7

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

M. V. G. scul.

CXXXIII

Veronica mas repens Pyranaica folijs longioribus glabro. Sch. Bot.

Veronica s. Chamædrys purpurea latifolia major. non ramosa Pyranaica Sch. Bot.

Veronica ph. ea tempervirens Ponæ ad Chamædrys bulbosam accedens. IB. 3. Chamædrys Montis Sumani. quasi ibid. Chamædrys Alpina vix altis CBP.

Veronia pratensis flore cæruleo latifolia flore cæruleo Sch. Bot. pro maiorem minorem affert ad Betonica Pauli s. Veronica pratensis, Stœchadis folio CBP.

Thymum humile incanum odoratum. Ubi dicas folijs latioribus, spinosum floribus minoribus. PBP. Hort. Reg. Hampt. obscura.

Viola peregrina angustissimis folijs rubra latis glabra. in Viola angustifolia purpureo-violacea, folijs latis glabra D. Magn. Bot. Mon. 57.

Viola Alpina rotundifolia minor Hort. Reg. Par. Gramen Parnassi altius. Hist. Lugd.



Fig. 2



Fig. 5

Fig. 3



Fig. 1

Fig 4

M. V. G. scul.

CXXXIV.

Viola rotundifolia montana major s. Pithorea Valesiensium facie, floribus latis, Viola Alpina rotundifolia lutea. CBP. Viola Martia lutea IB. tom. 3.

Viola carulea maxima Cucumerinis hirsutis foliis Virginiana.

Viola Virginiana tricolor foliis multifidis caulículo aphyllo. D. Banist. hujus Icon nimis imperfecta cum Synonym. in Phytogr. Tab. 114. exhibetur

Viola rubra latior e folio. species peregrina. ex Codice. Benling.

Viola aurea edax affinis Pinguicula facie Prom. Bon. Spei. ex Cod. Comploniano.

TAB. CCXXXV.



CCXXXV.

Virga aurea 1. Solidago Saracenica latifolia serrata. Consolida Saracenica major Hist. Lugd. forte Virga aurea Solidago altera folio minus. qpsis. H.Blef. à Virga aurea 1. Solidagine Saracenica I.B. plurimum differt.

Virga aurea Canadensis folio paniculata uno versu dispositis. H.R.P. & H.R.Blef. an Virga aurea Mexicana Cinnamomi folio. Dodart. Mem.

Virga aurea Mexicana C.B.P. 269.

Virga aurea montana Scrophulariæ folio Icon. Robb. an Virga aurea montana latiore folio glabro. H.R.P.

Virga aurea latissimo folio Canadensis glabra. Schol. Botan.

Virga aurea 2. Solidago procerior Americana, caule multiplici. Solidago maxima. Cornuti 168.

Virga aurea Americana frutescens glabra folijs subtùs canis, comis admodum densis inter ramulos brachiatis, implicatis. an Tlalchichinoa Pisoni apud Mexicanos tribus, 2 Herba aurea 3. Hernand. 292.

Virga aurea montana biuncialis pumila folijs acuminatis. an Virga aurea humilis, Aspina Moris. Prælud. 323.

Eadem foliorum apicibus obtusis.



Tab. CCXXXVI. Lonicer

1. Virga aurea angustifol. paniculâ specios. Canadensis HRP. Virga aurea fol. lanceol. non serratis HRB. Virga aurea fol. anguste lanceol. non serratis R.

2. Virga aurea major latifol. foliis hirsutis Americana, forte Virga aurea Canadensis hirsuta, paniculâ minus specios. HRP.

3. Dalea foliis v. foliis Ungedonis flore Americana.

4. Vitis arbustiva hirsuta foliis in aculeum abeuntibus, Volubilium ora Guinaica per similis, Americana.

5. Limaria major trifolia, flore amplo pentapetalo, Virginiana. D. Banister.

6. Volubilis Africana fructu tetragono, Smilacis similis, viticulis asperâ, foliis medio acuspidatis, & in aculeo relabentibus mucronum gerentibus foliis.

7. Urifera alterâ specie foliis amplioribus ferè bipedalibus crassis Americana. Sea side Grape Barbadensibus dicta. Raiser. 3. Urifera arbor à Charibæis Odem dicta Rocher. Urifera arbor Occidentalis, foliis rotundo, Obtuso PBP. item forte Sideroxylum, s. Lignum ferreum dictæ Americanæ, foliis subrotundis ejus d. PBP. an Arbor Insula Tabago matricidium Brasiliano simile de Laet. Ind. Occid. forte Papyraceæ arbor Guinicharæ Barbadensibus Uvero, & Uva quid præ fructu Uva spuria ab. IB. hist. 3. Guibor a. D. Fum. Hist. gener. Guaicharagua in Insulâ Hispaniolæ ac Oviedo. Lugd. CBP. Guaicharo arbor in Insulâ D. Mund. Brochr. forte ultimæ Papyraceæ arbor Copeia IB. Copey in Insulâ Hispaniolâ CBP. Guaicharo el Copey Hist. Lugd. item forte Populus Americana quasd. HL. Populus rotundifolia Americana. Park.

TAB. C CXXXVII.



Fig. 5

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

M. V. G. scul.

CXXXVII.

Myrsiphaar bor Africana baccifer asforibus purpur purreis Ulmifolia ear buscula Aethiopica ramulis adnatis floribus purpur ascentes H. Bedum. Ulmifolia arbor Carolinensis. PBP. in HR.H. supr emo der asforuit & fructum tulit. & a Prom. Bon. Sp. ad O. Patricium Adair nuperrime allata est, qui & nobis amicissime

Arbor in Arbor sofij: Ulm Mexicanis Aya quiacuri arno Vaciolo quiahuitl. s. arbor pictus. & Ocelo quahuitl. s. Arbor Tigridis. Nierembergi. HM. p. 2.

Botria racemos amas. Vir giniam. minor s minimis ur mi. Uvifera racemosa Canadensis Dodart. Mem. Rais Brasilianus. Pisa. Marcgr. Gridi. hist. Schoepfiana.

Botria dregotabilis Zeylonensium Bandura Cingalensib. dicta. Nepenthes Zeylanicum s. minore. Breyn. Pr. 2. Planta mirabilis ad stillatoria. Grim. Ep. Germ.

Botria dregotabilis Monarchis Aman. Ch. Pl. Bandura Cingalensium Gantzinae Indiae gracis. qui d ibid. Arr annabis. Flak. daser. Isl. Madag. Ogil. daser Afr. 685.

Uva requi regotabilis Barbadensibus Cherquer-Grape (ie) Uva testulata nuncupata. hui for 4 gracilis Caulis Tongam. HM. p. 3.

Arbor Americana conophulacea fructu punctato Barbadensibus Cherquer-Grape (ie) Uva testulata nuncupata. hui for 4 gracilis Caulis Tongam. HM. p. 3.

Ficus arbor ac. Afric. Lauri Arrizican. 66 is majoribus ut cur racemosis punctatis. H. Bedum.

Arbor Americ. per fericubi è summis ramis, ad terram usq. demissis, prolifera. The Mangrove-Grape Barbadensibus dicta. ain Ogilb. HM. p. 4.

Xanthus Indicae Bontij.

TAB. CCXXXVIII.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

M.V.G. scul.

CCXXXVIII.

1 Xylobion Arbor baccifera frondosa Caui pinguioribus foliis Americana. Beefswood (ie) Lignum bouinum Barbadensibus dicta. forte Frutex innominatus

2 Ligno aloes foliis ad Myrtifolia accedentibus. Marcgr. p. 82.

3 Xylomatia arbor American. Whipwood (ie) Arbor flagelliformis Barbadensib. dicta à Xylomatia genere nostro à Cl. Tournefort. Inst. R. H. p. 597. haud procul abludit.

4 Xylopicrion 1. Lignum Columbarium Caryophyllo singulari, subtus lanugineo. Barbadensib. Pidgeon-wood nonnunquam etiam. hujus arbor Ultra inq; Indiæ alumna

5 Xylopicrion arbor Barbadensibus. Bitter-wood (ie) Lignum amarum cum nominata. hæc 4 nos vidimus et ex situ Arbores cum multis aliis rarioribus, ex Barbadensi

insulis in Angliam allata sunt ab honestissimo viro Jacobo Reede, qui Illustrissimi Mecænatis & nostri Comitis Portlandiæ mandatu, in Charibeas Insulas

plurimis ablegatus erat ad explorandum plantas nobiliores Hortum Regium Aulæ Hamptoniensis instruendas.

6 Sarsaparilla Virginiensis; nostratibus dicta labiatis Umbelliferæ affinis Americana. ain Horbarium Canadensium, 5. Parasis moschatum. huic pertinet. alijs

judicandum relinquo.



Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

M. v. G. scul.

CCXXXIX.

Xanthoxylum pinearum Lusitanicarum. PBP. appendice.

Xylosteum arbor Americ. Xylostei simile, è cujus ligno Cistas vel strigiles conficiunt Barbadenses nostrates; à quibus Prince-wood & Cabinet-wood nominatur. Periclymeni genus. Forte.

Xanthoxylum aculeatum Carpini folijs. American. cortice cinereo. Tetsiba Marcgr. Fustick-wood Barbadensibus dictum.

Xanthoxylum aculeatum Fraxini sinuosis, & punctatis foliis, American. fructu Evonymi. Prickly Yellow-wood Barbadensibus dictum. & interdum à foliorum di causticâ. Pellitory of Spain Tree.

Xanthoxylum Pyrifolium, Styphi: pino: o. Americanum. Arbor flava Herculis minor. the lesser yellow Hercules Barbadensibus nominatur.

Xanthoxyl. Americ. s. Hercules arbor aculeata major. Juglandis foliis alternis parcim sinuosis. Arbor flava Herculis major. the greater yellow Tree Barbadensibus nostratibus dicta. ait Morl. Hist. Hercul. HM. part. 5.

TAB. CCXL.

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4

Collins sculp

Fig. 6

Arecæ.

a Arca Bengalensis Sabdariffæ similis. ex Cod. Benlingiano.

b Alchimilla alpina pubescens minor. HRP.

c Mau maritima Myrtifolia Coriariorum. Button-wood Bermudensibus vulgò. à D. Iacobo Petiver accepimus.

d Aloe Americana Ananæ foliis floribus suaveruberntibus. ex Cod. Benlingian. in Aloe Arboris serrata floribus coccineis. PBP.

e Aloëa Madera: palana Melochiæ angustis foliis, fructu ex albis fuberrimo pediculo curto.

f Anona Americ. juxta Fluviorum ripas innascens vc River Pear Nostratibus vulgo. hujus Icon genuina hoc loco adjungi curavimus, quæ enim pro ea in Phytogr. Tab. 138. exhibetur, est revera Anona Americana flore splendente ex Vera cruce. PBP. v. ab hac plurimum diversa.

TAB. CCXLI.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Collins Sculp

CCXLI.

1 Anonymus Mader a Jpatan. Senecionis Hier acij folijs simplicibus spicâ foliaceâ v. Herminij adinstar: quamnâ. in Bahutta-adecamanjeu. HM. p. 10.

Amaranthо affinis Ind. Or spicatus capsularis.

2 Apocynum ierr ato Salicis folio Americanum. ex Cod. Bentingian.

3 Arbor Americ. Fagineis foliis glabris, crenis rarioribus, p. marginem dentatis. ex Insulâ Barbadensi.

4 Arbor Zeylanicc. Colini foliis subtus lanugine villosis, floribus albis, Cucullimodo laciniatis. Cl. viro D. Tancredo Robinson accepimus.

5 Arbor Americ. Salicis folio frondosa, Bermudensis. Birch Tree (ie) Betula dicta sorti Sabaf. Syrorum. Ravwolfy. Hist. Lugd. app. ad D. Pedevet. transmi

6 Cardui Solstitialis. Spina Solstitialis quam Allobroges nominant Aureoles. Cam. Mert. Spina Solstitialis IB. 2.3. Cardiaus stellatus luteus foliis Cyani CBP.

Is confundit hanc Spinam cum Cardio stellato minore Column. qui et Spina Solstitialis melior Apula eidem nuncupatur.



Fig. 1

Fig. 2



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Collins Sculp

Tab. CCXLII.

fig. 1. Arbor Americana foliis ad Chenopodij amplioris folia accedentibus ex Insula Barbadensi.

2. Chrysanthemum Helenij folio Umbone grandi in culo prominente. ex Horto Sicco humanissimi viri D. Benjamin Charlwood accepi.

3. Chrysanth. Virginian. Bellidum, disco lutei coloris petalis ornato.

4. Chrysanth. hirsutum. Virginianum auriculato Dulcamarae folio octopetalon. has Chrysanthemorum Icones hoc loco adjecimus, eò quòd asseratius dedicatae sint quam eaedem plantae in Phytogr. nostr. Tab. 83. adpositae.

5. Doronicum Alpin. Pulmonariae aureae folio hirsuto, flore singulari. an Doronici Styriaci Clusio genus alterum ex H. Patavino collectum.

TAB. CCXLIII.

Collins sculp

Tab. CCXLIII.

1. Vonyra Africa gravcolens sapibulis argenteis collegi apud Bromptonienses in Hort. cultissimo D. Georgij London. quæ à Cl. D. Herm. nuper rimè auxit
2. Lupaboriudes Bermudense latifolium fuscis caulis pallescentibus. Silvarreed nostratibus vulgò.
3. Lupaborium angustiorisfolio Bermudense floribus flavescentibus. Hogreed nostratib; dictum. Habuimus à Sagacissimo Botanico D. Jacobo Petiver. v. posteriorem, à Senecione Africano latiore folio nostro haud multum abludere opinamur.
4. Ficus arbor densioribus foliis parvis pinnatis Amboinensis.
5. Ficus Sirieramensis. multifidefolio supernè partim modum scabro averrà densè longe inermelli. Ambaiba altera species, Ambaitinga Brasilienstib. Pisor.
6. Filix palustris major, non ramosa, pinnulis obtusioribus planis. ex Insulâ Bermudensi.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 4

CXLV

Filix Bermudensis, non ramosa, petræa, pinnulis acutioribus planis hirsutie pubescentibus.

Filix Bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profundè dentatis speluncâ rugium innascens cauliculis muscosâ lanugine refertis.

Filix ramosa procerior lacunis adnascens, platyphyllos ex insulâ Bermudensi novas has Filicum exoticarum species, cum alijs quibusdam rarioribus eximius ille Botanicus D. Jacobus Petiver ad nos mittebat, & ex insulâ Bermudensi ab ingeniosiss. viro D. Joanne Dickinson Pharmacopæo peritissimo, & amico suo integerrimo, illic pro tempore commorante, se accepisse significabat.

Frutex coralloides marinus Virginiensis an Coralloides fruticosa a Planta marina rectior I B. tom. 3.

Guaiacana Loto arboris Guaiaco Patavino affinis Virginiana, Pishamin dicta Parkinsono suprema æstate floruit in Hort. Comptoniano Fulhamiæ

Gramen Bermudense frumentaceum foliis brevibus obtusis spicâ crassiusculâ compressâ, antorsum gemino versu, velut in foveis gramfera G-op-Graſſe Spatibus vulgò. a D. Petiver habui.

TAB. CCXLV.

CXLV.
ramen Pichamon Bermudense speciosius, foliis brevibus obtusis. ab eodem D. Petiver.
Arbor arbor Ind. Or. ridgwá baricos. á. V. funiculus in modum contortuplicatá. Pisoq Marcgra H. M. p. 6. Frutex Indii. fructu è Styli apice egresso.
ex tuplici funiculo in spiram convoluto constante Raÿ.
Arbor arbor Ind. Occident. fructu majore. Tamaiscorybus nostratibus. Button wood dicta.
Solanum Americanum coeruleum foliis Hormini. Dodart. Mem. Tacua. Acanga Brasilianis. Piso. Fradagosa Lusitanis.
Solanum pumilum glabrum. Nastur tÿ foliis Americanum.
Agrimonia Virginiana frutescens spicata sinuata. ait Hypericum frutescens, flore tetrapetalo decussato, s. Crux S^ti Andreæ. D. Banister.
Agrimonia Bermudensis Althææ folio spicata. fructu orbiculari majore. á D. Petiver.
Arbor fructu majore Prunorum. Bonæ Spei. in H. D. Georgÿ Cordon collegimus.



B. CCXLVI.

1. Hyssopifolia spicata serratis. Persica folio. Planta Insula Barbadensis. floribus ex luteo-albicantibus.

2. Lilio-narcissus Indicus s. Narcissus Lilioflorus aureus strijs argenteis pictus. floribus amplis cernuis, gemellis, caule magno ceu fistuloso. H.R.H.

3. Millefolium mexicanum. Abrotani semen folijs tenuissimis. an Millefol. incanum Graecum. C.B.P. quod sub 3. in Prod. describit. Strabitis Millefolia Hon. Bell. ep. 2. ad Clus.

4. Morifolia Virginiensis arbor. Lobi arboris instar ramosa. foliis amplissimis. Morus Virginiana lactescens latissimo folio. H. Beaum. Corylus maxima folio latissimo Virginiana. Hort. Compt. Raij. an Nauclea lactea in Mexicensibus, s. Arbor erepitans. 2. Hernand. p. 88.

5. Nux Juglandis folio minor è Vera cruce. H.R.H. sorte Nux Jugland. folio Cur. assyrica fol. minoribus. P.B.P.

6. Ricinoides Madera spatana. diphyllos minor, siliculis hirsutis. an Nelam-mus. i. H.M. part. 9. à D. du Bois accepimus.



Tab. CCXLVII.

1. Olea Malabarica Fraxineo folio i. Madera aspalum. Arbor Indica Fraxino similis. Oleæ fructu. CBP. Nimbo Acosta. Aria bepou H.M. p. 4. part. 4.
2. Ophris bifolia palustris nostras. Bifolium palustre. Park. hujus exemplar amicissimus vir de in rebus Botanicis exercitatissimus D. Samuel Dale Pharmacopæus, & Medicus Braintreiensis, adnos benigne transmisit.
3. Papaver Argemonè dictum, flore flavo purpurascente. an Argemone Alpina Coriandri folio. CBP. Argemone lutea. Pona.
4. Phyllanthos Americana angustiori & longiori folio ramosa, caulescens. ab Hernandezio affini folio simpliciter pinnato. Phytogr. nostr. Tab. 36. plurimum differt. forte Phyllanthos Americana frutex, flore è singulis foliorum crenis prosiliens. FBP. H. Beaum. Hippoglosso forte congener, foliis Oleandri serratis. Br.
5. Phyllanthos Americana sinuosis foliis longis, crassis, carnosis. Opuntiæ in modum scrigera. Opuntiæ forte affinis, sed in crenis nec aculeata nec glochidosa.
H. Beaum. Napalsech. Cuez. Alsiquezes Mexicensis. Joan. Terent. apud Retch. forte ectios Caruambaya Brasiliensis. Marcgr. quoad descriptionem.
6. Portulaca Curassavica. sanguinea a Rali folio erectior. Phytogr. Tab. 205. cum additamento floris ejus pertegetali.
7. Portulaca sanguinea, procumbens. Vermiculato foliis, floribus tetrapetalis amœnè rubentibus, capsulis nonnihil acuminatis ex Curassao.



Fig. 2

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 7

M. v. G. scul.

CCXLVIII.

1. Phyllitis: Lingua Cervina maxima undulato folio auriculato per basim. HRP. an Phyllitis crispa. IB. tom. 3.

2. Phyllitis seu Ling. cervina minor crispa, folio multifido ramoso. Lingua cervina minor crispa, uno pedi sub trifolia. HRP.

3. Portulaca scandens Acetosa subrotundis foliis carijs Americana.

4. Potamogeiton maritim. pusillam alterum. R. aÿ. Hist. Potamogiton mar. il. pusillam alterum, seminib. singulis longis pedibus insidentib. gen. Raÿ. Syn.

5. Rubia quadrifolia laevis Gallica flore purpureo Patavinorum.

6. Rubia tetraphyllos glabra latior folio Bermudensis, seminibus binis atropurpureis. à D. Peter. habuimus.

7. Scandix Americana exactior Icon quam in Phytogr. nostra Tab. 117. exhibetur.

TAB. CCXLIX.



CCXLIX

a. Vitis vinifera sylvestris, Americana, foliis, aversâ parte, densâ lanugine tectis. White Foxe Nostratibus dicta. hujus ramulum, singulari amicitiâ nobis communicavit, Botanicus ille exercitatissimus D. Samvel Doody, qui tandem ad Horti Medici apud Chelseianos. suburbani, ab amplissima Sepiasiariorvm Londinensivm Societate Præfecturam, jure meritissimo evocatus est.

b. Arbor Americ. foliis à concursu nervorum imâ parte, longius productis, subtus lanugine candicante tomentosis. Polenni sade à Sirinamensibvs dicta

c. Arbor Americana. Malabathri subrotund. foliis, subtus lanugine ferruginea villosis. ex Sirinam.

d. Arbor Americ. latiori & acuminato folio trinervi, utrinq; glabro & margine leviter crenato, Mespilboom Belgis Sirinamensibvs nuncupatur.

e. Arbor Sirinamensis Canella folio maximo, utrinq; glabro.

B



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

M.V.G. fecit.

Arbor Sirinâmensis v. Analgo dictâ foliis bonatis, supernâ parte glabris, subtùs densâ lanugine Veluti instar velutis. Pau-boom Belgarum.

Arbor Americ. amplo rotundo folio trinervio inferiùs albâ lanugine incano fortè Arbor racemosa Brasiliana foliis Melabathri Br. Cent. fortè etiam Mura Brasiliensis. Mar. p. 127. Gr.

Arbor Americana densioribus foliis, pronâ parte, villosis, supinâ splendentibus glabris. Cinnamomum putatum ex Sirinâm.

Arbor Americ. folio grandi, acuminato venusto bonato, aversâ parte villis virentibus obsito, adpectinum strictiùri.

Arbor Sirinâmensis Hydrolapathi foliis, subtùs lanugine, pronâ parte villosis. Gummi-boom à Belgis Sirinâmensibus nominatur.

Arbor Americ. prolongo v. angusto mucronato folio, inter Caryophyllum v. Piper Orientale medio sapore aromatico. ex Sirinâm baricæ adhuc Arbores quibus folia

quæ bi vel trinervia, v. quodammodo etiam quæ differentia, in Viridario nostro vivos servantur. Hæc autem accepta referimus Munificentiæ maximè Reverendi D.ni

D. Mareei Stirpium rariorum æstimatoris eximij, v. coronidis gratiâ, huic Appendici adjicere nos curavimus.

LEONARDI PLUKENETII

PHYTOGRAPHIÆ

PARS QUARTA

CUI

Nil niſi præmia deſunt.

I. Collins fec:

LONDINI: MDCCLXIX.



Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

M. Vander Gucht scul:

TAB. CCLII.



Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 5.

J. Vander Gucht sculs.

TAB. CCLIII.



Fig: 4

Fig: 5.

Fig: 3.

Fig: 2.

Fig: 1.

M. Vander Gucht. Scul:

TAB CCLIV.



Fig: 1.

Fig: 5.

Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 2.

M. Vander Gucht sculs.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

TAB. CCLVI



Fig. 3



Fig. 4

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 5

J. Savage fecit.



Fig. 1



Fig. 2

Fig. 4



Fig. 5

Fig. 3

I. Savage fecit.



Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.



Fig. 4.

TAB CCLIX.



Fig: 1

Fig: 4

Fig: 3

Fig: 2

Fig: 5

Fig: 6

M. Vander Gucht scul:

Fig. 2

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

TAB. CCLXII.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

TAB. CCLXVIII.



Fig: 2.

Fig: 1.

Fig: 4.

b.

b.

b.

Fig: 3.

a.

a.

M. Vander Gucht scul:

TAB. CCLXIX.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.



Fig. 3.



Fig. 4.

TAB. CCLXXI.



Fig: 1.

a.

Fig: 5.

a.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

M. Vander Gucht. scul:

TAB. CCLXXII.



M. Vander Gucht sculs:

TAB. CCLXXIII



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

TAB. CLXXIV.

Fig: 3

Fig: 2

Fig: 5

Fig: 4

Fig: 1

M. Vander Gucht sculs

TAB. CCLXXV.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

TAB CCL XXVI



Fig: 5

Fig: 1

Fig: 6

Fig: 2

Fig: 4

Fig: 3

M. Vander Gucht sculs:

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 4.

TAB. CCLXXVIII.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 4.



TAB CCLXXIX.

Fig: 1



Fig: 7

Fig: 6

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 2

Fig: 3

M. Vander Gucht sculs.



TAB CCLXXX.

Fig: 1

Fig: 6

Fig: 5



Fig: 3

Fig: 2

Fig: 4

M. Vander Gucht scul:



TAB. CCLXXXI

Fig. 3

Fol. 147 pl. 4 Almag

Fig. 2

Fol. 146. pl. 3 Almag.

Fig. 1

Fol. 144 pl. 5 Almag.

Fol. 150 pl. 4. Almag.

Fig. 1

Fol. 150. pl. 12. Almag.

Fig. 2.

Fol. 150. pl. 13. Almag.

Fig. 3

Fol. 150 pl. 14 Almag.

TAB. CCLXXXIII



Fig: 1

M. Vander Gucht Sculp

TAB CCL XXXIV



TAB. CCLXXXV



Fig: 1

Fig: 3

Fig: 2

M. Vander Gucht fcul



Fig: 5

Fig: 4

Fig: 3

Fig: 2

M. Vander Gucht sculs.


Fig: 4
Fig: 3
Fig: 1
Fig: 2
Fig: 5
M. Vander Gucht sculp.

TAB. CCLXXXVIII



Fig. 1.

Fol. 151. pl. 5.
Almag.

Fig. 2

Fol. 154. pl. 6.
Almag.

TAB CCLXXXIX



Fig: 1

Fig: 3

Fig: 2

Fig: 4

M. Vander Gucht sculs.

TAB. CCXC

Fig: 3

Fig: 2

M. Vander Gucht scul:

Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

M. Vander Gucht scul:

TAB. CCXCII.



Fig. 1.

Fol 151. pl. 4.
Almag.



Fig. 1.

Fol. 156. pl. 2.
Almag.

Fol. 1.

Fol. 153 pl. 14
Almag.

TAB. CC XCV.



Fig. 1.

Fol. 155. pl. 16.
Almag.

P. Van Somer sculp

Fig 2

Fol. 156 pl. 5
Almag.



Fig 1.

Fol. 156 pl 4
Almag.

P Van Somer sculp

CCXCVII.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 6.

Fig. 5.

TAB.CCX CVIII.



Fig.6.

Fig.1.

Fig.4.

Fig.3.

Fig.8.

Fig.5.

Fig.7.

Fig.9.

Fig.2.

Fig. 2.

TAB. CCXCIX.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 4.

TAB. CCC.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 5.

J. Savage sculp.



Fig. 2.



Fig. 3

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 7.

TAB. CCCII.



Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 7.

Fig. 5.

Fig. 6

Fig. 4.

I. Savage fcul.

TAB CCCIII.



Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

Fig: 5

M. Vander Gucht. Sculs.


Fig: 4.

TAB. CCCIV.



Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 5.

Fig: 6.

M. Vander Gucht. scul:

Fig: 5.

TAB CCCV.



Fig: 1.

Fig: 2.

Fig: 3.

Fig: 4.

Fig: 5.

M. Vander Gucht. Sculp.



TAB. CCCVI.



Fig. 6.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 4.

TAB. CCCVII.





Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.

G.V. Caseel. Sculp:



TAB. CCCIX.



Fig: 2.



Fig: 3.



Fig: 4.



Fig: 5.



Fig: 1.

M. Vander Gucht sculs

TAB. CCCX

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 5

Fig: 6

Fig: 7

Fig: 1

Fig: 4

M. Vander Gucht Jcul:

TAB. CCCXI



Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 6

M. Vander Gucht sculp:

TAB. CCCXII.





Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

TAB. CCCXIV.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 1.

TAB. CCCXVI.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 2.

G.V. Caſeel. Sculp

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 2.



TAB. CCCXVIII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.



TAB. CCCXIX.



Fig 3

Fig.4.

Fig.6.

Fig.2.

Fig.7.

Fig.1.

Fig.5.

TAB.

TAB. CCCXX.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig 3

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

TAB. CCCXXI

Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4

Fig. 5

Fig: 3



Fig: 1



Fig: 3



Fig: 2

Fig: 4

M. Vander Gucht sculs:

TAB. CCCXXIII



Fig: 1

Fig: 2

Fig: 3

Fig: 4

Fig: 5

Fig: 6

Fig: 7

M. Vander Gucht scul:



Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.



Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 5.

Fig. 4.

TAB. CCCXXVI



Fig: 3

Fig: 2

Fig: 1

Fig: 5

Fig: 4

M. Vander Gucht sculs.

TAB. CCCXXVII.

Fig: 1.



Fig: 3

Fig: 6.

Fig: 5

Fig: 7.

Fig: 4.

Fig 2

M. Vander Gucht sculs.

TAB. CCCXXVIII.

Fig: 6.

Fig: 5.

Fig: 4.

Fig: 3.

Fig: 2.

Fig: 1.

M. Vander Gucht sculs:

G R III
BRITISH MUSEUM

Abbreviata Hortorum, Librorum, Autorumque in *Phytographia* citatorum, Nomina, hic explicanda veniunt.

AC. Reg. Par. Academia Regia Pariſienſis.
Acoſt. Chriſtophori Acoſtæ Hiſtoria Naturalis *Ind. Or.*
Act. Hafn. Caſpari Bartholini Acta Medica Hafnienſium.
Adv. Adverſaria Penæ & Lobelii.
Alp. de Pl. Ægypt. Proſperus Alpinus de Plantis Ægypti.
Alp. de exot. Proſper. Alpinus de Plantis exoticis.
Aman. Charact. Pl. Pauli Amanni Character Plantarum.
Aman. H. Boſ. Pauli Amanni Hortus Boſianus.
Andr. Cæſ. Andreas Cæſalpinus de Plantis, lib. xvi.

Baniſt. Joannes Baniſter in Catalogo Stirp. Virginienſ.
Belluc. Ind. H. Piſ. Thomæ Bellucii Index Horti Piſani.
Bocc. Paulus Bocconus de Plantis rarioribus Siciliæ, &c.
Bod. a Stap. Joannes Bodæus à Stapel. Comment. in Theophraſt.
Bont. Jacobus Bontius in Hiſtoria Naturali *Ind. Orient.*
Bot. Monſp. D. Magnol Botanicum Monſpelienſe.
Boym. Michaëlis Boymii Flora Sinenſis.
Br. Cent. Jacobi Breynii Centuria prima.
Br. Prod. 1 & 2. Jacobi Breynii Prodromus primus, & ſecundus.
Br. Faſcic. Jacobi Breynii Faſciculus rariorum Plantarum.

C. B. P. Caſpari Bauhini Theatri Botanici Pinax.
C. B. Phyt. Caſp. Bauhini Phytopinax.
C. B. Prodr. Caſpari Bauhini Prodromus.
Cam. H. Med. Joachimi Camerarii Hortus Medicus.
Cat. H. R. P. Catalogus Horti Regii Pariſienſis.
Cat. H. R. B. Catalogus Horti Regii Bleſenſis.
Cat. H. Joncq. Catalogus Horti Joncquetti.
Cat. MSS. H. Oxon. Catalogus Manuſcriptus Horti Oxonienſ.
Cat. H. Ac. Lugd. Catalogus Horti Academici Lugdunenſis.
Cat. Amſt. Catalogus Horti Medici Amſtelodamenſis.
Cat. Edinb. Catalogus Plantarum Horti Medici Edinburgenſis.
Cat. H. Beaum. Catalogus Rariorum, Horti Beaumontiani.
Cat Altorf. Catalogus Altorfienſis per Mauritium Hofmannum.
Cat. H. Lypſ. Catalogus Horti Lipſienſis.
Cat. Groning. Catalogus Plantarum Horti Groningenſis.
Cat. Pat. à Tur. Catalogus Patavinus Georgii à Turre.
Cat. Sileſ. Catalogus Stirpium Sileſiæ per Caſp. Swenckfeldium.
Chab. Chabræi Sciographia Stirpium.
Cluſ. Hiſt. Carolus Cluſius in Hiſtoria Rariorum.
Cluſ. Exot. Carolus Cluſius in Exoticarum Hiſtoria.
Cod. Bent. Codex Bentingianus *Illuſtriſſ. Comitis Portlandiæ.*
Cod. Compt Codex Comptonianus *Reverendiſſ. Epiſcopi Londinenſ.*
Col. Ecph. Fabii Columnæ Plantarum rariorum Ecphraſis.
Col. Phytob. Fabii Columnæ Phytobaſanos.
Corn de Pl. Canad. Jacobus Cornutus de Plantis Canadenſibus.
Cort. Jacobus Antonius Cortuſus Horti Patavini Præfectus.

Dod. Mem. Dodarti Memoires. Gallicè.
Dod. Dodonæi Pemptades Plantarum.

Eph. Germ. Ephemerides Medico-Phyſicæ Germanicæ.

Flac. Deſcr. Madag. Flacourt Deſcriptio Inſulæ Madagaſcar.
Fl. Bat. Flora Batava.
Floril. Ren. Florilegium Renovatum Joan. Theodori du Bry.
Frag. Joannes Fragoſus de utriuſque Ind. Simplicibus. Hiſpanicè.
Frid. Cæſ Fridericus Cæſius Princeps in Tabulis Phytoſcopiæ.
Fum. Hiſt. Fumei Hiſtoria general. Ind. Occidentalis.

Gall. Preſſ. Gallus Preſſanus de Re Ruſticâ.
Garz. Garzias ab Horto de Aromatis.
Ger. Emac. Joannes Gerardus Emaculatis à Jonſono.

Hern. Franciſcus Hernandez. In Hiſtoria Mexicanâ.
Hiſt. Lugd. Hiſtoria Lugdunenſis. Volumina II.
Hond. Hondii Geographia.
Hon. Bell. Honorii Belli Epiſtolæ de Plantis ad Cluſium.
H. Ac. Lugd. Hortus Academicus Lugdunenſis.
H. Ac. Pat. Hortus Academicus Patavinus.
H. Amſt. Hortus Medicus Amſtelodamenſis.
H. Compt. Hortus Rariorum Comptonianus.
H. Morg. Hortus Medicus D. Morgani apud Weſtmonaſterium
H. Reg. Hampt. Hortus Regius Hamptonienſis.
H. R. P. Hortus Regius Pariſienſis.
H. R. B. Hortus Regius Bleſenſis.
H. Ac. Oxon. Hortus Academicus Oxonienſis.
H. Mal. Horti Malabarici. Volumina X.
H. Triumf. Hortus Baptiſtæ Triumfetti apud Bononienſes.
Hugb. Gulielmi Hughefii Medicus Americanus. Anglicè.
Hyac Ambr. Phyt. Hyacinthi Ambroſini Phytologia.

Ic. Lob. Lobelius in Iconibus.
Ic. Rob. Icones Roberti.
Imp. Ferrantes Imperatus in ſuâ Hiſtoria Naturali. Italicè.
Ind. Or. Indiæ Orientalis. Partes X.
Ind Occid. Indiæ Occidentalis. Partes X.
J. B. Joannes Bauhini Hiſt Plantarum Univerſalis. Tribus Tomis.
Jonſt. Jonſtoni Dendrologia.

Knox. Knox Hiſtoria Inſulæ Zeylonenſis. Anglicè.

Læl. Triumf. Lælii Triumfetti Catalogus apud Fratrem.
Laet. Joannes Laetius Hiſtoria Naturalis Indiæ Occident.
Lig. Ligonis Hiſtoria Naturalis Inſulæ Barbados. Anglicè.
Linſc. Hugonis Linſchoti Itinerarium in Orient. Indiam.
Lob. Obſ. Lobelii Obſervationes.
Lob Ill. Lobelii Stirpium Illuſtrationes à Guliemo How editæ.

Matth. Matthiolus in Commentariis ſuis in Dioſcoridem.
Marcg. Georgius Marcgravius de Plantis Braſiliæ.
Martin. Martini Atlas Chinenſis.
Mentz. Pug. Chriſtiani Mentzelii Pugillus Rariorum.
Merc. Bot. Mercurius Botanicus Johnſoni.
Meret. Pin. Chriſtoph. Meretti Pinax Rer. Natural. Britannic.
Mich. Nut. Michaelis Nutii Faſciculus Herbarum.
Morif. Hiſt. Roberti Moriſoni Hiſtoria Plantarum Oxonienſis.
Morif. Umb. Roberti Moriſoni Hiſtoria Umbelliferarum.
Morif. Præl. Bot. Roberti Moriſoni Præludia Botanica.
Mund. Biochr. Henrici Mundy Biochreſtologia.
Munting. Abrahamus Muntingius de Re Herbariâ. Belgicè.
Muſ. Reg. Soc. Muſæum Regiæ Societatis apud Londinenſes.
Muſ. Cort. Muſæum Cortenianum Interioris Templi.
Muſ. Zeyl. Muſæum Zeylanicum.

Nieremb. Euſebius Nierembergius in ſua Hiſtoria Naturali.
Nieuh. Itin. Nieuhenof Itinerarium ad Chinam.

Ogilb. Joannis Ogilbeii Atlas Anglicè conſcriptus.
Ovied. Conſalv. Ferdinandi Oveidi Ind. Occ. Hiſtor. generalis.

Park. Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum.
P. B. P. Paradiſi Batavi Prodromus.
Phyt. Brit Phytologia Britannica.
Phytogr. Phytographia Plukenetiana.
Piſon. Hiſt. Gulielmi Piſonis Hiſtoria Naturalis Braſiliæ.
Piſon. Mant. Gulielmi Piſonis Mantiſſa Aromatum.

Plot.

ABBREVIATA, &c.

Plot. D. Plot. Hiſtoria Naturalis Agri Oxonienſis. Anglicé.
Pon.deſc.M.Bald. JoannisPonæ deſcriptioPlantar. MontisBaldi.

Raji Hiſt. JoannisRaji HiſtoriaPlantar.Univerſ. DuobusTomis.
Raji Cat. Joannis Raji Catalogus Plantarum Angliæ, &c.
Raji Obſ. Joannis Raji Obſervationes Itinerariæ.
RajiCat.Stirp.Ext. Joannis Raji Stirpium Exterarum Catalogus.
Raji Syn. Joan. Raji Synopſis Methodic. Stirpium Britannicar.
Rawolf. Leonardi Rawolfii Itinerarium.
Recch. Antonii Recchi Rerum Med. Novæ Hiſpan. Theſaurus.
Redi. Franciſci Redi Experimenta Naturalia.
Rochf. Hiſtoire des Antilles. D. Rochforti. Gallicè.

Scb. Bot. Schola Botanica Horti Regii Pariſienſis.

Sim. Paul. Simonis Pauli Quadripartitum Botanicum.
Stirb. Citric. Franciſci van Stirbeeck Citricultura.

Tab. & Tabern. JacobusTheod.Tabernæmontanus in Iconibus.
Terent Terentii Notæ in Antonium Recchum.
Thal. Harc. Joannes Thalius in Sylvâ ſuâ Harcyniâ.
Thevet. Andreas Thevetus in ſua Coſmographiâ.
Tranſ.Phil. Tranſactiones Philoſophicæ apud Londinum editæ.
Triumf. Joannis Baptiſtæ Triumfetti Obſervationes.

Veſling Obſ. Veſlingii Obſervationes in Proſperum Alpinum.
Viridar. Luſit. Viridarium Luſitanicum, D. Griſleii.

Zanon. Jacobus Zanonius in Hiſtoriâ Botanicâ. Italicè

INDEX.

INDEX Totius PHYTOGRAPHIÆ.

ABies, tab. 1. 21.
Abrotanum mas. tab. 121. fœm. 160.
Abſinthium, tab. 1. 73.
Acacia, tab. 1, 2. 73. 121, 122, 123.
Acer, tab. 2, 3. 123. Negundo perperàm.
Adianthum, tab. 3, 4. 73. 123, 124, 125.
Æſchynomene, tab. 4, 5.
Alaternus, tab. 126.
Alcea, tab. 5, 6, 7. 73, 74. 125, 126, 127. 240.
Alchimilla, tab. 240.
Alni facie, tab. 128.
Alni-folia, tab. 115.
Alno affinis, tab. 128.
Alnus, tab. 240.
Aloë, tab. 129. 240.
Alſine, tab. 7. 74, 75. 118. 125. 128. 130.
Althæa, tab. 7, 8, 9. 74. 131, 132. 240.
Amaranthus & Amaranthoides, tab. 10. 75. 118. 132, 133.
Ambroſia, tab. 10.
Ammi, tab. 11.
Amygdalus, tab. 11.
Anagyris, tab. 133.
Anchuſa, tab. 6. 76.
Angelica, tab. 76. 134.
Angolam, tab. 12.
Animifera, tab. 82.
Aniſum. tab. 12.
Anona, tab. 134, 135. 240.
Anonis, tab. 76. 135.
Anonymos, tab. 136. 241.
Antholiſthos, tab. 136.
Anthyllis, tab. 12.
Antirrhinum. tab. 13. 118. 137.
Aphyllon aquaticum, tab. 138.
Apioſcorodon, tab. 137.
Apocynum, tab. 13. 76, 77. 115. 137, 138, 139. 241.
Arbores, & Arbuſculæ, tab. 13, 14. 77. 139. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. 241, 242. 249, 250.
Ariſtolochia, tab. 15. 69. 78. 148.
Artemiſia, tab. 15.
Arum, tab. 77. 148, 149.
Aſarum, tab. 15. 78.
Aſparagus, tab. 15. 78.
Aſperulæ congener, tab. 149.
Aſter, tab. 14, 15, 16. 78, 79. 149.
Aſtragalus, tab. 79.
Atriplex. tab. 16.
Auricula Urſi, tab. 79. 149.
Balſamum Caprarium, tab. 80. eſt Ricini genus.
Bandura V. Utricaria.
Bellis, tab. 17. 82. 150.
Betonica, tab. 150.
Betula, tab. 151. 241.
Biſtorta, tab. 151.
Biti, tab. 18.
Blitum, tab. 18. 151.
Braſſica ſpuria, tab. 80. 206.
Brunella, tab. 80.
Bryonia, tab. 151, 152.
Bryonioides, tab. 152.
Bucanephyllon, tab. 152.
Bugula, tab. 18. 80.
Buxus, tab. 80.
Cacalia, tab. 153.
Calabura alba, tab. 152.
Calamintha, tab. 153.
Campanula, tab. 23. 152, 153.
Carappa, tab. 153.
Cardiaca, tab. 80. 118.
Carduus, tab. 19. 81. 154. 241.
Carlina. tab. 154.
Carpinus, tab. 156.
Caryophyllus ſylveſtris, tab. 81.
Caryophyllus aromaticus, tab. 155.
Caſſia lignea, tab. 81.
Caſtanea, tab. 156.
Cedrus ſpuria Jamaicenſibus, tab. 77.
Cedrus Barbadenſibus dicta, tab. 157.
Cenchramidea. tab. 156, 157. & huc ſpectat fig. 2. tab. 77.
Centaurium ciliare, tab. 81, 82.
Ceraſus, tab. 82. 97. 157, 158.
Ceraſo affinis, tab. 157.
Cereus, tab. 29. 158.
Ceratia & Ceratiæ affinis, tab. 1. 82.
Chriſtophoriana, tab. 20. 159.
Chryſanthemum, tab. 21, 22. 83, 84. 115. 118. 159, 160, 161. 242.
Cicer Aſtragaloides, tab. 23.
Cinamomum ſylveſtre Americ. tab. 160.
Ciſtus, tab. 23. 83, 84. 161.
Citharexylum, tab. 161, 162.
Citrullus Indica, tab. 164.
Clematis & Clematitis, tab. 84. 162, 163.
Clinopodium, tab. 24. 54. 84, 85. 163, 164.
Colutea, tab. 164, 165, 166.
Conferva tab. 24. 84.
Convolvulus, tab. 9. 24, 25. 85. 166, 167.
Conyza, tab. 168. 243.
Corallina, tab. 26. 168.
Corallinum lignum, tab. 169.
Cordis Indi folio, tab. 168.
Coriandrum. tab. 169, 170.
Cornus, tab. 26. 169.
Coryli ſeu Avellanæ folio, tab. 162.
Crithmum, tab. 169.
Crotalaria, tab. 169.
Cucumis, tab. 26. 85. 170. 172.
Cucurbitifera, tab. 170, 171.
Cupi Malabaricæ accedens, tab. 171.

INDEX.

Cupreſſus, tab. 85.
Curini Species, tab. 171.
Cuſcuta, tab. 26. 172.
Cynogloſſum, tab. 172.
Cynophallophoros, tab. 172.
Cynoxylum, tab. 172.
Cytiſus, tab. 26. 86.
Daucus, tab. 173.
Doronicum & Doronicis affinis, tab. 86. 242.
Ebenus Jamaicenſis, tab. 89.
Ecbolium, tab. 173.
Echinophora Capſularis, tab. 173.
Elatines folio, tab. 86.
Elemnifera, tab. 173. 209. 217.
Elichryſum, tab. 173.
Elichryſo affinis, tab. 27. 86. 174.
Ephemerum Phalangoides, tab. 27. 174.
Epidendron, tab. 174.
Equiſetum, tab. 29. 193.
Erica, tab. 175.
Ericæ facie Polygonoides, tab. 28.
Ericú, tab. 175.
Eruca, tab. 86.
Eryngium, tab. 175.
Erythroxylum, tab. 175.
Eſcharoxylum, tab. 175.
Euedexilium, tab. 176.
Euonymus & Euonymo adfinis, tab. 28. 88. 94. 115. 176.
Eupatoria, tab. 87, 88. 143. 177.
Euphraſia, tab. 27, 28. 56. 177.
Fagi foliis arbuſcula, tab. 89.
Fagotriticum Volubile, tab. 177.
Ferula, tab. 12.
Ficordes, ſeu Echinomelocactos, tab. 29.
Ficoides, ſeu Cereus, tab. 29.
Ficoides Meſembrianthemum, tab. 117.
Ficus, tab. 178, 243.
Filix, Ficula & Filicifolia, tab. 30. 89. 179, 180, 181, 182. 243, 244.
Flos Paſſionis. V. Paſſiflora.
Fœnum-Græcum Phaſelodes, tab. 90.
Fraxinus Alepenſis, tab. 182.
Frutex & Fruticulus, tab. 29. 31. 115. 182, 183, 184. 244.
Fucus, tab. 184.
Fumaria, tab. 90.
Fungus & Fungis congener. tab. 90. 116. 184.
Galactoxylum, tab. 185.
Galega degener. tab. 90.
Geniſta, Geniſtella & Geniſtæ ſimilis. tab. 31. 91. 185.
Geniſto-Spartium bacciferum, tab. 185.
Gentiana & Gentianella, tab. 90. 186.
Geranium, tab. 31. 186, 187.
Gladiolus, tab. 187.
Gnaphalium & Gnaphalio affinis, tab 31. 187.
Goſſipium, tab. 188, 189.
Gramen & Graminifolia, tab. 32, 33, 34, 35. 91, 92. 119. 188, 189, 190, 191, 192. 244, 245.
Gratiola & Gratiolæ affinis, tab. 35. 193.
Guaiacum, tab. 35. 94.
Guaiava, tab. 193.
Halimus, tab. 36.
Hedera, tab. 36. 93.
Helicteres, tab. 245.
Heliotropium, tab. 36. 245.
Helleborine, tab. 93.
Hemionitis & Hemionitidi affinis, tab 36. 247.
Heſperis prodigioſa, tab. 37.
Hieracium, tab. 37. 93. 116.
Hippuris, tab. 193, 194.
Holoſteum, tab, 37.
Horminum & Hormino accedens, tab. 194.
Hyacinthus & Hyacintho affinis, tab. 195.
Hyoſcyamus, tab. 37.
Hypericum, tab. 93. 245.
Jacea, tab. 38, 39. 93, 94. 196.
Jacobæa, tab. 39. 196.
Jaſminum, tab. 94.
Iberis, tab. 39.
Ilex & Ilicis facie, tab. 196, 197.
Imperatoria, tab. 95.
Iris, tab. 196.
Jujuba & Jujubes, tab. 197.
Juncus & Juncellus, tab. 40. 95. 197.
Juniperus, tab. 40. 197.
Kaka-Toddali, tab. 95.
Kali, tab. 95.
Lamium, tab. 41. 198.
Lappula, tab. 41. 245.
Larix, tab. 245.
Laſerpitium, tab. 96. 198, 199.
Laurifolia, tab. 96.
Laurus & Lauri facie, tab. 199.
Lauruſtinus, tab. 199.
Lenticula paluſtris, tab. 41.
Leucadendros & huic ſimilis, fortè Tocahoca Ogilb. tab. 200.
Leucoium, tab. 42.
Leucoxylum, tab. 200.
Lichen, tab. 42.
Liguſticum, tab. 96.
Lilio-narciſſus, tab. 42. 246.
Limonium, tab. 42. 200.
Linaria, tab. 96.
Libuid-ambari arbor. tab. 42.
Lithoſpermum, tab. 42.
Locus ſpuria, tab. 200.
Lotus & Loto affinis, tab. 43. 67. 96. 116. 201.
Lucinium, tab. 201.
Lupulus & Lupulo ſimilis, tab. 201.
Lychnis & Lychnidis cognata, tab. 42, 43. 97. 203.
Lychnidea, tab. 98.
Lycium & Lycio cognatus frutex, tab. 96, 97. 201, 202.
Lyſimachia & huic affinis, tab. 43, 44. 98. 119. 202, 203.

INDEX.

Malva, tab. 44.
Malus Granata, tab. 98.
Malus Perſica, tab. 203.
Mameé arbor. tab. 204.
Mandarú, tab. 44.
Mangle arbor. tab. 204.
Manihot Indorum, tab. 205.
Marrubium, tab. 45. 99.
Matricaria, tab. 45.
Melanacrodryon, tab. 205.
Melanomma & Melanoxylon, tab. 205.
Melampyrum & Melampyro affinis, tab. 99. 119.
Mercurialis, tab. 99. 205.
Meſpilus, tab. 46. 99. 100.
Methonica, tab. 116.
Millefolium, tab. 47. 99. 246.
Mimoſa, tab. 120.
Mirabili Peruvianæ affinis. Baſella dicta, tab. 63.
Maſcus, tab. 44, 45. 47, 48, 49. 100, 101. 205.
Myagrum, tab, 206.
Myoſotis foliis, tab. 205.
Myoſotis Scorpioides, tab. 48.
Myrrhis, tab. 100. 206.
Myrtus Brabanticæ ſimilis, tab. 48.
Nardus, tab. 101.
Naſturtium, tab. 101. 206.
Negundo, tab. 206. perperàm, 123.
Nerium & Nerio affinis, tab. 207.
Niara, tab, 49.
Nil, tab. 101.
Ninzin, tab. 101.
Nir Schulli, tab. 49.
Nux, tab. 206, 207, 208, 209. 246.
Nymphæa, tab. 207. 209.
Nymphææ congeneri accedens, tab. 115.
Ocimum, tab. 208.
Oenanthe, tab. 49.
Olea, tab. 207. 209. 247.
Onobrychis, tab, 49, 50. 102. 246.
Ophioxylum, tab. 210.
Ophrys bifolia, tab. 247.
Orleana, tab. 209.
Ornithogalo affinis, tab. 102.
Ornithopodium, tab. 52.
Orobanche, tab. 209, 211.
Orobus, tab. 210.
Oxys, tab. 102.
Padri Malabaricæ ſimilis, tab. 53.
Pai-paroea, tab. 50.
Palma, tab. 51. 103.
Papaver Argemone dictum, tab. 247.
Paronychia Myoſotis, tab. 51.
Paſſiflora, tab. 104. 210, 211, 212.
Pedicularis, tab. 102.
Pentaphyllum & Pentaphylloides. tab. 106. 210. 212.
Perfoliata, tab. 50.
Periclymenum & Periclymeni ſimilis, tab. 103, 104. 211, 212, 213.
Perſicaria, tab. 210.
Petaſites, tab. 212.
Phaſeolus & Phaſeolis accedens, tab. 51, 52. 102. 105. 119. 211. 213, 214.
Phoenico-Scorpiuros, tab. 106.
Phyllanthos, tab. 247.
Phyllitis, tab. 105. 248.
Phyteuôdes, tab. 215.
Piloſella minima, tab. 52.
Pimpinella Sanguiſorba, tab. 103.
Piper frutex Americ. tab. 215.
Piperi longo ſimile & reverâ idem, tab. 104.
Planta bivalvis Ind. Or. tab. 215.
Plantago Coronopus dicta, tab 103.
Plantaginis Stellatæ foliis, tab. 215.
Pneumatoxylum, tab. 215.
Polygalæ affinis, tab. 53.
Polygonum, tab. 52, 53. 103. 120.
Potamogiton & Potamogito ſimilis. tab. 102. 216. 248.
Portulaca & Portulacæ affinis, tab. 105. 120. 215, 216. 247, 248.
Poutaletsjæ ſimilis, tab. 54.
Pruno Sylveſtri affinis, tab. 218.
Prunus, Prunifera & Nuci-prunifera, tab. 216, 317, 218.
Ptarmica & huic ſimilis flore hexapetalo, tab. 53. 219.
Pulegium, tab. 54. eſt rectius Clinopodii Species.
Pyrola, tab. 107.
Quercus, tab. 54.
Ranunculus, tab. 55. 106 Ranunculo adfinis, tab. 106.
Rapunculus, tab. 55.
Reſeda, tab. 55. 107. 219.
Rhamnus, tab. 55. 107, 108. 120. 218, 219, 220.
Rhus & Rhoi ſimilis, tab, 56. 107. 219.
Ricinus & Ricini fructu. tab. 56. 107, 108. 120. 220.
Ricophora, tab. 220.
Ros Solis, tab. 117.
Rubia, tab. 248.
Rubiæ modo ſpicata Euphraſiæ genus, tab. 56.
Rubus, tab. 108.
Saamoúna Piſon, tab. 56.
Sagittariæ foliis & Sagittariæ ſimilis, tab. 220.
Salix, tab. 56. 221.
Salvia, tab. 57. 221.
Sambucus, tab. 58. 221.
Sanicula, tab. 57, 58, 59. 108. 222.
Saſſafras, tab. 222.
Scabioſa & Scabioſæ capitulis, tab. 58. 108, 109, 221.
Schetti Malabaric. tab 59. 109.
Scorpioides, tab. 59.
Scortea arbor, tab. 222.
Scorzonera, tab. 59.
Scrophularia, tab. 59.
Scutellaria, tab. 110.
Securidaca, tab. 59.
Sedum, tab. 223.
Sena, tab. 60. 223.
Senecio, tab. 60, 112, 223.

INDEX.

Serpentaria repens, tab. 117.
Serratula, tab. 109.
Seſamum, tab. 109.
Seſeli, tab. 60.
Sideritidis facie, tab. 224.
Sideroxylum, tab. 223, 224.
Siler, tab. 223.
Sinapiſtrum, tab. 60, 119. 224.
Siſynrichium, tab. 61. 224, 225.
Sium, tab. 61.
Smilax aſpera ſeu claviculata, tab. 110, 111. 225.
Solanum, tab. 62. 111, 112. 225, 226, 227.
Soldæ Malabaricæ ſimilis, tab. 61.
Sonchus, tab. 61, 62. 227.
Spirææ Theophraſti ſimilis. Hort. Oxon. tab. 63.
Sphondylium, tab. 63.
Spongia, tab. 112.
Stachys, tab. 64.
Staphylodendron, tab. 63.
Symphytum, tab. 227.
Syringa, tab. 64. 112. 228.
Tacamahaca, tab. 228.
Tamarindus, tab. 64.
Telephium, tab. 228.
Teucrii folio, tab. 64. 228.
Teucrium, tab. 65.
Thalictrum, tab. 65.
Thapſia, tab. 65, 66, 67.
Therebinthus, tab. 228, 229.
Therebinthi minoris æmula, tab. 64. eſt Tecomahaca fol. non crenatis.
Thlaſpi, tab. 228.
Thymelæa, tab. 67. 113. 228, 229.
Thymus & Thymum, tab. 116.
Tithymalus, tab. 43. 65. 112, 113. 118. 229, 230, 231.
Trachylepos arbor, tab. 230.
Tribulus terreſtris, tab. 67.
Trifolium, tab. 67, 68, 69. 113. 120. 231.
Triticum, tab. 231.
Tulipifera, tab. 68. 117. 248.
Valeriana, tab. 231, 232.
Valerianella, tab. 113.
Verbaſco congener. tab. 114.
Verbena, tab. 70. 232.
Veronica & Veronicæ affinis, tab. 70. 114. 232, 233.
Viburnum Americanum, tab. 114. 233.
Vicia, tab. 71, 72. 114. 233.
Viola, tab. 114. 120. 233, 234.
Virga aurea, tab. 114. 116. 235, 236.
Viſcum arboreum, tab. 117.
Vitis alba Vinifera, tab. 249.
Vitis arbuſtina, tab. 236.
Vitis Idææ ſpecies, tab. 69. 236.
Ulmaria, tab. 236.
Ulmi-folia, tab. 237.
Volubilis, tab. 69. 236.
Urtica, tab. 237.
Utricaria Vegetabilis, tab. 237. Bandura dicta.
Uvifera, tab. 236, 237.
Wadoukæ ſimilis, tab. 69.
Xanthium, tab. 239.
Xyloboeion ſeu Lignum bovinum, tab. 238.
Xylociſte, tab. 239.
Xylomaſtix arbor. tab. 238.
Xylopicron. tab. 238.
Zanthoxylum, tab. 239.
Zarzaparilla Virginienſibus dicta, tab. 238.

FINIS.